



N.H. 943^a₂

Nat

573



D. Chodowiecki, del. & fac. 1790.

DEUTSCHLANDS FLORA

ODER

BOTANISCHES

TASCHENBUCH

FÜR DAS JAHR 1791.

VON

GEORG FRANZ HOFFMANN.



ERLANGEN:

BEY IOHANN IACOB PALM.

DEUTSCHLANDS FLORA

GEHT

POTANISCHES

TASCHENBUCH

FÜR DAS JAHR 1791.

VON

GEORG FRANK HOFMEYER.

LEIPZIG: VERLAG VON J. NEUBAUER.

GERMANIA im kaiserlichen Schmuck opfert der Göttin FLORA, und diese überreicht GERMANIEN einen Kranz von deutschen Blumen.

GERMANIA im kaiserlichen Schmuck opfert der Göttin FLORA, und diese überreicht GERMANIEN einen Kranz von deutschen Blumen.

VORSTELLUNG DES TITELBLATTES.

GEHÖRT ZU DEN KÄISERLICHEN BÜCHERN DER

ÖSTERREICHISCHEN REGIERUNG.

EINE KLASSE VON DEUTSCHEN BÜCHERN.

NAHMEN UND SCHRIFTEN VON KRÄU-
TERFORSCHERN
des 18 Jahrhunderts.

- Abercrombie's, Gardener's Dictionary. 3 vol. 8.
Oxford, 86.
- Adam's, Essays on the Microscope. 4. Lond. 87.
- Adanson, Familles des plantes. 2. vol. 8. Paris, 63.
- Agosti, I. De re botanica — Belluni, fol. 70.
- Aiton, W. Hortus kewensis. 3. vol. 8. Lond. 89.
- Alstroemer, C.
- Allioni, C. Flora pedem. 5. Tom. fol. Aug. Taur. 85.
- Amman, I. Stirp. rarior. icones. 4. Petrop. 39.
- Amoureux, F.
- Arduini, P. Animadv. bot. spec. I - II. 4. Venet. 64.
- Asso, I. d. Stirp. indigenae Aragon. 4. Masil. 79.
- Aublet, F. Hist. des plant. de la Guiane. 4. Par. 76.
- Baeck, A. Eq.
- Banks, I. Eq.
- Barrington's, D. Naturalist's Journal. 4. Lond. 87.
- Bartalini, B. Catalogo delle piante. 4. Siena, 76.
- Battarra, I. A. Hist. Fungor. — 4. Favent. 55.
- Batsch, A. I. G. C. Analyses florum. vol. 1. 4. Hal.
Magd. 90.
- Baumgarten, I. C. G. Flora lipsiensis. 8. Lips. 90.
- Beckmann, I. Physikal. ökon. Bibl. 16. B. 8. 90.
- Bellermann, I. B. Cabinet d. Holzzart. 12. Erf. 87.
- Berckhey, F. v. Expos. flor. compos. 4. L. Bat. 60.
- Bergen, C. A. d. Flora francof. 8. Fr. ad Viatr. 50.
- Bergeret, Phytomatotech. 27. Cah. fol. par. 83.
- Bergius, P. I. Descript. pl. ex C. b. Sp. 8. Stockh. 67.
- Berkenhout's, I. Synops. of the nat. hist. of great
Brittain. 8. Lond. 89.
- Bertholon, St. Laz. De l'electr. d. veget. 8. Lyon, 83.
- Biber, I. A. Sceleta foliorum. fol. 4. Fasc. 73.
- Bierkander, C.
- Blackwell, E. Curious herbal. 5. vol. f. Lond. 39.
(ed. germ. 6 vol. Norimb. 57.)
- Blumenbach, I. F.

VERONICA MONTANA.

Classis et Ordo:

DIANDRIA MONOGYNIA.

RADIX perennis fibrosa: fibrillis praelongis fuscis.

CAULIS procumbens debilis versus basin saepe radicans (fig. 1.), dein adscendens; teres, pilis mollibus undique hirsutus, purpurascens.

FOLIA magna opposita petiolata (2) ovato-cordata obtusiuscula, inaequaliter serrata, hirsutula, subtus purpurascentia nitida, parum bullata, inferiora et suprema sensim minora; petioli longitudine fere foliorum (2) hirsutissimi, superius sulcati.

RACEMI laterales ex foliorum alis (3) filiformes, alterni subinde hirsuti, pauciflori; pedunculi alterni remoti, bractea lanceolata (5) suffulti eaque multo longiores (4).

CAL. *Perianthium* quadripartium persistens: laciniis subaequalibus ovatis basi angustatis hirsutis (6).

COROLLA monopetala rotata (8) dilute ex purpureo caerulea, calyce major; tubiis brevissimis albidus, limbus quadripartitus planus, laciniis ovatis: infima angustiore immaculata (9), huic opposita latiore, una cum lateralibus venis caeruleis picta.

STAM. *Filamenta* duo inferne angustiora (10), adscendentia albida, medio crassiora, tubo corollae inserta; antherae caeruleae oblongae.

PIST. *Germen* obovatum compressum (11); stylus filiformis longitudine staminum, declinatus sensim incrassatus; stigma capitatum, album.

PERICARP. *Capsula* magna orbiculata hirsuta (7) superne et inferne emarginata, compressa, bilocularis (12), apice dehiscens transversim: dissepimento valvulis contrario.

Semina 6 - 10, ovata plana, striata, flavescencia (13).



Veronica montana

NAHMEN UND SCHRIFTEN VON KRÄU-
TERFORSCHERN
des 18 Jahrhunderts.

- Böhmer, G. R. *Flora Lipsiae indig.* 8. Lips. 50.
 Bohadsch, I. T. *Beschreibung — böhmischer Pflanzen.* 8. Prag, 55.
 Bolton, I. *History of Funguses.* 3. vol. 4. Lond. 89.
 Bonnet, C. *Recherches sur l'usage des Fenilles.* 4. Leid. 54.
 Broughton, *Enchiridion bot.* 8. Lond. 32.
 Broussonet, *Opusc. de P. Rich. Belleval.* 8. Par. 85.
 Bruce, I.
 Brugiere.
 Brugmans, S. I. *De accur. pl. indig. not.* 4. L.B. 87.
 Bryant's, C. *Flora diaetetica.* 8. Lond. 83.
 Buchotz, P. I. *Traité hist. des plantes — 12. vol.* 8. Nancy, 62.
 Bulliard, *Herbier de la France — 106. Cah. fol.* Paris, 80.
 Burgsdorf, F. A. L. v. *Versuch einer vollständ. Gesch. vorzügl. Holzarten.* 2. T. 4. Berl. 87.
 Burmann, N. L. *Flora indica.* 4. Amstel. 68.
 Cappel, I. F. *Verz. der um Helmstedt wildw. Pflanzen.* 8. Dessau, 84.
 Catesby, M. *Natur. history of Carol. — 2. vol.* fol. Lond. 71.
 Cavanilles, A. I. *Dissertationes botanic.* 10. 4. Par. et Moden. 90.
 Celsius, O. *Hierobotanicon. — 2. T. 8. Ups.* 49.
 Commerson.
 Corti, B. *Osserv. sulla Tremell. Lucc.* 74.
 Cothenius, C. A. *Dispositio veget. methodic.* 8. Berol. 90.
 Crantz, H. I. N. *Stirpes austr.* 2. P. 4. Vien. 69.
 Curtis, W. *Flora londinens.* 63. Numb. f. Lond. 90.
 Cusson.
 Cyrillo, D. *Icones plant. rar.* 2. Fasc. fol. Neap. 88.
 Dahl, A. D. *Observationes bot.* 4. Havn. 87.
 Dalibard, T. *Florae Parisiens. prodr.* 12. Par. 49.
 Desfontaines.

VERBENA OFFICINALIS.

Classis et Ordo:

DIANDRIA MONOGYNIA.

Radix lignosa in terram profunde penetrans, fibrosa lutescens.

Caules plerumque plures ex eadem radice, solitarius erectus bi tripedalis, quadrangularis, duo latera excavata duo subconvexa, sulcata, idque alterne, aculeis brevibus armatus, brachiatus.

Folia opposita conjugata sessilia, ad basin angustiora, laciniata: laciniis lateralibus minoribus, media longiore, superiora tripartita, suprema fere simplicia; inciso dentata, rugoso-venosa, scabriuscula.

Flores in spicas longas filiformes erectas terminales dispositi alterni, bractea ovata-lanceolata acuminata, calyce brevioris suffulti (1), inferiores remotiores, superiores magis approximati.

CAL. *Perianth*, monophyllum angulatum tubulatum 5-dentatum: denticulo quinto truncato (2); persistens.

COR. monopetala inaequalis purpurascens, tubus cylindraceus rectus longitudine calycis, mox dilatatus incurvatus (3), limbus patens semi 5-fidus: laciniis rotundatis subaequalibus (5), faux tumidiuscula villis clausa (4).

STAM. *Filamenta* quatuor, intra tubum corollae latitantia, quorum duo breviora reliquis (ejusdem formae cum Didynamiis); antherae quatuor incurvae.

PIST. *Ovarium* tetragonum; stylus longitudine fere tubi, apice paululum incrassatus (7); stigma obtusum.

SEM. quatuor calyce coercita (8) oblonga, obtusa (9), externe convexa albido-fusca, interne planiuscula (per lentem sulcato-reticulata).



Verbena officinalis.

**NAHMEN UND SCHRIFTEN VON KRÄU-
TERFORSCHERN
des 18 Jahrhunderts.**

- Déville, Hist. de plantes de l'Europe. 2. Tom.
8. Lyon, 53.
- Dickson, I. Fascic. pl. cryptog. Britann. 2 Fasc.
4. Lond. 90.
- Dietrich, C. F. Ant. Gründ. d. Pflanz. 8. Leipz. 85.
- Dillenius, I. I. Hist. muscorum. 4. Oxon. 41.
(Lond. 68.)
- Dolomien.
- Dombey, I.
- Döhren, I. v. Icones plant. 4. Fasc. fol. Hamb. 77.
- Dörrien, C. H. Verz. o. n. nass. Gewächse. 8.
Herb. 77.
- Dryander.
- Du Chesne, Hist. natur. des Fraisiers. 12. Par. 66.
- Du Hamel, d. M. Traite des arbres. 4. Par. 55.
- Durande, Flore de bourgog. 2 Part. 8. Dijons, 82.
- Duroi, I. P. Harbkesche wilde Baumz. 2. T. 8.
Braunschw. 72.
- Edwards, I. The brittish herb. fol. Lond. 70.
- Ehret, G. D. Plantae rariores. fol. Lond. 50.
- Ehrhart, F. Beitr. zur Naturk. 5. B. 8. Hann. 90.
- Ellis, I. De Dionaea muscip. 4. Lond. 69. (Er-
lang. 80.)
- Elwert, I. C. P. Fasc. plant. e Flor. Margr. Ba-
ruth. 4. Erl. 86.
- Enslin, I. C. De Boletis suaveolente. 4. Manh. 85.
- Eschenbach, I. F. Observationes bot. 4. Lips. 84.
- Eitlinger, A. E. De Salvia 4. Erlang. 77.
- Fabricius, P. C. Enum. meth. pl. h. m. Helmst.
8. Helmst. 63.
- Fenillee, L. Journal des Observ. 2. T. 4. Par. 25.
- Feldner, M. I. N. Prodr. hist. fung. agri vindob.
8. Vind. 75.
- Fontana, F. Saggio di osserv. sopra la Tremel-
la. 4. Flor. 75.
- Forskoehl, P. Flora aegyptiaco-arab. 4. Havn. 76.
- Forster, I. R.)
- Forster, G.) Charact. gen. pl. 4. Lond. 76.

SELINVM CARVIFOLIUM.

Classis et Ordo:

PENTANDRIA DIGYNIA.

RADIX fusiformis (1) lignosa, superne ramosa: odorata.

CAULIS 2 - 3 pedalis erectus strictus, 10 - sulcatus (2): angulis membranaceis, ad ramificationes praesertim sub umbella undulato flexuosis (3).

FOLIA erecta triplicato - pinnata: petiolis subtetragonis supra sulco exaratis (5), basi membranaceis vaginantibus, nervosis seu striatis, foliolis oppositis bi - tribolis (4), intermediis hinc inde etiam simplicibus: locis lanceolato - acuminatis, mucrone albido cartilagineo.

CAL. Umbella universalis plano - aequalis, maturo fructu convexa; radiis numerosis composita, sulco superne exaratus (6); partialis consimilis.

Involucrum universale (7) in virgineis umbellis saepe polyphyllum, in florentibus autem 1 - 3 phyllum: foliolis lanceolato - subulatis, unico alterove exceptis, mox deciduis; parziale (f. involucella) polyphyllum (8) patens: foliolis subulatis.

COR. universalis uniformis; flosculi omnes fertiles, exteriores paulo majores, ante expansionem purpurascens (9), dein albi.


Propria petalis quinque subaequalibus erectiusculis, inflexo - cordatis (10).

STAM. Filamenta quinque capillaria corolla duplo longiora; antherae subrotundae.

PIST. Germen inferum (11); styli suberecti breves, demum longiores, fructu maturescente in semicirculi formam reflexi (12) persistentes.

PER. O. Fructus ovalis compressus striatus: apice purpureo stylisque reflexis coronatus (12).

SEM. duo lateribus a se invicem discedentia, nervis dorsalibus tribus eminentibus notata (14) lateribus compressis submembranaceis.



Selinum carvifolium

Volcarti No 9

NAHMEN UND SCHRIFTEN VON KRÄU-
TERFORSCHERN
des 18. Jahrhunderts.

- Fraser, I. History of the Agrost. Corn. cop. fol.
Lond. 89.
- Filassier, Diction. du jardinier françois. 2. vol.
8. Paris, 90.
- Fothergill, I.
- Gärtner, I. De fructib. et seminibus. pl. 7. Cent.
4. Tub. 90.
- Garridel, P. Hist. des plantes. fol. Aix. 25.
- Garsault, F. A. d. Figures des plant. 5. v. 8. Par. 64.
- Gattenhof, G. M. Stirp. Heidelberg. 8. Heid. 82.
- Gerard, L. Flora Gallico - provinc. 8. Paris, 61.
- Gesner, I. Phytograph. sacra. 7. P. 4. Tigur. 66.
- Geuns, S. I. v. Plant. Belg. conf. ind. spicil. 8.
Hard. 88.
- Giesecke, P. D. Termini botanici. 8. Hamb. 81.
- Gilibert, I. E. Plant. rar. Lithuan. 8. Col. All. 85.
- Ginnani, Delle piante. 2. vol. fol. Venez. 57.
- Gleditsch, I. G. Method. Fungor. 8. Berol. 53.
- Gleichen, W. F. Auserl. mikr. Entd. 4. Nbg. 80.
- Gloxin, B. P. Observat. botan. 4. Argent. 85.
- Gmelin, I. F. Enumer. stirp. Tubing. 8. Tub. 73.
- Gmelin, I. G. Flora sibirica. 4. T. 4. Petrop. 69.
- Gmelin, S. G. Hist. Fucorum. 4. Petrop. 47.
- Goethe, I. W. v. Vers. die Metam. die Pflanz.
zu erklären. 8. Goth. 90.
- Gorter, D. d. Flora vii provinc. — 8. Harl. 81.
- Gouan, A. Illustrat. botanic. fol. Tigur. 73.
- Gnetard, I. H. Observations sur les plantes.
2. P. 12. Paris, 48. (Flor. stamp.)
- Grimm, I. F. C.
- Gronov, I. F. Flora virginic. Lugd. Bat. 8. 39.
4. 62.
- Gunner, I. E. Flora norveg. 2. P. f. Nidros. 66.
- Hacquet, B. Plant. alp. Carn. 4. Vien. 82.
- Haënke, T.
- Hagen, C. G. Tentamen hist. Lich. 8. Reg. mont.
82.

IUNCUS ALBIDUS.

Classis et Ordo:

HEXANDRIA MONOGYNIA.

Radix lignosa teres obliqua, fibris cirrosis fuscis nigricantibus (1).

Folia radicalia numerosa emarcescente (2) ad radicem in nigricantes setosas fibrillas resoluta, culmo breviora.

Culmus 1 - 2 pedalis erectus teres striatus foliatus, 4 - 5 nodis (3). Folia culmea vaginantia latiuscula nervosa, longissime acuminata, marginibus et ligulae loco (4) pilis longis hirsuta. Folia duo floralia corymbos arcuatim superantia vel adaequantia angustiora minus pilosa (5).

Corymbi subconvexi erecti (8) demum nutantes (9). Pedunculi numerosi alterni longi inaequales, bracteis membranaceis lanceolatis vaginantibus pilosis cincti basi (6), apice in pedicellos fere capillares divisi et subdivisi, squamulis exiguis membranaceis sub calyce obvallatos. Flores fasciculati solitarii vel umbellati, ex stramineo albidis, hinc inde subspadicei.

CAL. *gluma* bivalvis (10).

Perianthium hexaphyllum: foliolis inferioribus tribus brevioribus (12) interioribus longioribus lanceolatis (11).

COR. nulla.

STAM. *filamenta* sex brevissima capillaria (14); antherae oblongae erectae, longitudine perianthii.

PIST. *Germen* subtriquetrum (13) acuminatum; stylus filiformis; stigmata tria longa filiformia, villosa inflexa.

PER. *Caps.* subtriquetro ovata, fusca breviter mucronata (15) trivalvis (15.)

SEM. ovata carinata (16).



Juncus albidus.

NAHMEN UND SCHRIFTEN VON KRÄU-
TERFORSCHERN
des 18 Jahrhunderts.

- Hales, St. Vegetable statiks — 8. Lond. 27.
Haller, A. v. Hist. stirp. Helvet. 3. T. fol. Bern. 68.
Happe, T. C. Plantae selectae. 4. F. fol. Berl. 89.
Hasselquist, F.
Hebenstreit, I. E. Definitiones plant. 4. Lips. 31.
Hecker, I. I. Spec. flor. Berol. 3. Cent. f. Berl.
65.
Hedwig, I. Stirpes cryptogam. 3. vol. fol. Lips.
91.
Heim.
Helenius, C. N. De Hippuride. Aboe, 86.
Heritier, l', Cornus. fol. Paris, 88.
Hermann, I. De Rosa. 4. Argent. 62.
Hill, I. The vegetable system. 26. vol. fol. Lond.
59.
Hirschfelds Garten - Calender. 12. 90.
Holm, I. d' Holmskiold, Fungi danici. tab. 30.
fol.
Honckeney, Verz. aller Gewächse Teutschl. 1. B.
8. Leipz. 82.
Hoppe, T. C. Geraische Flora. 8. Ien. 74.
Hoppe, D. H. Ectypa plant. ratisbon. 6. Cent.
fol. Regensb. 90.
Hornstedt, Nova genera plant. 4. Ups. 81.
Horvatovsky, Flora tyrnaviensis. 8. Tyrn. 75.
Host, N.
Houstoun, G. Reliquiae — 4. Lond. 81.
Houttuyn, M. Natuurlyke historie — Tweede
Deel, 14. vol. 8. Amsterd. 83.
Hudson, G. Flora anglica. 8. Lond. 78.
Hunters, H. E. S. Evelyn's sylvia. 2. vol. 4. Lond.
86.
Iacob's, E. Cat. of the plants about Faversham. 8.
Lond. 77.
Iacquin, N. I. d. Flora austriaca. 5. Cent. fol.
Vind. 73.

STELLARIA ALSINE.

Classis et Ordo:

DECANDRIA TRIGYNIA.

Radix fibrillosa (1) terrae arcte inhaerens.

Caules plures palmares pedales, debiles flacidi decumbentes tetragoni (1. 2) laeves dichotomi parum ramosi. Rami tenuissimi sparsi nonnunquam apice floriferi.

Folia opposita connata sessilia (3) ovato, lanceolata, basi ciliata, apice fusco callosa, ad latera subreflexa, tenera laevia, pallide viridia.

Flores laterales, raro terminales pedunculati parvi albi. Pedunculi simplices aut compositi, ut plures pedicelli ex uno pedunculo communi egrediantur (4), semipolicares ad pollicares, superne incrassati (5), floriferi erecti, fructiferi divaricatissimi deflexi, bracteis duabus lanceolato-setaceis membranaceis albidis ad basin et divisiones instructi.

CAL. *Perianth.* persistens 5 - pyllum: laciniis patentibus lanceolatis acutis laevibus viridibus (6) concavis.

COR. *Petala* 5, calyce breviora, stellatim expansa, laciniis calycinis incumbentia, ad unguem usque bipartita (7): laciniis divaricatis obovatis albis.

STAM. *Filamenta* 10, subulata alba alterna: 5 unguibus petalorum (7), 5 totidem glandulis germen cingentibus insertis (8); antherae subrotundae flavescentes.

PIST. *Cermen* subrotundum glandulis 5 cinctum (8); styli tres capillares recurvato-patentes; stigma obtusa (9) alba.

PER. *Capsula* ovata tecta (10), unilocularis 6 - valvis (10).

SEM. plurima subrotunda compressa rugosa (11), parvo receptaculo affixa (12.)



Stellaria Alfine.

7 November 1870.

NAHMEN UND SCHRIFTEN VON KRÄU- TERFORSCHERN

des 18. Jahrhunderts.

-
- Ialm, A. F. Plant. circa Lips. nuper. invent.
4. Lips. 74.
- Jughenhouz, I. Experiments upon veget. -- 8.
Lond. 79.
- Junghans, P. C. Icones plantar. 1. Cent. f. Hal.
Sal. 87.
- Iussien, A. L. Genera plantarum. 8. Paris, 89.
- Isert, P. E.
- Kalm, P.
- Kerner, I. S. Flora stuttgartiens. 8. Stuttg. 86.
- Kniphof, I. H. Botanica in originali. 12. Cent.
fol. Hal. Magd. 63.
- Knoop, I. H. Pomologia -- 2. T. fol. Amsterd. 71.
- Koelle, I. L. Spicil. observ. de Aconit. 8. Erl. 88.
- Kölpin, A. B. Flor. gryph. suppl. 8. Gryph. 69.
- Koelreuter, I. G. Das Geschlecht der Pflanzen
betreff. Vers. 8. Leipz. 61.
- König, I. C.
- Kramer, I. G. Tentamen bot. fol. Vien. 44.
- Kramer, G. H. Elenchus veget. 8. Vien. 56.
- Krapf, K. v. Beschreibung der österreichisch.
Schwämme. 2. H. fol. Wien, 82.
- Krascheninikow, St. Flora ingrica. 8. Petrop. 61.
- Krocker, A. I. Flora silesiaca. 2. T. 8. Vratis-
lav. 87.
- Lachenal, W. d. Observat. bot. 4. Basil. 76.
- Lagerström.
- Lagusi, V. Erbario italo sicul. 4. Palermo, 43.
- Laicharding, I. N. E. v.
- Lamarck, Flora Française. 3. T. 8. Par. 88.
- Lammersdorf, I. A. De filicum fructif. 8. 81.
- Latourrette, A. L. Chloris lugdunensis. 8. 85.
- Lauth, T. De Acere. 4. Argent. 81.
- Lee's, I. Introduction to Botany. 8. Lond. 88.
- Leer's, I. D. Flora herbomensis. 8. Herb. 75.
- Lettsom, I. C. The Works of Fothergill. 2. vol.
8. Lond. 83.

FRAGARIA STERILIS.

Classis et Ordo:

ICOSANDRIA POLYGYNIA.

Radix perennis nigricans sublignosa fibrosa (1).

Caules plurimi spithamei procumbentes crassi suffruticosi, stipulis hirsutis tecti (2).

Folia surculis annotinis prodeunt cespitosa, petiolis longis villosis (3) sustentata, ternata: foliolis obovatis serratis pilosis subtus pallide viridibus subsericeis. Stipulae radicales plurimae ovato-acuminatae membranaceae. Pedunculi plurimi ascendentes teretes pilosi biflori, bractea trifoliata instructi (4). Flores albi parvi.

CAL. *Perianth.* 1 - phyllum planum, basi incrassatum semi 10 - fidum: laciniis 5, ovato-acuminatis inter petala iisque longioribus (5), 5 lanceolatis petalis paulo brevioribus (12), omnibus pilosis.

COR. *Petala* 5, alba obcordata calyci aequalia inserta, patentia (6).

STAM. *Filamenta* numerosa, 20 circiter in orbem posita subulata albida (7), calyci inserta (5) corolla breviora, primum inflexa demum erecta; antherae flavae biloculares.

PIST. *Germina* numerosa minima in capitulum collecta (8) subreniformia (9); styli simplices lateri germinis inserti (10); stigmata depressa simplicia (11).

Bacca exsucca; receptaculum floris intra germina et filamenta glandulosum, villosum miniatum.

Semina plurima exsucca in capitulum collecta, e flavo fusca, appendiculo subvillosa.



Fragaria sterilis.

NAHMEN UND SCHRIFTEN VON KRÄU-
TERFORSCHERN
des 18 Jahrhunderts.

- Leysser, F. W. A. Flora halensis. 8. Hal. Sal. 83.
Lichtenstein, G. R. Anleit. zur Kräuterk. 2. T.
8. Helmst. 82.
Lightfoot, I. Flora scotica. 2. vol. 8. Lond. 77.
Lieblein, F. C. Flora fuldensis. 8. Francof. 84.
Lindern, F. B. v. Hort. Alsat. 8. Argent. 47.
Link, H. F. Florae goetting. spec. 8. Gött. 89.
Linné, C. a. P. Hortus cliffort. fol. Amstel. 37.
Linné, C. a. F. Decas I. II. plant. rar. hort. Ups.
62.
Luders, F. W. A. Nomenclat. bot. stirp. March.
Brand. 8. Ber. 86.
Ludwig, C. G. Definit. plant. 8. Lips. 60.
Ludwig, C. F. Delect. opusc. ad scient. natur.
spect. v. I. 8. Lips. 99.
Lueder, F. H. H. Botanisch - pract. Lustgärtn.
4. B. 8. 86.
Lumnitzer, St. Flora posoniensis. 8. Lips. 91.
Lundmark, P. Restio. 4. Ups. 88.
Lyons, I. Fasc. plant. Cantabr. 8. Lond. 63.
Manger, Systematische Pomologie. 4. Würzb. 81.
Maratti, I. F. De vera flor. exist. in plant. dor-
sif. 8. Rom. 60.
Marsigli, L. F. De generatione Fungor. fol.
Rom. 14.
Marsigli, I. P. Fungi carrariensis hist. 4. Patav.
66.
Masson.
Maerter, F. I. Fundamenta bot. 8. Francof. 89.
Marshall, H. Arbustum americ. 8. Philadelph.
85.
Martius, E. W. Anweis. Pflanzen nach dem
Leben abzudrucken. 8. Wezlar, 85.
Marty'n, I. Hist. plant. rar. 5. Dec. fol. Lond.
28.

Classis et Ordo:

ICOSANDRIA POLYGYNIA.

Radix longe lateque repens, per intervalla fibrosa.

Caulis ascendens 1. 2. pedalis ex tereti compressiusculus geniculatus dilute vel ex viridi purpurascens, superne pubescens scabriusculus.

Folia alterna, inferiora septenata quinquata, superiora ternata vel simplicia; foliola ex ovato lanceolata, acute serrata: denticulis ovato-acutis, apice rubellis; superne viridia pubescentia, subtus ex incano viridia venosa: venis hinc inde rubellis; petiolata: petiolo communi vaginante, basi membranacea caulem amplexante, decurrente (1); in supremis foliis stipulae ovato-subrotundae petiolo annexae (2).

Pedunculi terminales aut axillares pubescentes, longi ramosi saepius 1. 2. flori. Flores stellatim expansi atro-purpurei.

CAL. *Perianthium* monophyllum, 10. fidum maximum, patens, coloratum: laciniis 5 latioribus, 5 angustioribus inferioribus (3), acutis pubescentibus.

COR. *Petala* 5, oblonga acuminata calyci cui inserta minora (4) ejusdemque coloris.

STAM. *Filamenta* 15. 20 subulata calyci inserta (5); antherae nigricantes lunulares, pollinem margine ejaculantes ex virescenti flavum (5).

PIST. *Germine* numerosa subrotunda in capitulum collecta (7); styli simplices breves e latere germinis (7); stigmata simplicia obtusa nigricantia.

PER. O. *Receptaculum commune* seminum ovatum carnosum villosum maximum persistens (8), calyce tectum conniventi (9).

SEM. numerosa acuminata flavescenti-fusca, receptaculum tegentia (10).



Comarum palustre

NAHMEN UND SCHRIFTEN VON KRÄU-
TERFORSCHERN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Mattuschka, H. G. v. Flora silesiaca. 2. T. 8.
Leipz. 76.
- Mayer, P. I. Pomona Francon. 2. T. 4. Nürnberg.
76.
- Medicus, F. K. Philosoph. Botan. 1. H. 8. Manh.
89.
- Meerburg, N. Plantae rariores. fol. Lugd. B. 89.
- Meese, D. Plantar. methodus. 4. Leov. 63.
- Micheli, P. A. Nova plant. gen. fol. Florent. 29.
- Mieg, A. Spec. observ. I. II. 4. Basil. 76.
- Miller, I. Illustrat. system. sexual. 2. vol. fol.
Lond. 77.
- Miller, I. F. Icon. anim. et plant. fol. Lond. 82.
- Miller, P. Figures of plants descr. in the Gardu.
Dict. 2. vol. f. Lond. 71.
- Molina, I. I.
- Mönch, D. C. Enum. plant. Hass. 1. P. 8. Cass.
76.
- Montin, I. Cat. stirp. agri bonon. 8. Bon. 19.
- Monnier, Cat. de plant. de l'Auvergne. 4. Par.
44.
- Morandi, I. P. Hist. — plant. fol. Mediol. 61.
- Martini, F. H. W. Allgemeine Geschichte der
Natur — 10. T. 8. Berl. 90.
- Müller, O. F. Flora Fridrichsthal. 8. Argent. 67.
- Mutis, I. C.
- Murray, I. A. Prodr. stirp. Goett. 8. Gött. 70.
- Moldenhauer, I. H. D. De vasis plantar. — 4.
Traj. ad Viadr. 79.
- Necker, N. I. d. Elementa botan. 3. T. 8. Ar-
gent. 91.
- Nonne, I. P. Flora Erfurtens. 8. Erford. 63.
- Oeder, G. C. Flora danica. 16. F. fol. Hafn. 62.
- Oelhafen, C. C. Abbild. der wilden Bäume u.
Sträucher. 3. T. 4. Nürnberg. 73.
- Ortega, C. G. d. Contin. de la Flora Espanno-
la. T. 5. 6. 84.

VIOLA CONITUM CAMMARUM.

Classis et Ordo:

POLYANDRIA TRIGYNIA.

Radix napiformis nigricantibus fibris praedita, lateralibus aliis, quae singulis annis recentes caules proferunt.

Caulis elongatus 5-6 pedes altus, teres firmus rectus ex viridi purpurascens.

Folia ampla palmato-5-partita (2): segmentis latescentibus, inciso-trifidis: laciniis lato-lanceolatis inciso-dentatis: denticulis brevibus ex ovato cuneiformibus acutis; supra saturatius viridibus, subtus pallidioribus, utrinque glabris; inferioribus longe petiolatis, supremis fere sessilibus.

Spica florum longa laxa, inferius racemoso-ramosa, pedunculis unifloris, floribus hinc inde dilute ex purpureo caeruleis.

CAL. O.

COR. *Petala* 5, inaequalia; supremum galeato-fornicatum elongatum maximum, apice prominente, saepe reflexo, reliquis petalis imminens; lateralia 2 subrotunda opposita conniventia (4), infima 2 oblonga deorsum et antrorsum producta (5).

Nectaria 2, sub petalo fornicato recondita, pedunculata, ore obliquo, cauda recurva (11), dilute hinc inde caerulea.

Squamulae 6, in orbem cum staminibus positae (8), quorum duae superiores apice bifidae, reliquae lineares acutae.

STAM. *Filamenta* plurima subulata (6) basi membranacea latiora; antherae ovatae violaceo-caeruleae.

PIST. *Germina* 3-5, desinentia in stylos, longitudine staminum; stigmata simplicia reflexa (7).

PER. *Capsulae* totidem leguminosae ovato-subulatae apice filiformi rostratae, venis arcuatis striatae, rectae 1-valves, introrsum dehiscentes (9).

SEM. plurima angulata duplici serie margine suturae dehiscentis affixa, depresso-rugosa (10).

NAHMEN UND SCHRIFTEN VON KRAU- TERFORSCHERN

des 18. Jahrhunderts.

-
- Osbeck, P.
Pallas, P. S. Flora rossica. 2 T. fol. Petrop. 84.
Panzer, G. W. Observ. botan. 8. Norimb. 81.
Paterson, W.
Pearson, Microscopical Theatre of Seeds. Lond.
60.
Pereboom, Syst. Plant. 4. Lugd. Bat. 87.
Petagna, V. Instit. botan. 5. vol. 8. Neap. 85.
Feyrouse, de la.
Piccivoli, G. Hort. panciaticus — 4. Firenze, 83.
Planer, I. I. Gattung der Pflanz. 2. B. 8. Goth.
85.
Plaz, A. G. Organ. in plant. part. hist. 4. Lips. 51.
Plenk, I. I. Icon. plant. medic. fol. Vien. 88.
Pollich, I. A. Hist. plant. palat. 3. T. 8. Manh. 76.
Pott, I. F.
Pultney, R. Hist. sketches of the progr. of Bota-
ny in England. 2. vol. 8. Lond. 90.
Poiret.
Quer, I. Flora Espannola. 4. vol. 4. Madr. 62.
Ramspek, I. C. Observat — botan. spec. I. II. 4.
Basil. 52.
Regnault, La Botanique mise à la portée de tout
le Monde. fol. Paris, 74.
Reichard, I. I. Flora moeno. francofurt. 2. P. 2.
Francof. 72.
Relhan, R. Flora cantabrigiens. 8. Cantab. 85.
(Suppl. 2.)
Retzius, A. I. Fasc. observ. bot. 5. fol. Lips. 89.
Reufs, C. F. Compend. botan. 8. Ulm, 85.
Reyger, G. Tentam. flor. Gedanens. 2. T. 8. Dan-
tisc. 64.
Reynier, Memoires — T. 1. 3. Paris, 88.
Römer, I. I. Magaz. für die Botanik — 11 St. 8.
Zürch, 90.
Reisen E. Observ. bot. 4. L. Scan. 49.

TEUCRIUM BOTRYS.

Classis et Ordo:

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Radix annua fusiformis.

Caulis palmaris pedalis diffusus ramosus, pubescens, viscidus.

Folia inferiora longius, superiora brevius petiolata, ambitu e cordato ovata, multifida: laciniis parallelis, 5-fidis, trifidis, bifidis, integris obtusis, subtus nervosis pallidioribus (4).

Verticilli dimidiati 4-9. flori (1): floribus pallide rubris.

CAL. Perianth. 1. phyllum vix semi 5-fidum acutum clausum (2), subaequale apertum (2): lacinia suprema reliquis inter se aequalibus duplo latiore (3); basi hinc gibbum e latere pedunculatum, persistens, pubescens.

COR. 1-petala ringens; tubus cylindraceus brevis in faucem incurvatam desinens (6); labium superius bipartitum, distantibus ad latera laciniis erectis acutis, divaricatum ubi stamina; lab. inferius patens trifidum; laciniis lateralibus figura lacin. labii superioris, erectiusculis; media maxima subrotunda, concava, medio punctis rubris conspersa, dorso marginata (5).

STAM. Filamenta 4, subulata curva, lab. sup. corollae longiora; antherae parvae.

PIST. Germen 4-partitum (7); stylus filiformis, situ et magnitudinis staminum; stigmata duo divaricata.

PER. O. Calyx immutatus in fundo semina fovens (8).

Semina 4, subrotunda glabra punctata (8), parvo receptaculo affixa (ad lentem excavato reticulata).



Teucrium Botrys.

NAHMEN UND SCHRIFTEN VON KRÄU-
TERFORSCHERN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Rose's, Elements of Botany — 8. Lond. 88.
 Rosier, Demonstrat. element. de botanique. 2. v.
 8. Lyon, 73.
 Roth, A. G. Tent. Flor. German. 2. T. 8. Lips. 89.
 Rottböll, C. F. Descr. et ic. rar. plant. fol. Havn.
 86.
 Rousseau's, I. I. and Martyn's Letters on Bot. 8.
 Lond. 87.
 Royen, A. v. Flor. leydens. prodr. 8. L. B. 40.
 Rüling, I. P. Ordines naturales plant. 4. Gött. 74.
 Rumph, G. E. Herbar. amboinense. 7. vol. fol.
 Amst. 51.
 Rupp, H. B. Flora jenens. 8. Ien. 45.
 Ruiz.
 Sabatti, L. Hortus roman. 7. T. fol. Rom. 72.
 Saussure, H. B. Observ. sur l'écorce des feuil. 12.
 Genev. 63.
 Sauvages, F. Method. Folior. 8. La Haye, 51.
 Schaeffer, I. C. Fungor. icones. 4. T. 4. Ratisb. 80.
 Schaeffer, I. C. G.
 Scheuchzer, I. I. Agrostographia. 4. Tigur. 75.
 Schinz, S. Primae lineae bot. fol. Turici, 75.
 Schkuhr, C. Botanisch. Handb. 7. H. 8. Wittenb.
 90.
 Schmidel, C. C. Icon. et anal. plant. fol. Norimb.
 82.
 Schoepf, I. D. Mat. med. american. 8. Erl. 87.
 Scholler, F. A. Flora barbiensis. 8. Lips. 75.
 Schrader, C. F. Gen. plant. select. 8. Hal. 80.
 Schrank, F. v. P. Baiersche Flora 2. B. 8. Münch.
 89.
 Schreber, I. C. D. Beschreibung der Gräser. 2. T.
 fol. Leipz. 69.
 Scopoli, I. A. Flora Carn. 2. T. 8. Vind. 90.
 Secondat, Mem. sur l'hist. nat. de Chêne, fol.
 Paris, 89.

STACHYS GERMANICA.

Classis et Ordo:

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

R a d i x oblonga fibrosa.

C a u l i s erectus 3. 5 pedes actus tetragonus, 4. sulcus, geniculatus tomentosus (1), pallide viridis ad angulos saepe rubellus, simplex, ramosus: ramis oppositis.

F o l i a inferiora cordato . ovata petiolata majora, superiora sensim minora, ovato . lanceolata sessilia opposita reflexa; serrata; serraturis approximatis obtusis, superne triste subtus pallide viridia, utrinque tomentosa, rugoso . venosa.

V e r t i c i l l i densi multiflori floribus dilute purpureis; superiores approximati in spicam, inferiores remoti, omnes tomentosi, bracteis linearibus lanatis (2), interjectis foliolis minoribus lanceolatis interrupti.

C A L. **P e r i a n t h.** 1 . phyllum tubulatum incurviusculum, ex albido tomentosum, striis angulatum semiquinquefidum (3): denticulis rigidis acuminatis gradatim minoribus, tribus latioribus, infimis binis angustioribus, apice coloratis.

C O R. 1 . petala ringens, tubus brevissimus. faux oblonga ad basin deorsum gibba (7); labium superius erectum fornicatum, erosum vel emarginatum (5) villosum; lab. inferius majus trifidum: lacinula intermedia maxima, emarginata replicata pallide rubella (4), lateralibus reflexis (8).

S T A M. **F i l a m e n t a** 4, quorum duo breviora subulata ad latera faucis recurvata (6); antherae didymae flavescentes.

P I S T. **G e r m e n** 4 partitum (9); stylus filiformis situ et longitudine staminum; stigma bifidum acutum.

P E R. o. Calyx persistens fovens

S e m i n a quatuor ovato . angulata (10).



Stachys germanica.

I.N. sc.

**NAHMEN UND SCHRIFTEN VON KRÄU-
TERFORSCHERN**

des 18 Jahrhunderts.

- Segnier, I. F. *Plantae veronenses*. 3. vol. 8. Veron. 45.
- Sennebier, I.
- Sepp, I. C. *Afbeelding van Houten*. 4. T. 4. Amst. 73.
- Sestini, D.
- Sibthorp.
- Smith, I. E. *Plant. icones*. 2. T. fol. Lond. 89.
- Solander.
- Sonnerat, P.
- Sowerby's, *Introduction to Drawing Flowers according to Nature*. Lond. 90.
- Spalanzani.
- Sparrmann, A.
- Stachelin, B. *Observat. — botan.* 4. Basil. 31.
- Stachelin, I. R. *Specim. observat.* 4. Basil. 51.
- Stegman, I. P. *De Artemisiis*. 4. Gött. 75.
- Stillingleet, B. *Miscellan. Tracts*. 8. Lond. 65.
- Suckow, G. A. *Anfang-gr. der angew. Bot.* 2. T. 8. Leipz. 86.
- Swayne, G. *Specimen of Grasses*. Lond. 91.
- Swartz, O. *Nov. gen. et species plant.* 8. Holm. 88.
- Thouin.
- Thunberg, C. P. *Flora japonica*. 8. Lips. 84.
- Timm, I. C. *Flor. Megap. prodr.* 8. Lips. 88.
- Tode, H. I. *Fungi mecklenb. select.* 1. F. 4. Ln. neb. 90.
- Tozzetti, T. *Cat. plant. hort. caes. Florent. fol. Flor.* 48.
- Trew, C. I. *Plantae selectae*. 10. D. f. Norimb. 50.
- Turra, A. *Florae italicae prodr.* Vincent. 81.
- Ucria, B. ab. *Hort. panormitanus*. 8. Panorm. 89.
- Usteri, P. *Delect. opusc. bot.* 1. vol. 8. Argent. 90.
- Vaillant, le.
- Vaillant, S. *Botanicon parisiense*, fol. Leyd. 27.

Classis et Ordo:

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA.

R a d i x perennis fibrosa: fibris pallide fuscis.

C a u l i s erectus rigidus pedalis, purpureus striatus foliosus hirsutus plus minusve ramosus: ramis alternis.

F o l i a alternas sessilia reflexa, inferiora ovato-lanceolata obtusa, superiora angustiora, tortuosa, ramorum linearia suberecta, utrinque scabriuscula viridia.

F l o r e s erecti nunquam sese explicantes, externi purpurei, interni flavescentes cum cavitate in medio; pedunculi alares solitarii vel subramosi, villosi rubelli uniflori, stipulis hinc inde setaceis obsiti.

C A L. communis oblongus imbricatus squamis (1) subulatis erectis apice purpureis, hirsutis laxis, gradatim majoribus (1. 3).

C O R. composita radiata: corollulae hermaphroditae tubulosae in disco (5); femineae ligulatae in radio (4).

P r o p r i a: hermaphrod. infundibuliformes; limbo 5-fido, superne parum ampliato flavicante (5) calyce breviores.

D i s c i l a t e r a l e s numerosae femineae: tubo tenui, limbo oblique truncato (6), longitudine calycis.

F e m i n e a e ligulatae plures lineares erectae, purpureae apice bifidae (4), calyce longiores.

S T A M. hermaphr: Filamenta 5, capillaria brevissima, antherae cylindratae tubulosae (7).

P I S T. hermaphr: Germen minimum coronatum pappo corollula sua longiori (5); stylus filiformis longitudine pappi; stigma bifidum; Femineis germen tenue, pappo longitudine fere aequali (4); stigmata duo tenuissima (7. 4.); Flores discilaterales styli altitudine et pappo femineis aequales (6).

P E R. o. Calyx connivens.

S e m i n a oblonga pallide fusca (8) hirsuta, pappus sessilis (9), *R e c e p t a c u l u m* nudum planum (10).



Erigeron acer.

ANHMEN UND SCHRIFTEN VON KRÄU- TERFORSCHERN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Vandelli, D. Fasc. plant. 4. Olisip. 71.
 Viborg, E. Beschr. der Sandgew. 3. Kopenh. 89.
 Vicat, P. R. Hist. des plantes venen. 3. Iverd. 76.
 Villars, Hist. des plantes de Dauph. 3. vol. 8. Par.
 86.
 Vitmann, F. Summa plant. 3. T. 8. Mediol. 89.
 Vogel, B. C. Plant. rar. suppl. 4. vol. fol. 90.
 Walther, I. Flora Carolin. 8. Lond. 88.
 Walcott, I. Flora brittan. 8. Lond. 79.
 Wangenheim, F. A. I. v. Beschr. nordam. Holz-
 u. Buschart. fol. Gött. 87.
 Warner's, Catal. of the pl. about Woodford. 8.
 Lond. 71.
 Weber, G. H. Spicileg. Flor. gött. 8. Goth. 78.
 Weigel, C. E. Observat. botan. 4. Gryph. 72.
 Weinmann, I. W. Phytanthoza iconographia. 4. v.
 fol. Regensp. 57. (88).
 Weis, F. W. Plant. cryptog. 8. Gött. 70.
 Westons, English Flora. 8. Lond. 75.
 White, I. Eq.
 Wiggers, F. H. Primit. Flor. Holst. 8. 80.
 Wildenow, C. L. Flor. berol. prodr. 3. Berol. 87.
 Wilke, S. G. Flor. Gryph. 8. Gryph. 65.
 Willemet, Phytograph. econom. de la Lorraine,
 8. Nanc. 80.
 Willich, C. L. Illustrat. bot. 8. 66.
 Withering, W. and Stockes, Botanic. Arrang. of
 british Plants. 3. vol. 8. Lond. 90.
 Wolff, N. M. Gen. pl. voc. char. def. 8. Reg. 82.
 Woodville, W. Medical Botany. 4. Lond. 90.
 Wulfen, F. K. a.
 Wulff, I. C. Flora brussica. 3. Regiom. 65.
 Wyttenbach.
 Zannoni, I. Rar. stirp. hist. Bon. 32.
 Zinn, I. G. Cat. plant. hort. gott. 3. Gött. 57.
 Zoega, I.
 Zorn, I. Icon. plant. medic. 6. Cent. 8. Norimb. 79.

HERIGERON CANADENSE.

Classis et Ordo:

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA.

R a d i x fibrosa ramosa flavicans.

C a u l i s erectus cubitalis et ultra, teres sulcatus lacte viridis, setis albidis rectis hirtus (3), paniculatus. Rami alterni alares racemis florum terminati.

F o l i a radicalia ovato-lanceolata trinervia subserrata (1): caulina sparsa patentissima linearilanceolata ciliata (2).

F l o r e s parvi radio albo (6) disco pallide luteo, plurimi, pedunculi ramosi filiformes, ad divisuras plerumque stipulis instructi (4).

C A L. communis ovato-oblongus, cylindricus, squamis imbricatis lanceolatis virescentibus, margine albidis, gradatim majoribus (5).

C O R. composita radiata: coroll. hermaphr. tubulosae in disco, femineae ligulatae in radio.

P r o p r i a: hermaphr. flavescens infundibuliformis: limbo quadrifido (8) patente.

F e m i n e a ligulata linearis erecta, apice bidentata (6), ex albido saepe pallide carnea.

S T A M. hermaphr: Filamenta 4, capillaria brevissima, antherae cylindraceae tubulosae.

P I S T. hermaphr: Germen minimum coronatum pappo capillari (8); stylus filiformis; stigmata apice conniventia demum patentia; femineis germen pappo corollae fere longitudine; stylus capillaris; stigmata duo longissima patentissima (6. 7).

P E R. o. **C a l y x** connivens.

S e m. oblonga, obsolete tetragona, pappo simplici coronata (10).

R e c e p t. nudum subconvexum.



Erigeron canadense

DEUTSCHLANDS FLORA.

— — On peut dire, qu'actuellement la Botanique est une science pleine d'attraits, qui a, comme presque toutes les autres des principes fondamentaux, dont on ne pourra jamais s'écarter; qui a ses points de vue, ses agrémens et son utilité, manifestes, et qui a aussi ses difficultés et ses problèmes. Cette belle science ne consiste pas, comme le vulgaire se l' imagine, dans le talent stérile de retenir par coeur quantité de noms aux plantes mêmes qui les portent; mais elle consiste dans la connoissance intime des végétaux même; de leur organisation; de leurs rapports; des caractères essentiels, qui distinguent constamment les espèces; des traits communs, qui lient ensemble de certaines quantités de Plantes différentes, et donnent lieu à la formation de diverses sortes de groupes, que le Botaniste appellent Classes, Ordres, Familles et Genres; des limites, que la nature a imposées aux variétés, c'est à dire, aux divers changemens, que les circonstances peuvent opérer sur les Plantes — Or, ces diverses connoissances mettront toujours une différence considérable entre le Botaniste, qui les réunit, et le simple Nomenclateur. LAMARCK, Encyclop. T. I. Préface.

VORBERICHT.

Man benutzt das bequeme Format eines Taschenbuchs auf verschiedene Art und zur Verbreitung mannigfaltiger Kenntnisse, um so weniger, glaube ich, bedarf es einer Entschuldigung, daß Liebhabern der Pflanzenkunde unter dieser Gestalt ein allgemeines Verzeichniß deutscher Pflanzen übergeben wird. Die Unbequemlichkeit einen oder mehrere Oktavbände bei Excursionen in der Tasche führen zu müssen, hat gewiß manchen Botaniker abgehalten, an Ort und Stelle eine Pflanze mit den linneischen Characteren, oder mit den Beobachtungen anderer Gelehrten zu vergleichen, und vorkommende zweifelhafte Arten genauer zu untersuchen. Vielleicht betrachtet auch der bloße Naturliebhaber izzt die große Mannigfaltigkeit des Pflanzenreichs aufmerksamer, vergleicht selbst die Kunstausrücke der botanischen Sprache mit denen beschriebenen Gegenständen, und beobachtet so mit Vergnügen manche vorhin übersehene Theile und schönen Verhältnisse. Diese Art, die Pflanzen kennen zu lernen,

VORBERICHT.

ist wenigstens die angenehmste und sicherste; das Gedächtniß faßt die anschaulich gemachten Begriffe sehr leicht auf, ohne jene mühsame Anstrengung zu fühlen, die außerdem mit Erlernung einer trocknen Kunstsprache verbunden zu seyn pflegt. Einige Vorkenntnisse der einzeln Pflanzentheile und des linneischen Systems, nach welchem hier, ohne alle bisher mit mehr oder weniger Glück versuchten Abänderungen, die Pflanzen vertheilt sind, werden für jeden Liebhaber zureichen, sich unsere deutsche, auch in den übrigen Europa großentheils wildwachsenden Pflanzen bekannter zu machen. Die zwölf Monathskupfer und ihre gegenüberstehende ausführliche Beschreibung in botanischer Sprache, sollen diese Absicht und die ersten Versuche des Liebhabers erleichtern. Unter vielen deutschen Pflänzchen, die noch eine gute Abbildung verdienen, wählte ich einige zur Erläuterung der linneischen Classen und botanischen Analyse gleich vorzügliche, die leicht überall aufgesucht werden können, ohne jedoch unter die gemeinern Pflanzen zu gehören. Einige darunter hat man öfters mit ähnlichen Arten verwechselt, Z. E: *Veronica montana*, *Junc. albidus*, *Aconitum cammarum*, *Stellaria alsine*, *Selin. carvifolium*, *Stach. germanica*; die schon deswegen eine Abbildung und

VORBERICHT.

und genauere Zergliederung nicht überflüssig machten. Den einzeln Monathstagen habe ich zur Erweiterung botanischer Kenntnisse und ihren Hilfsmitteln, Nahmen und Schriften von Kräuterforschern des 18 Jahrhunderts beige-
setzt. Bei manchen Gelehrten erlaubte es aber der Raum nicht, eine Schrift nachhaft zu machen, die vielleicht nicht ausschlieslich die Botanik zum Gegenstand hatte, oder in größern gesellschaftlichen Werken zerstreut war.

So lange viele Gegenden Deutschlands noch gar nicht untersucht, oder nicht hinreichend durchforscht sind, läßt sich freilich eine vollständige Flora Deutschlands nicht erwarten; indessen ist wahrscheinlich die Zahl der bekannten Pflanzen beiweiten die größte, und neue Entdeckungen, wenn mit Vorsicht beobachtet wird, dürften überhaupt bei den Pflanzen der 23 ersten Classen schwerer als bei der letztern zu machen seyn. Zudem ist es für jeden Pflanzenforscher einzelner Gegenden bequemer ein allgemeines, wenn schon nicht ganz vollständiges Verzeichniss bei sich zu führen, als solches so lange zu entbehren, bis der glückliche Zeitpunkt eintreten wird, wo sich mehrere Naturforscher zu einem zuverlässigen und vollständigen Register über alle Gegenden un-

VORBERICHT.

sers Vaterlandes vereinigen. Im Ganzen bringt uns doch jedes Jahr der Vollständigkeit näher. Man findet deswegen hier nicht allein alle von Herrn Doctor ROTH in seinem Tentamen Florae Germanicae bereits aufgeführte deutsche Pflanzen (etwan das *Lygeum spartum* ausgenommen, das bisher in Deutschland vergebens, und nach der Versicherung des Herrn Prof. BATSCH niemalsen um Iena ist aufgesucht worden), sondern auch grosentheils die Oesterreichischen, Crainischen, Kärnther, Schlesi-schen, Baierischen, Meklenburgischen, einige Böhmishe, Tyroler und Steyermärkische, und mehrere in einzeln oder gesellschaftlichen Schriften zerstreute Pflanzen oder mir von Gelehrten schriftlich darüber mitgetheilten Nachrichten. Mit dem wärmsten Dank muß ich hier die Beiträge des Herrn Leibmedikus POTT zu Braunschweig, des Herrn Hofrath KERNER zu Stuttgart, des Herrn Doctor PANZER zu Nürnberg, des Herrn Doctor BAUMGARTEN zu Leipzig, des Herrn Botanikus EHRHARD zu Herrenhausen, des Herrn Apotheker HOPPE zu Regensburg, des Herrn P. LEOPOLD NATTERERS zu Füssen, des Herrn Mechanikus SCHKUHR zu Wittenberg anführen.

Einsweilen habe ich auch jene Pflanzen mit denen uns Hr. EHRHART in seinen vorzüglichen
ge-

VORBEICHT.

getrockneten Sammlungen (Phytophylac. — Frut. et Arbor. d. 1 - 12. Herbae d. 1 - 12, Gramina et Calamariae d. 1 - 12.) bekannt gemacht hat, nach ihren Trivialnahmen und Wohnplätzen aufgenommen, ihre weitere Bestimmung wird uns dieser genaue Botaniker in der Folge noch mittheilen. Um aber die Gränzen eines bequemen Taschenbuchs nicht zu überschreiten, mußte ich die mehresten deutschen Alpenpflanzen, und einige den Oesterreichischen und Crainischen Gegenden noch zur Zeit besonders eigenen, so wie das zahlreiche Gefolg der Cryptogamischen Gewächse davon ausschließen. Letztere nehmen ohnedies bei ihrer täglich anwachsenden Menge ein eigenes Taschenbuch ein, das allein der 24 Classe, die seit Linné die größten Veränderungen erfahren hat, bestimmt seyn soll, und dessen man sich füglich getrennt von diesem zu einer Iahrszeit wird bedienen können, wo die übrigen Pflanzen bereits verblühet sind, oder erst anfangen sich zu entwickeln. Das Verzeichniß der erstern muß aber durch diesen Verzug noch gewinnen, da uns die Bemühungen so vieler Gelehrten, eines WULFEN, LAICHARTING, LACHENAL, WYTTENBACH etc. eine vollständigere Kenntniß derselben erwarten lassen.

VORBERICHT.

Bei den wesentlichen Gattungs-Charakteren habe ich die achte von Herrn Hofrath SCHREBER besorgte Ausgabe der linneischen Generum Plant., (vermittelt geneigter Mittheilung des Herrn Herausgebers, selbst die einzeln Bogen der zweiten Hälfte, so wie bei den Arten die vierzehnte von Herrn Hofrath MURRAY besorgte Ausgabe des System. Veget. zum Grunde gelegt. Nur da erlaubte ich mir Abweichungen von den linneischen Ausgaben, wo die genauern Beobachtungen anderer Gelehrten, oder meine eigenen es nothwendig machten. Dabei habe ich die sorgfältigsten Zergliederungen und Zeichnungen mit den allermeisten Gattungen dieses Taschenbuchs verglichen. Man wird aus der nemlichen Ursach hin und wieder mehrere Pflanzen vollständiger bestimmt und auseinandergesetzt, oder auch in den linneischen Schriften noch nicht aufgenommene Arten antreffen. Ihnen sind verschiedene Anmerkungen unten beigefügt.

Mehr als eine vorzügliche Abbildung, (oder in Ermanglung dieser auf eine sichere Ectype oder getrocknete Pflanzensammlung) nachzuweisen, gestattete nur selten der Raum; darunter müssen aber die getreuen und vortreflichen Abbildungen eines CURTIS und BULLIARD den Pflanz.

VORBERICHT.

Pflanzenliebhabern um so willkommener seyn, das solche bisher in Beziehung auf deutsche Pflanzen am wenigsten sind genutzt worden.

Der Geburtsort und ihre Blüthezeit ist bei jeder Pflanze angegeben. Bei seltnern sind Länder und Gegenden nach Angabe eines Floristen, öfters der Name eines Floristen selbst angeführt worden. Aller Bemühung ohnerachtet, mich von der Gewissheit mancher Pflanzen zu überzeugen, wurde ich doch bei verschiedenen Arten oder ihren angeblichen Wohnort in Zweifel gelassen, diesen setzte ich ein Zeichen vor (†) — um solche zur weitem Untersuchung zu empfehlen. Der Sternchen (*) bediente ich mich, um die in dem Marggrafthum Baireuth und um Erlang wildwachsenden, und von Herrn Dr. ELWERT gesammelten Pflanzen (Fascic. plant. e Flora Marggrav. Baruth. —) einzuweilen dadurch anzuzeigen. Eine grössere Vollständigkeit wird sich bei diesen, so wie bei den übrigen Pflanzen in der Folge erreichen lassen.

NACHSCHRIFT.

Da in verschiedenen Gegenden die Einführung eines Calenders den Absatz eines Buches hinderlich ist, so ersuchte ich den Herrn Verf. hier eine Veränderung zu treffen, dabei die Besitzer dieses Taschenbuchs für den Verlust des Calenders, oder vielmehr der botanischen Litteratur entschädiget würden. Diese Einrichtung ist um so vortheilhafter ausgefallen, da mehr Raum zu einer größern Anzahl von berühmten Botanisten und einer genauen Anzeige ihrer Schriften, in jenen Exemplaren ohne **Calendar**, dazu konnte benutzt werden.

der Verleger.

Classis I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

SALICORNIA (Glaschmalz) *Lin. G. pl.*
ed. 8. 14.

Calyx ventriculosus; petala 0; semen i.
1. s. *herbacea*, patula articulis apice
compressis emarginato - bifidis *Lin. syst.*
veget. ed. 14. Flor. dan. t. 303.

Ad salinas, piscinas, littora maritima (Siles.
Austr. Carn. Oldenb. Megap. Holsat. Saxon.
Barbi, Lips. Dresd. Hannoviae, Helmstad. etc.)
Fl. Inl. Aug. (Var. articulis apice crassioribus;
cylindricis; integris.)

† 2. s. *virginica*, herbacea erecta, ramis
simplicissimis L.

Ad fossas salinas (prope Barbi —) Fl. Aug.

2. **HIPPURIS** (Tannenwedel) *G. pl. 15.*

Cal. 0, nisi margo bilobus germen coro-
nans; cor. 0; stigma acutum; semen 1.

H. *vulgaris*, fol. octonis subulatis L.
Curtis Fl. lond.

In fossis piscinis; fl. Iun. Aug. (Semen, nux
apice perforata Hellen. Var. *fluviatilis*
Wigg; *ramosa* Schrank.)

DIGYNIA.

3. **CALLITRICHE** (Wasserstern) *G. pl. 17.*

Cal. 0; cor. 2 - petala; caps. compressa,
4 - sperma.

* 1. *C. verna*, fol. superioribus ovalibus; flor. androgynis L. *Fl. dan.* t. 127.

In aquis stagnantibus, fossis; fl. Maj. Iun.

* 2. *C. intermedia*, fol. superioribus ovalibus, caulinis linearibus apice bifidis. *Schkuhr, bot. Handb.* t. 1. fig. e.

Locis inundatis; fl. cum priori (Flores superiores ut in priori masculi, inferiores feminei.)

* 3. *C. autumnalis*, fol. omnibus linearibus apice bifidis; flor. hermaphroditis L.

In aquis stagnantibus; fl. Autumno (Planta saepius dioica.)

4. BLITUM (Schminkbeere) *G. pl.* 18.

Cal. 3 - partitus; petala 0; calyx baccans; sem. 1.

* 5. *capitatum*, capitellis spicatis terminalibus L. *Schk.* t. 1.

Locis incultis (Siles. carn. Tirol. —) Fl. aestate.

Classis II.

DIANDRIA

MONOGYNIA.

5. LIGUSTRUM (Rheinweide) *G. pl.* 25.

Cor. 4 - fida; bacca 4 - sperma. (Antrum duplicatum biloculare *Med.*)

* *L. vulgare*, fol. lanceolatis acutis, paniculae pedicellis oppositis L. *Fl. lond.*

In sepibus, nemorosis; fl. Iun.

6. SYRINGA (Flieder) *G. pl.* 28.

Cor. 4 - fida; caps. supera compressa lanceolata bilocularis bivalvis; sem. margine membranaceo cincta.

s. *vulgaris*, fol. ovato - cordatis integris L. *Bulliard herbier de la France t.* 265.

Ad sepes variis locis quasi sponte; fl. Apr. Maj. (Var. flore albo.)

7. CIRCAEA (Hexenkraut) *G. pl.* 31.

Cal. 2 - phyllus superus; cor. 2 - petala; caps. 2 - valvis versus apicem dehiscentis, dissepimento exstante.

* 1. *C. lutetiana*, caule erecto, racemis pluribus, fol. ovatis L. *Fl. lond.*

In nemorosis: fl. Iun. — Aug. (Semina loculamentis adnata.

2. *C. intermedia*, fol. ovato - cordatis acuminatis subrepandis dentatis glabris *Ehrh. plant. exsic.* 101.

In sylvis montosis (Brunsvico - Luneb. Lipens. Drib. etc.) Fl. Iun. Iul.

3. *C. alpina*, caule prostrato, racemo unico; fol. cordatis L. *Fl. dan. t.* 210.

In subalpinis, montosis umbrosis (Carn. Carinth. Siles. Bavar. Hercyn. Thuring. Megap. Saxon. Oldenb. Brem. Lips. etc.) Fl. Iun. Iul.

8. VERONICA (Ehrenpreis) *G. pl.* 32.

Cal. 4 - 5 - partitus; cor. limbus 4 - partitus: lacinia infima angustiore; caps. 2 - locularis apice emarginata.

Spicatae.

1. *v. spuria*, spicis terminalibus, fol. ternis aequaliter serratis L. *Iungh. icon. plant.*

Locis umbrosis, montosis (Siles. Bavar. Palat. Thuring. Boruss. Wittenb. Francof. ad moen. — ad viadr. —) Fl. Jun. — Aug. (Var. fol. 2. 4. 3. *v. quadrifolia* SCHK.)

2. *v. maritima*, spicis terminalibus, fol. ternis inaequaliter serratis L. *Fl. dan. t. 374.*

In pratis humidis, ad fluviorum ripas (Siles. Saxon. Holsat. Oldenb. Berol. Barbi, Lips. Wittenb. —) Fl. Jul. Aug.

3. *v. longifolia*, spicis terminalibus, fol. oppositis lanceolatis serratis acuminatis L. *Baumgart. fl. t. 1. (v. Schreberi.)*

In pratis, nemorosis humidis (Siles. Bavar. Boruss. len. Wittenb. Barbi, Lips. etc.) Fl. Jun. Aug.

*4. *v. spicata*, spica terminali, fol. oppositis crenatis obtusis, caule adscendente simplicissimo L. *Fl. dan. t. 52.*

Locis montosis; fl. Jun. — Aug.

5. *v. hybrida*, spicis terminalibus, fol. oppositis obtuse serratis scabris, caule erecto L.

Locis montosis (Siles. Hercyn.) depressis (Hal. Saxon. Roth.) Fl. Jul. Aug.

*6. *v. officinalis*, spicis lateralibus pedunculatis, fol. oppositis, caule procumbente L. *Fl. lond.*

In sylvis, montosis, pascuis; fl. Jun. Jul.

Corym-

Corymboso - racemosae.

* 7. *v. serpyllifolia*, racemo terminali subspicato, fol. ovatis glabris crenatis L. *Fl. lond.*

In pratis, agris; fl. Iun. Iul. (Var. fol. maioribus.)

* 8. *v. Beccabunga*, racemis lateralibus, fol. ovatis planis, caule repente L. *Fl. lond.*

Ad scaturigines, rivulos; fl. Jun. Jul.

* 9. *v. Anagallis*, racemis lateralibus, fol. lanceolatis ferratis, caule erecto L. *Fl. dan. t. 903.*

In fossis, rivulis, locis inundatis; fl. Maj - Sept. (Var. magnitudine.)

* 10. *v. scutellata*, racemis lateralibus alternis: pedicellis pendulis, fol. linearibus integerrimis L. *Fl. dan. t. 209.*

Locis inundatis; fl. Jul. Aug.

* 11. *v. Teucrium*, racemis lateralibus longissimis, fol. ovatis rugosis dentatis obtusiusculis, caulibus procumbentibus L. *Hoppe, ectyp. 196.*

In pratis, ad sepes, etiam in montanis; fl. Iun. Jul. (Var. magnitudine.)

12. *v. prostrata*, racemis lateralibus, fol. oblongo - ovatis ferratis, caulibus prostratis L. *Ehrh plant. 71.*

In collinis apricis, locis graminosis (Siles. Hass. Palat. Hannov. Saxon. Wittenb. Barbi, Berol. Tubing. Goett. Lips. etc.) Fl. Maj. Jul.

13. *v. montana*, racemis lateralibus paucifloris; calyc. hirsutis; fol. ovatis

rugosis crenatis petiolatis, caule debili L.

In montosis umbrosis (Austr. Siles. Bavar. Palat. Hass. Saxon. Holfat. Nassov. Oldenb. Brem. etc.) Fl. Maj. — Jul.

* 14. v. *Chamaedrys*, racemis lateralibus, fol. ovatis sessilibus rugosis dentatis, caule bifariam piloso L. *Fl. dan. t. 448.*

In pomariis, pratis, ad sepes; fl. Maj. Iun.

15. v. *austriaca*, racemis lateralibus, fol. lineari-lanceolatis pinnato-dentatis L. *Jacq. austr. t. 329.*

In pratis, locis umbrosis (Austr. Siles. Carn. Bav. —) Fl. Iun. Iul.

16. v. *urticaefolia*, racemis lateralibus, fol. ovato-lanceolatis hirtis argute serratis, caule erecto L. *Jacq. austr. t. 59.*

In montosis, etiam depressis (Austr. Bavar. —) Fl. Maj. Iun.

17. v. *latifolia*, racemis lateralibus, fol. cordatis rugosis dentatis, caule stricto L.

In montosis, fruticetis (Siles. Carn. Austr. Hercyn. Lips. Tubing. etc.) Fl. Jun. Jul.

Pedunculis unifloris.

* 18. v. *agrestis*, floribus solitariis, fol. cordatis incisissimis pedunculo brevioribus L. *Fl. lond.*

In agris et arvis; fl. aestate.

* 19. v. *arvensis*, floribus solitariis, fol. cordatis incisissimis pedunculo longioribus L. *Fl. lond.*

In arvis, inter segetes; fl. Maj. — Jul.

* 20. v.

* 20. *v. hederæfolia*, flor. solitariis, fol. cordatis planis quinquelobis L. *Fl. lond.*

In agris, ruderatis, cultis; fl. Mart. — Jun.
(*v. Gymbalarifolia* Gmel. *v. Lappago* Schrank. hujus loci —)

* 21. *v. triphyllos* flor. solitariis, fol. digitato - partitis, pedunc. calyce longioribus L. *Fl. dan. t. 627.*

In agris, hortis; fl. Apr. — Jun.

* 22. *v. verna*, flor. solitariis, fol. digitato - partitis, pedunc. calyce brevioribus L. *Fl. dan. t. 252.*

In arvis; fl. Apr. Maj.

23. *v. romana*, flor. solitariis subsessilibus, fol. oblongis subdentatis, caule erecto L. *Allion. ped. t. 85. f. 2.*

In agris, arvis (Carn. — Oldenb. Brem. Roth.)

24. *v. acinifolia*, flor. solitariis pedunculatis, fol. ovatis glabris crenatis caule erecto subpiloso L. *Vaill. t. 33. f. 3.*

In arvis (Nassov. Palat. Bavar. Berol. Francof. —) Fl. Iun.

25. *v. peregrina*, flor. solitariis sessilibus, fol. lanceolato - linearibus glabris obtusis integerrimis, caule erecto L. *Fl. dan. t. 407.*

In agris arvis (Siles. Pom. Gryph. —) Fl. Iun. Iul.

9. GRATIOLA (Gnadenkraut) *G. pl. 37.*

Cal. 5 - partitus; basi auctus foliolis 2 accessoriis; cor. irregularis; stam. 4: 2 sterilia; caps. 2 - locularis.

G. officinalis, fol. lanceolatis serratis, flor. pedunculatis L. *Bull. herb. t. 130.*

In pratis humidis (Siles. Carn. Bavar. Sax. Pom. Holsat. Megap. Hannov. Palat. Berol. Helmstad. Barbi, Ger. Fuld. etc.) Fl. Jun. Aug.

10. PINGUICULA (Fettkraut) *G. pl. 40.*

Cal. bilabiatus 5 - fidus; cor. ringens calcarata; caps. 1 - locularis.

* 1. *P. vulgaris*, nectario cylindraceo longitudine petali L. *Fl. dan. t. 93.*

In pratis, pasculis udis, locis humidis (Bav. Holsat. Mepap. Pom. Thuring. Lips. Helmstad. Ratisb. Gryph. etc.) Fl. Maj. — Jul.

2. *P. alpina*, nectario conico petalo brevior L. *Fl. dan. t. 453.*

In alpinis, etiam montosis (Bav. Carn. Hercyn. —) Fl. Apr. — Jun.

11. UTRICULARIA (Wasserschlauch)

G. pl. 41.

Cal. 2 - phyllus; cor. ringens calcarata; caps. 1 - locularis.

* 1. *U. vulgaris*, nectario conico; scapo paucifloro L. *Fl. dan. t. 138.*

In fossis, paludibus; fl. Jun. Jul.

* 2. *U. minor*, nectario carinato L. *Schmid. icon. t. 21.*

In fossis, aquis stagnantibus minus profundis; fl. Jul. Aug. (Caps. matura transversim, ut in Cent. minimo dehiscens, semina angulosa receptaculo proprio insident Schk. in litt.)

12. VER-

12. VERBENA (Eisenkraut) *G. pl.* 43.

Cal. 5 - dentatus: denticulo intermedio truncato; cor. semi 5-fida incurva; stam. (2-4) intra tubum incurva.

* *v. officinalis*, tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, fol. multifido-laciniatis; caule solitario L. *Bull. herb.* t. 215.

Ad vias in ruderatis; fl. Jul. Sept.

13. LYCOPUS (Wolfsfuss) *G. pl.* 44.

Cor. 4-fida: lacinia unica emarginata; stamina distantia; semina 4 retusa.

* *L. europaeus*, fol. sinuato-serratis L. *Fl. lond.*

Ad ripas, fossas; fl. Iun. — Aug.

14. SALVIA (Salbei) *G. pl.* 50.

Cor. inaequalis; filamenta transverse pedicello affixa; semina 4.

1. *s. sylvestris*, fol. cordato-lanceolatis undulatis biserratis maculatis acutis, bracteis coloratis flore brevioribus L. *Iacq. austr.* t. 212.

Ad margines agrorum (Siles. Bohem. Austr. Saxon. Mansfeld. Barbi, Erford. Ratisb. etc.)

2. *s. nemorosa*, fol. cordato-lanceolatis serratis planis, bracteis coloratis, corollae labio infimo reflexo L.

Hinc inde cum priore cui valde affinis.

* 3. *s. pratensis*, fol. cordato-oblongis crenatis: summis amplexicaulibus, verticillis subnudis; corollis galea glutinosis L. *Hoppe, ect.* 107.

In pratis, versuris; fl. Maj. Iun. (Var. flore albo, caeruleo, purpureo.)

† 4. s. *Verbenaca*, fol. serratis sinuatis laeviusculis; corollis calyce angustioribus L.

In ruderatis, ericetis (Mansfeld. Hal. Saxon. Bavar? —) Fl. Aug.

5. s. *verticillata*, fol. cordatis crenato-dentatis, verticillis subnudis; stylo corollae labio inferiori incumbente L.

Ad margines viarum (Austr. Carn. Bav. Bohem. Thuring. Misn. Siles. Saxon. Dresd. —) Fl. Iul. Sept.

6. s. *glutinosa*, fol. cordato-sagittatis serratis acutis L.

In locis sylvaticis, cultis, lutosis (Siles. Bav. Austr. Carn. etc.) Fl. Iun.

† 7. s. *Sclarea*, fol. rugosis cordatis oblongis villosis serratis, bracteis floralibus calyce longioribus concavis acuminatis L.

In graminosis (Austr. Francof. ad Viadr.) Fl. Iun.

8. s. *officinalis*, fol. lanceolato-subovatis integris crenulatis; flor. interrupto-subverticillatis calycum dentibus aristatis *Wulf.*

In montosis (Carinth. Siles. —) Fl. Iun.

DIGYNIA.

15. ANTHOXANTHUM (Ruchgras) G.
pl. 58.

Cal. gluma 2-valvis 1-flora; cor. 2-valvis aristata, longitudine valvulae calyc. minoris; sem. 1, coroll. glumae adnatum, arista reflexa.

* *A. oderatum*, spica oblonga ovata, flosculis subpedunculatis arista longioribus L. *Leers*, t. 2.

In pratis vulgaris; fl. Maj. Iul. (Var. spica ramosa.)

Classis III.

TRIANDRIA

MONOGYNIA.

16. VALERIANA (Baldrian) *G. pl.* 60.

Cal. 0; cor. 1-petala basi hinc gibba supera; sem. 1.

* 1. *v. dioica*, flor. triandris dioicis, fol. pinnatis integerrimis L. *Fl. dan.* t. 687.

* 2. *v. officinalis*; flor. triandris, fol. omnibus pinnatis (dentatis) L. *Fl. dan.* t. 570.

In nemorosis, humidis; fl. Iun. Iul.

3. *v. Phu*, flor. triandris, fol. caulinis pinnatis, radicalibus indivisis L.

In locis montosis, in pratis (Siles. Tübing. Fuld. —) fl. Iun. Iul.

* 4. *v. olitoria*, flor. triandris, caule dichotomo, fol. oblongis integerrimis; fructu simplici *Wild.*

In agris arvis; fl. Apr. — Jun. (Var. fol. superioribus dentatis.)

5. *v. vesicaria*, calyc. inflatis, dent. 6 inflexis; involucella 5-phylla, 3-flora L.

In agris, arvis; fl. Iul. — Sept.

6. *v.*

6. *v. dentata*, flor. triandris; caule dichotomo, fol. serratis oblongis, semine 3-dentato *Wild.*

In agris, arvis; fl. Jul. — Aug. (Var. dent. 6-12. Caps. 3-locularis; sem. 1. M e d.)

17. **POLYCNEMUM** (Knorpelkraut) *G.*
pl. 72.

Cal. 5-phyllus; cor. 0; pericarp. membranaceum.

P. arvense, caule diffuso, fol. triangularibus *Wild. Schk. t. 5.*

In arenosis, agris (Siles. Austr. Bav. Saxon. Nass. Wittenb. Dresd. Lips. Barbi etc.) Fl. Jul. Aug. (Var. bracteis calycinis 2-3: semen pedicello laterali affixum.)

18. **CROCUS** (Saffran) *G. pl. 75.*

Cor. 6-partita aequalis; stigmata convoluta.

1. *c. autumnalis*, stigmatibus oblique truncatis integris; fol. linearibus margine revolutis *Schrank, Kerner t. 12.*

In montosis (Austr. Bav. —) Fl. Sept. Oct.

2. *c. vernus*, stigmatibus lobato; fol. ensiformibus, margine revolutis *Schrank, Kerner t. 11.*

In pratis montosis (Austr. Bav. —) Fl. vere.

19. **GLADIOLUS** (Siegwurz) *G. pl. 77.*

Cor. 1-petala 6-fida irregularis: laciniis suprema et infima extra vel intra lateralibus; stam. adscendentia.

G. communis, fol. ensiformibus, floribus distantibus *L. Schk. t. 6.*

In pratis sylvaticis (Siles. Carn. Bav. Saxon. Pruss. Dantisc. Erford. Lips. etc.) Fl. Iun. Iul. (Caps. 3 - valvis duplicata: pericarpio membranaceo M e d.)

20. IRIS (Schwertlilie G. pl. 79.

Cor. 1 - petala 6 - partita: petalis alternis reflexis; stylus petaliformis; stigma labium inferius.

* 1. *I. germanica*, barbata, fol. ensiformibus glabris falcatis brevioribus, scapo multifloro L. *Bull. herb. t. 141.*

In nemorosis (Siles. Carn. Bavar. Palat. Saxon. Ratisb. Erford. Fuld. Helmstad. Lips. etc.) Fl. Maj. Jun.

* 2. *I. sambucina*, barbata, fol. ensiformibus glabris erectis brevioribus, scapo multifloro; petalis deflexis planis L. *Iacq. hort. t. 2.*

In hortis gramineis (Siles. — K r o c k.) Fl. Maj. — Iun.

3. *I. squalens*, barbata, fol. ensiformibus glabris erectis brevioribus, scapo multifloro; petalis deflexis replicatis L.

In collibus, pratis (Siles. Tübing. —) Fl. Iun.

4. *I. pumila*, barbata, fol. ensiformibus glabris, scapo unifloro, petalis oblongis obtusis L. *Iacq. austr. t. 1.*

Locis editioribus apricis (Austr. Erford. —) Fl. Maj. Iun.

5. *I. pseud - Acorus*, imberbis, fol. ensiformibus; petalis alternis stigmatibus minoribus L. *Schk. t. 5. a. b.*

Ad ripas fluviorum, locis paludosis; fl. Iun. Iul. (Styli 3 petaliformes; stigma labium inferius proprii styli petaliformis Schk. l. c.)

* 6. 1.

* 6. *i. sibirica*, imberbis, fol. linearibus, scapo subtrifloro tereti; germinibus trigonis L. *Iacq. austr. t. 3.*

In pratis humidis (Siles. Austr. Carn. Saxon. Bav. Palat. Hass. Hannov. Pruss. Lips. Ien. Erford. Barbi etc.) Fl. Maj. Iun.

7. *i. graminea*, imberbis, fol. linearibus, scapo subbifloro ancipiti; germinibus hexagonis L. *Iacq. austr. t. 2.*

In locis montosis (Siles. Austr. Carn. Bavar. —) Fl. Iun. Iul.

8. *i. spuria*, imberbis, fol. linearibus, scapo subtrifloro tereti; germinibus hexagonis L. *Iacq. austr. t. 4.*

In pratis (Austr. Erford. Gerae, Lips. schk.) Fl. Iul.

21. SCHOENUS (Knopfgras) G. pl. 92.

Glumae paleaceae univalves congestae; sem. 1, inter glumas.

1. *s. Mariscus*, culmo tereti, fol. margine dorsoque aculeatis L. *Ehrh. phyt. 21.*

In pratis udis, paludibus (Siles. Carinth. Holsat. Megap. Hannov. Lips. Erford. Goett. etc.) Fl. Iul. Aug. (Stam. 2; semen nucamentaceum.)

2. *s. nigricans*, culmo tereti nudo, capitulo ovato, involucri diphylli valvula altera subulata longa L. *Ehrh. gram. 102.*

In pratis udis montosis (Siles. Austr. Bav. Palat. Holsat. Megap. Driburg. Ratisb. Francof. etc.) Fl. Maj. — Aug. (Stam. 2.)

† 3. *s. ferrugineus*, culmo tereti nudo, spica duplici, involucri valvula maiora spicam aequante L.

In pratis udis, subalpinis (Siles. — K r o c k.)
Fl. Iul. Aug.

4. s. *fuscus*, culmo tereti folioso, spiculis subfasciculatis; fol. filiformibus canaliculatis L.

In paludosis turfosis (Palat. Oldenb. Hannov. —) Fl. Iul. Aug.

* 5. s. *albus*, culmo subtriquetro folioso, fol. canaliculatis carinatis subulatis; flor. fasciculatis Roth. Schk. t. 7.

In paludosis turfosis; fl. Iun. — Aug. (Recept. in priori setis 3, in hoc setis 10 obvallatum.)

* 6. s. *compressus*, culmo subtriquetro nudo, spica disticha, involucro monophyllo L. Poll. Palat. t. 1. fig. 2.

In pratis uliginosis (Carinth. Hass. Palat. Hol-
sat. Hannov. Saxon. Megap. Nassov. Lips. etc.)
Fl. Maj. Iun. (Scirpus Caricis Retz. Wil-
den. Ley s. Roth. Stam. saepe 2; stigma 2-
fidum.)

22. CYPERUS (Zypergras) G. pl. 93.

Glumae paleaceae distiche imbricatae;
sem. 1, nudum.

* 1. c. *flavescens*, culmo triquetro nudo, umbella triphylla, pedunc. simplicibus inaequalibus, spicis confertis lanceolatis L. Schk. t. 7.

Locis udis paludosis; fl. Iun. Iul. (Var. p u m i l a.)

* 2. c. *fuscus*, culmo triquetro nudo, umbella trifida, pedunc. simplicibus inaequalibus, spicis confertis linearibus L. Schk. t. 7.

Locis paludosis; fl. cum priori.

3. c.

3. *c. virescens*, culmo triquetro, umbella universalis triphylla, spicis compressis *Krock. 1. t. 13.*

Locis montosis (Siles. — *an compressus* L. ?) Fl. Iul. Aug.

23. *scirpus* (Binsengras) *G. pl. 94.*

Glumae undique imbricatae concavae; semen 1.

Spica unica.

† 1. *s. articulatus*, culmo tereti nudiusculo semigeniculato, capitulo glomerato laterali L.

Locis paludosis inundatis (Lips? *BAUMGARTEN.*) Fl. Iun. Aug.

* 2. *s. palustris*, culmo tereti nudo, spica subovata terminali L. *Leers t. 1. fig. 3.*

In fossis locis inundatis; fl. Maj. Iun. (Var. *magnit. Stigm. 2; sem. triquet. 4 setis obvallatum.*)

3. *s. cespitosus*, culmo striato nudo, spica bivalvi terminali longitudine calycis; radicibus squamula interstinctis L. *Krock. 1. t. 14.*

In uliginosis: fl. Iun. — Aug. (Sem. albis prominentibus setis obvallatum.)

4. *s. Boeothryon*, culmo tereti striato nudo, basi vaginato: vagina truncata; spica terminali pauciflora bivalvi: valvulis ovatis, spica brevioribus, margine scariosis: exteriori breviori *Ehrh. phyt. n. 31. Fl. dan. t. 167.*

Locis inundatis (Hannov. Oldenb. Mecklenb. Megap. Berol. etc.) Fl. Iun.

5. *s.*

5. *s. capitatus*, culmo tereti (compresso) setiformi, spica subglobosa (nuda) terminali L.

In stagnis limosis (Siles. Saxon. Francof. Lips. Jen. Hannoviae —) Fl. Jun. (Setae recept. 6; stam. 2; styl. 2 - fidus Ehrh.)

* 6. *s. acicularis*, culmo tereti nudo setiformi, spica ovata bivalvi; seminibus nudis L. Fl. dan. 287.

In aquis, piscinis; fl. Jul. Aug.

7. *s. fluitans*, culmis teretibus nudis alternis; caule folioso flaccido L. Ehrh. gram. 11.

Locis udis, subalpinis (Siles. Hannov. —) Fl. Jun.

Culmo tereti polystachio.

* 8. *s. lacustris*, culmo tereti nudo, spicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus L. Ehrh. gram. 112.

In aquis stagnantibus; fl. Jun. Jul. (Var. min.)

9. *s. Holoschoenus*, culmo tereti nudo, spicis subglobosis glomeratis pedunculatis, involucrio diphylo inaequali mucronato L.

In pratis humidis (Siles. Carniol. Austr. Barbi.) Fl. Jun. Jul.

* 10. *s. setaceus*, culmo nudo setaceo, spicis lateralibus subsolitariis sessilibus pedunculatisque Roth. Leers, t. 1. fig 6.

In pratis humidis, stagnis; fl. Jun. — Aug. (Sem. nucamentaceum striatum setis destitutum; var. spicis terminalibus subternis mucrone longit. spicae vel longiori Rottb. ic. t. 15. f. 5, 6.

Culmo triquetro, panicula nuda.

11. *s. glomeratus*, culmo triquetro nudo, spica oblonga congesta terminali; sub spicis folium trigonum fere horizontale Scop.
In fossis, inundatis (Carn. Lips. BAUMG.) Fl. Jun. Jul.

12. *s. mucronatus*, culmo triangulo nudo acuminato, spicis conglomeratis sessilibus lateralibus L. Ehrh. *gram.* 2.

Ad ripas limosas (Austr. Carn. Bavar. Palat. Brem. Oldenburg.) Fl. Jul. Aug. (Scirp. triquet. ROTH.)

Culmo triquetro, panicula foliacea.

13. *s. maritimus*, culmo triquetro, panicula conglobata foliacea; spicularum squamis trifidis: intermedia subulata L. Ehrh. *gram.* 12.

Ad ripas fluviorum, ad littora marina, in paludosis; fl. Jun. Jul. (Var. minor Krock. 1. t. 15.)

* 14. *s. sylvaticus*, culmo triquetro folioso, umbella foliacea, pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis L. Leers, t. 1. fig. 4.

In sylvis humidis; fl. Maj. Jun.

15. *s. michelianus*, culmo triquetro capitulo globoso, involucri polyphylo longo Schk.

Ad ripas fluvii Elbe (Wittenb. Schkuhr.) Fl. Sept.

24. ERIOPHORUM (Dungras) G. pl. 95.

Glumae undique imbricatae; semen in pappo longissimo cinctum.

* 1. *E. vaginatum*, culmis vaginatis teretibus, spica scariosa L. *Fl. dan. t. 236.*

In turfosis, paludosis; fl. Jun. Jul.

* 2. *E. polystachion*, culmis teretibus, foliis planis, spicis pedunculatis L. *Leers, t. 1. fig. 5.*

In uliginosis; fl. Maj. — Jul. (Etiam polygam. occurrit.)

3. *E. angustifolium*, culmis teretibus, foliis canaliculato-triquetris, spicis pedunculatis *Roth.*

Locis uliginosis (Hercyn. Saxon. Francof. etc.)
Fl. Apr. — Maj. (Affinis priori.)

4. *E. alpinum*, culmis nudis triquetris, spica pappo brevior L. *Fl. dan. t. 620.*

In montosis (Siles. Bavar. Tirol. Carn. Hanov. Hercyn. —) Fl. Jun. — Jul.

25. NARDUS (Borstengras) *G. pl. 97.*

Cal. 0; cor. 2-valvis, unilateralis, rach. alternatim denticulatae insidens.

* *N. stricta*, spica setacea recta secunde L. *Schreb. t. 7.*

Locis sterilibus; fl. Maj. Iun.

DIGYNIA.

26. ALOPECURUS (Fuchsfchwanz) *G. pl. 102.*

Cal. 2-valvis; cor. 1-valvis, marginibus basi coadunatis.

* 1. *A. pratensis*, culmo spicato erecto; glumis villosis, corollis muticis L. *Schreb. t. 19. fig. 1.*

In pratis; fl. Maj. — Aug.

* 2. *A. agrestis*, culmo spicato erecto; glumis laevibus L. *Schreb. t. 19. fig. 2.*

In agris; fl. Maj. — Aug.

* 3. *A. geniculatus*, culmo spicato infracto; corollis muticis L. *Leers, t. 2. fig. 7.*

Locis uliginosis, inundatis; fl. Maj. Jun.

4. *A. paniceus*, panicula subspicata; glumis villosis, corollis aristatis L. *Fl. dan. t. 861.*

Locis cultis, montanis (Siles. Hercyn. Carn. Pomer. Erford. Gryph. —) Fl. Jun. Jul.

27. PHALARIS (Glanzgras) *G. pl. 106.*

Cal. duplex uniflorus; exterior carinatus; interior lanceolatus pubescens; sem. 1, corollae adnatum.

1. *P. canariensis*, panicula subovata spiciformi; glumis navicularibus *Schreb. t. 10. f. 2.*

In pratis, locis incultis (Siles. Hass. Saxon. Nassov. Lips. Berol. Erford. —) Fl. Maj. — Jul.

* 2. *P. phleoides*, panicula cylindrica spiciformi glabra, passim vivipara L. *Fl. dan. t. 531.*

In pratis, versuris (Siles. Bavar. Palat. Saxon. Holsat. Megap. Pom. Wittemb. Lips. etc.) Fl. Maj. Jun.

* 3. *P. arundinacea*, panicula oblonga ventricosa ampla L. *Leers, t. 7. fig. 3.*

Locis humidis, ad littora; fl. Jun. Jul. (Var. fol. variegatis.)

* 4. *P. oryzoides*, panicula effusa; glumarum carinis ciliatis L. *Schreb. t. 22.*

Locis

Locis humidis (Palat. Saxon. Siles. Oldenb. Austr. Holsat. Hass. Norimb. Hannoviae, Barbi —) Fl. Aug. Sept.

28. PANICUM (Fennich) *G. pl.* 108.

Cal. 2 - valvis: valvula exteriora minima; cor. altera hermaphrodita, altera mascula s. neutra (in sinu minor. calycis valvulae.)

1. *P. verticillatum*, spica verticillata; racemulis quaternis, involucellis unifloris bisetis; culmis diffusis L.

In aridis umbrosis locis (Siles. Bavar. Palat. Sax. Hass. Lips. Wittemb. Fuld. Francof. Erford. Berol. etc.) Fl. Jun. — Sept.

2. *P. glaucum*, spica tereti, involucellis bifloris fasciculato - pilosis; seminibus undulato rugosis L. *Schreb. t.* 25.

Inter segetes, in agris; fl. Jul. Aug.

3. *P. viride*, spica tereti, involucellis bifloris fasciculato pilosis; seminibus nervosis L. *Leers, t.* 2. *fig.* 2.

In cultis oleraceis; fl. Jun. — Aug. (Var. *reclinata* Vill. 64.)

†4. *P. germanicum*, spica simplici cernua; setis brevibus pedunculo hirsuto *Verzeich. deutsch. Pfl.* 167.

In agris et arvis variis germaniae locis (Siles. Boruss. Jen? —) Fl. Jul. Aug.

†5. *P. Crus corvi*, spic. alternis secundis, spiculis subdivisis, glumis subaristatis hispidis; rachi trichona L.

Locis udis (Austr. Carn. Siles. — Helmstad. Cappel) Fl. Jul. Aug.

* 6. *P. Crus galli*, spicis alternis conjugatisque, spiculis subdivisis; glumis aristatis, hispidis, rachi quinquangulari L. *Leers*, t. 2. fig. 3.

In cultis et agris; fl. Jul. Aug. (Var. *brevi-longi - aristata*.)

* 7. *P. sanguinale*, spicis digitatis, basi interiore nodosis, flosculis geminis muticis; vaginis foliorum punctatis L. *Schreb.* t. 16.

In agris vulgaris; fl. Jul. Aug.

8. *P. dactylon*, spicis digitatis patentibus, basi interiore villosis; floribus solitariis; sarmentis repentibus L.

In uliginosis (Austr. Carn. Siles. Bav. Palat.) Fl. Aug. Sept.

9. *P. filiforme*, spic. subdigitatis approximatis erectis linearibus, rachi flexuosa: dentibus bifloris, altero sessili L.

Locis sabulosis (Siles. К Р О С К.) Fl. Jul. Aug.

10. *P. lineare*, spic. digitatis subquaternis linearibus; flosc. solitariis secundis muticis L.

Locis sabulosis (Siles. К Р О С К.) Fl. Jul. Aug.

11. *P. miliaceum*, panicula laxa flaccida, foliorum vaginis hirtis; glumis mucronatis nervosis L.

Locis incultis (Siles. Austr. Berol. Wittemb. Lips. Erford. etc.) Fl. Jul. Aug. (Var. *sem. albo et nigro*.)

29. *PHLEUM* (Lieschgras) *G. pl.* 109.

Cal. 2-valvis linearis truncatus, setaceo-bicornis; cor. inclusa. (*Spica typhina.*)

* 1. *P. pratense*, spica cylindrica longissima ciliata, culmo erecto *L. Schreb. t.* 14.

In pratis, versuris; fl. Maj. — Sept.

* 2. *P. nodosum*, spica cylindrica, culmo adscendente, fol. obliquis, rad. bulbosa *L. Leers, t.* 3. *fig.* 2.

Locis arenosis, in pratis; fl. Jun. — Sept.

3. *P. arenarium*, spica ovata ciliata, culmo ramoso *L.*

Locis arenosis (Siles. Holsat. Brem. Hercyn. — Norimb. *PANZ.*) Fl. Jun. Jul. (Valvulae calycinae lanceolatae *EHRH.*)

4. *P. alpinum*, spica ovato-cylindracea *L. Fl. dan. t.* 213.

In montosis (Siles. Austr. Carn. Tubing. Francof.) Fl. Iul. Aug.

30. *MILIUM* (Hirsegras) *G. pl.* 110.

Cal. 2-valvis, 1-florus; valvulis subaequalibus; cor. brevissima; stigmata peniciliformia.

* 1. *M. effusum*, floribus paniculatis dispersis muticis *L. Fl. lond.*

In nemorosis; fl. Maj. — Iul.

2. *M. confertum*, floribus paniculatis conertis *L.*

In montosis (Siles. *Krock.*) Fl. Maj. Jun.

31. AGROSTIS (Straußsgras) *G. pl.* 111.
Cal. 2 - valvis unifloris; stigm. longitudinaliter hispida.

Aristatae.

* 1. *A. spica venti*, petalo exteriori arista recta stricta longissima; panicula patula L. *Leers*, t. 4. fig. 1.

Inter segetes vulg. Fl. Jun. Jul.

2. *A. interrupta*, petalo exteriori aristato; panicula attenuata coarctata interrupta L.

Inter segetes, in arvis (Bavar. Holsat. Carn. Hassiae.) Fl. Jul. (Differt a priori arista et culmo brevior.)

† 3. *A. miliacea*, petalo exteriori arista terminali recta striata mediocri L.

Locis graminosis (Siles. К R O C K.) Fl. Jul. Aug.

* 4. *A. arundinacea*, panicula oblonga; petalo exteriori (interiore) basi villosa aristaeque torta, calyce longiore L.

In humidis montosis, nemorosis; fl. Jun. Jul.

* 5. *A. rubra*, paniculae parte florente patentissima; petalo exteriori glabro, arista terminali tortili recurva L.

In pratis humidis (Siles. Hercyn. Holsat. Brem. Pom. Gryph. etc.) Fl. Jun. — Aug.

* 6. *A. canina*, calycibus elongatis, petalorum arista dorsali recurva; culmis prostratis sub-ramosis L. *Leers*, t. 4. f. 2.

In pratis siccioribus, etiam humidis; fl. Jul. Aug. (Coroll. valv. interior saepius deficit vel minima.)

7. *A.*

7. *A. alpina*, foliis setaceis, panicula coarctata; calyc. hispidiusculis coloratis; petalo exteriori arista dorsali geniculata *Leys.*

In montosis (Siles. Carn. Bav. Saxon.) Fl. Iul. Aug.

8. *A. vinealis*, calycib. coloratis, petalorum arista dorsali longitudine fere calycis; culmis adscendentibus *Schreb.*

In siccioribus (Lips.) Fl. Iun. Iul. (Ab *A. canina*, spiculis dupl. majoribus distinguitur.)

9. *A. gigantea*, paniculae parte superiore prius florente, patentissima; calycib. hispidis, petalo exteriori glabro, dorso superne subaristato; culmo erecto *Roth.*

Inter arundinem et salicas ad ripas (Visurgis Ducat. Bremensis.) —

10. *A. dubia*, calycibus aequalibus laevibus, corollis infra apicem mucronatis; foliis setaceis *Leers, t. 4. fig. 4.*

In montosis apricis (Nassov.) Fl. Iul.

Muticae.

* 11. *A. stolonifera*, paniculae ramulis patentibus muticis; culmo repente; calycib. aequalibus L. *Leers, t. 4. fig. 6.*

In agris, versuris; fl. Iun. Iul.

* 12. *A. capillaris*, panicula capillari patente; calyc. subulatis aequalibus hispidiusculis coloratis, flosculis muticis L. *Leers, tab 4. fig. 3.*

In pratis, versuris; fl. Iun. Iul. (Coroll. valv. interior ut in *A. can. minima*, exterior trifida saepius in foliola subulata excrescens.)

13. *A. sylvatica*, panicula coarctata mutica; calyc. aequalibus: virgineis corolla brevioribus, foecundatis duplo longioribus L.

In sylvis (Bavar. Holsat. Palat. —) Fl. Iun.

* 14. *A. alba*, panicula laxa; calyc. muticis aequalibus hispidiusculis, culmo repente L. *ters*, t. 4 fig. 5.

Locis inundatis; fl. Jul. (Deflorata panicula canescit.)

15. *A. pumila*, panicula mutica secunda; culmis fasciculatis erectis L. *Ehrh. gram.* 105.

In pratis et pascuis, agris; fl. aestate. (Morbosa varietas Agr. stolonif. *EHRH.*)

16. *A. minima*, panicula filiformi L. *Dill. Gies. app.* t. 16. fig. 1.

In arenosis (Austr. Siles. Holsat. Palat. Lips. Francof. Gies. —) Fl. Apr. — Iul.

32. AIRA (Schmellen) *G. pl.* 112.

Cal. 2 valvis, 2-florus, absque interjecto rudimento.

Muticae.

1. *A. arundinacea*, panicula oblonga secunda mutica imbricata, fol. planis L.

In nemorosis (Lips. *BAUMG.*) Fl. Iun. Iul.

* 2. *A. aquatica*, panicula patente, floribus muticis laevibus, calyce longioribus; foliis planis L.

Locis aquosis vulgaris; fl. Maj. Iun. (Var. uniflora *SCHK*; biflora; multiflora *EHRH.*)

Ari.

Aristatae.

† 3. *A. paludosa*, foliis planis, panicula patente; flosculis basi hirsutis aristatis: arista brevi inflexa *Roth.*

In locis paludosis (prope Ienam.) —

4. *A. subspicata*, foliis planis, panicula spicata; flosculis medio aristatis: arista reflexa laxiore *L. Fl. dan. t. 228.*

In montosis (Nassov. Austr. Hercyn.) Fl. Iun. Aug.

* 5. *A. cespitosa*, foliis planis, panicula patente; petalis basi villosis aristatisque: arista recta brevi *L. Fl. dan. t. 240.*

In pratis, umbrosis depressis locis vulg. Fl. Iun. — Sept. (Var. altitudine.)

* 6. *A. flexuosa*, foliis setaceis, culmis subnudis, panicula divaricata; pedunc. flexuosis *L. Schreb. t. 30.*

In montosis sylvaticis; fl. Iun. Iul.

7. *A. montana*, foliis setaceis; panicula angustata; flosc. basi pilosis aristatis: arista tortili longiore *L. Leers, t. 5. fig. 2.*

In montosis sylvaticis; fl. Iun. Iul. (Priori affinis.)

8. *A. alpina*, foliis subulatis, panicula densa; flosculis basi pilosis aristatis: arista brevi *L.*

In montosis, subalpinis (Siles. Austr. collibus limosis (Brem. ROTH.) Fl. Aug.

* 9. *A. canescens*, foliis setaceis: summo spathaceo paniculam inferne obvolvente *L. Ehrh. gram. 34.*

In arvis sabulosis (Siles. Holsat. Palat. Saxon. Bavar. Hannov. Megap. etc.) Fl. Iul. Aug.

10. *A.*

10. *A. praecox*, foliis setaceis : vaginis angulatis ; floribus paniculato - spicatis ; flosc. basi aristatis L. *Fl. dan.* t. 383.

In campis arenosis (Siles. Bavar. Holsat. Palat. Saxon. Megap. Lips. Berol. Goett. etc. Norimb. PANZ.) Fl. Majo.

* 11. *A. caryophyllea*, foliis setaceis, panicula divaricata ; floribus aristatis distantibus L. *Fl. dan.* t. 382.

In arenosis, ad margines agrorum ; fl. Maj. Iun.

33. *MELICA* (Perlgras) G. *pl.* 113.

Cal. 2 - valvis, 2 - florus ; corpusculum pedunculatum inter flosculos.

1. *M. ciliata*, flosculi inferioris petalo exteriori ciliato L. *Krock.* t. 23.

In rupibus et collibus (Siles. Palat. Saxon. Bav. Lips. Fuldae, Tüb. Erford.) Fl. Maj. — Iul.

* 2. *M. nutans*, petalis imberbibus, panicula nutante simplici L. *Schreb.* t. 6.

In nemorosis montosis ; fl. Maj. Iun.

* 3. *M. uniflora*, panicula rara ; calycibus bifloris, flosculo altero hermaphrodito, altero neutro *Retz Flor. lond.*

In nemorosis, montosis (Bohem. Austr. Saxon. Bav. Hass. Megap. Hannov. —) Fl. Maj.

* 4. *M. caerulea*, panicula coarctata : floribus cylindricis L. *Leers*, t. 4. f. 7. *Fl. lond.*

In pratis humidis ; fl. Aug. (Cal. bi - triflorus ; nectar. tubulosum 3 - dentatum. (Var. magnitud.)

34. POA (Rispengras) G. pl. 114.

Panicula patente.

Cal. 2-valvis, multiflorus; spiculae ovatae compressae, margine scariosae.

* 1. *P. aquatica*, panicula (sub-) diffusa; spiculis 6-floris linearibus L. *Leers*, t. 5. f. 5.

Ad ripas fluviorum; fl. Iul. Sept.

2. *P. alpina*, panicula diffusa ramosissima; spic. 6-floris cordatis L. *Fl. dan.* t. 807.

In montosis, subalpinis (Siles. Bav.) Fl. Iun. Iul.

* 3. *P. trivialis*, panicula subdiffusa: spiculis trifloris basi pubescentibus; culmo erecto tereti L. *Leers*, t. 6. f. 2.

In pratis; fl. Maj. Iun.

* 4. *P. angustifolia*, panicula diffusa; spiculis 4-floris pubescentibus; culmo erecto tereti L. *Leers*, t. 6. f. 4.

In pratis et versuris; fl. Iun. Iul.

* 5. *P. pratensis*, panicula diffusa; spiculis 5-floris glabris; culmo erecto tereti L. *Fl. lond.*

In pratis; fl. Iun. — Aug.

6. *P. palustris*, panicula diffusa; spiculis subtrifloris pubescentibus; foliis subtus scabris L. *Leers*, t. 6. f. 5.

In pratis udis; fl. Iun. — Sept.

7. *P. scabra*; *Ehrh. gram.* 72.

Hannov. Hass. —

8. *P. trinervata*, *Ehrh. gram.* 35.

Hannoverae —

* 9. *P.*

*9. *P. annua*, panicula diffusa angulis rectis; spiculis obtusis; culmo obliquo compresso L. *Leers*, t. 6. fig. 1.

In cultis, ad vias; flor. Apr. — Sept.

10. *P. nemoralis*, panicula attenuata; spiculis subbifloris mucronatis scabris; culmo incurvo L. *Leers*, t. 5. fig. 3.

In dumetis, montosis; fl. Iul.

11. *P. sylvatica*, panicula diffusa; spiculis subquinquefloris: glumis acutissimis Poll.

In sylvis montosis (Siles. Bav. Palat. —) Fl. Iun. Iul.

12. *P. cristata*, panicula spicata; calyc. subpilosis subquadrifloris, pedunculo longioribus; petalis aristatis L. *Leers*, t. 5. fig. 6.

Ad vias et margines agrorum, in montosis; fl. Iul. (Var. spiculis viviparis RELH.)

*13. *P. Eragrostis*, panicula patente, pedicellis flexuosis; spiculis serratis 10-floris: glumis trinerviis L. *Schreb.* t. 38.

Locis sabulosis; (Austr. Francon.) Fl. Iun.

14. *P. salina*, panicula diffusa; spiculis 7-floris linearibus; culmo basi subrepente; spicularum glumis omnibus obtusissimis Poll. *Ehrh. gram.* 13.

In fossis, in vallibus suburbanis (Siles. Saxon. Hass. Palat. Bavar. Brem. Hannov. —) Fl. Iun.

Panicula secunda.

15. *P. rigida*, panicula lanceolata subramosa secunda. ramulis alternis secundis L. *Fl. lond.*

In locis aridis montosis (Siles. Erford. Tubing. —) Fl. Iun. Iul.

16. *P. maritima*, panicula subspicata; spiculis secundis coarctatis; foliis convolutis, sarmentis repentibus *Roth. fl. dan. t. 251.*

Ad littora maris; fl. Iul.

* 17. *P. compressa*, panicula coarctata secunda, culmo obliquo compresso L. *Leers, t. 5. f. 4.*

Locis siccis; muris, tectis; fl. Iun. Iul.

18. *P. bulbosa*, panicula secunda patenti-
uscula; spiculis 4-floris L. *Krock. 1. t. 25.*

Locis montosis (Siles. Bohem. Palat. Saxon. Carn. Berol. Barbi, Lips. etc.) Fl. Majo — Iul. (Var. panicula crispa vivipara.)

† 19. *P. bohémica*, panic. inflexa flores
versus scabra, spiculis alternis 4-floris,
glumarum linea dorsali scabra; culmo te-
reti glabro subprostrato *Meyer, Physic. arb. 1. t. i.*

In pratis fertilibus, subhumidis; (Prag —) Fl. aestate.

35. BRIZA (Zittergras) *G. pl. 115.*

Cal. 2-valvis, multiflorus: valvulis cor-
datis obtusis: interiore minima subrotunda.

1. *B. minor*, spiculis triangulis, calyce
flosculis longiore L.

In nemorosis, ad margines agrorum (Saxon. Erford. Norimb. Tubing. Lips. etc.) Fl. Maj. Iun.

* 2. *B. media*, spiculis ovatis, calyce flo-
sculis brevior L. *Leers, t. 7. fig. 2.*

In pratis siccioribus; fl. Maj — Iun.

3. *B.*

3. *B. Eragrostris*, spiculis lanceolatis :
 flosculis viginti L. *Schreb. t. 39.*

In agris et viis (Saxon. Siles. Carn. Gies. Jen.
 — P. Eragrost. ROTH.) Fl. Jun. — Aug.

36. *DACTYLIS* (Knaulgras) *G. pl. 117.*

Cal. 2-valvis multiflorus: valvulis carinatis: altero latere convexis latioribus semiovatis, altero angustis; interiore majore.

* *D. glomerata*, panicula secunda glomerata L. *Schreb. t. 8. f. 1.*

In pratis, pomariis vulgaris; fl. Jun. Jul.

37. *CYNOSURUS* (Kammgras) *G. pl. 118.*

Receptaculum commune unilaterale, saepe foliaceum pectiniforme; cal. 2-valvis multiflorus.

* 1. *C. cristatus*, bracteis pinnatifidis L. *Schreb. t. 8. fig. 2. Leers, t. 7. fig. 4.*

In pratis; fl. Jun. — Sept. (Var. vivipara.)

† 2. *C. echinatus*, bracteis pinnato-paleaceis aristatis L.

Inter segetes (Siles. Carn. Norimb.) Fl. Maj. — Jun. (Styli 2, Ehrh.)

3. *C. durus*, spiculis secundis alternis sessilibus rigidis obtusis appressis L. *Poll. 1. t. 7.*

In sterilibus glareosis (Carn. Palat. Saxon. Siles. Thuring. Bavar. Ratisb. —) Fl. Maj. Jun. (*Poa dura* ROTH.)

* 4. *C. coeruleus*, bracteis integris L. *Ehrh. gram. 14.*

In pascuis uliginosis, locis montosis (Siles. Bav. Austr. Carn. Saxon. Lips. Francof. ad Viadr. Wittenb. Gött. Erford. etc.) Fl. Maj. Jun.

38. *FESTUCA* (Schwingel) *G. pl.* 119.

Spicula oblonga teretiuscula; cal. 2-valvis multiflorus: gluma exterior in acumen terminata.

Panicula secunda.

1. *F. bromoides*, panicula secunda: spiculis erectis, calycis valvula altera integra, altera acuminata L. *Ehrh. gram.* 6.

In pascuis siccis (Holsat. Hannov. Erford. —) Fl. Iun.

* 2. *F. ovina*, panicula secunda coarctata aristata; culmo tetragono nudiusculo, fol. setaceis L. *Leers, t. 8. fig. 3.*

In collibus et locis apricis; fl. Maj. — Aug. (Var. vivip. — glauca.)

* 3. *F. rubra*, panicula secunda scabra; spiculis 6-floris aristatis: flosculo ultimo mutico, culmo semitereti L. *Leers, t. 8. fig. 1.*

In collibus, locis sterilibus; fl. Maj — Iul.

4. *F. pratensis*, fol. hirsutis latiusculis; spiculis paniculatis 5-floris, aristatis glabris Schreb.

In pratis subhumidis; fl. cum priori (cui affinis sed fol. latioribus differt.)

† 5. *F. amethystina*, panicula flexuosa; spiculis secundis inclinatis submuticis; fol. setaceis L.

In versuris (Hal. Saxon. LEYS.) Fl. Iun.

* 6. *F. duriuscula*, panicula secunda oblonga; spicul. oblongis laevibus; foliis setaceis L. *Leers, t. 8. f. 2.*

In pratis siccis; fl. Maj. — Aug.

† 7. *F. dumetorum*, panicula spiciformi pubescente; fol. filiformibus L. *Fl. dan.* t. 700.

(Hal. Saxon. Erford.) Fl. Iun. Iul.

8. *F. myurus*, panicula spicata; calyc. minutissimis muticis, floribus scabris, aristatis longis L. *Leers*, t. 3. fig. 5.

Ad vias et sepes (Siles. Saxon. Palat. Nassov. —) Fl. Maj — Aug.

9. *F. elatior*, panicula secunda erecta; spicul. subaristatis: exterioribus teretibus L. *Schreb.* t. 2.

In pratis; fl. Iul. Aug. (Var. spiculis paucifloris, culmo digitali, pedali.)

10. *F. nemorum*, panicula secunda nutante; spic. 5. floris glabris aristatis; fol. radicalibus setaceis; culmeis planis longissimis scabriusculis *Leys*.

In nemoribus (Hal. Saxon. Lips. —) Fl. Iun. Iul.

† 11. *F. phoenicoides*, racemo indiviso; spiculis alternis subsessilibus, teretibus; foliis involutis mucronato-pungentibus L.

Prope Tubingam (GMEL.) Fl. Iun. Iul.

12. *F. sciuroides*, panic. secunda racemosa; calyc. abbreviatis, floribus diaphanis scabris: aristis longis *Roth*.

Ad margines agrorum et in pascuis sterilibus (Brem. Oldenb.) —

Panicula aequali.

* 13. *F. decumbens*, panicula erecta, spiculis subovatis muticis, calyce flosculis majore;

jore; culmo decumbente L. *Leers*, t. 7. fig. 5.

In pascuis et pratis; fl. Iul. Aug.

* 14. *F. fluitans*, panicula ramosa erecta; spicul. subsessilibus teretibus muticis L. *Schreb.* t. 3.

In fossis et inundatis; fl. Maj — Iul.

15. *F. elongata*, *Ehrh. gram.* 93. Hannoverae. —

39. *BROMUS* (Trespe) *G. pl.* 120.

Spicula oblonga teres disticha; cal. 2-valvis multiflorus: arista sub apice valvulae majoris.

* 1. *B. secalinus*, panicula patente, spiculis ovatis: aristis (flexuoso-) rectis; seminibus distinctis L.

In agris secalinis; fl. Maj — Aug. (Var. spiculis submuticis.)

2. *B. multiflorus*, panic. patente; spiculis lanceolatis compressis, glumis nudis marginatis imbricatis: aristis capillaribus aequalibus rectis *Weig. Leers*, t. 11. fig. 2.

In agris et arvis; fl. cum priori (cujus var.)

3. *B. pratensis*, *Ehrh. gram.* 116. Hannoverae. —

* 4. *B. mollis*, panicula erectiuscula, spiculis ovatis pubescentibus: aristis rectis; foliis mollissime villosis L. *Schreb.* t. 6.

Ad vias sepes, ubique vulgaris; fl. Maj. Iun. (Var. *nana*, *digitalis*.)

6. *B. squarrosus*, panicula nutante, spic. ovatis: aristis divaricatis L.

In agris, locis sterilibus montanis (Siles. Bav. Francof.) Fl. Jun. Jul.

6. *B. inermis*, panicula erecta, spiculis subteretibus subulatis nudis submuticis L. Schreb. t. 13.

In pratis, pomariis; fl. Jun. Jul.)

7. *B. asper*, panicula nutante scabra, spiculis villosis aristatis; foliis scabris. Fl. lond. (*B. hirsutus*.)

In dumetis et agris (Siles. Bayat. Palat. Saxon. Hannov. Gies. Jen. Isenac. etc.) Fl. Jun. Jul.

†8. *B. purgans*, panicula nutante crispa; fol. utrinque nudis, vaginis pilosis; glumis villosis L.

Silesiae (KROCK.) Fl. aestate.

9. *B. sterilis*, panicula patula, spic. oblongis distichis: glumis subulato-aristatis L. Leers, t. 11. fig. 4.

In agris, sylvis, ad vias; fl. Jun. Jul. (Var. grandiflora, procerior, purpurascens.)

10. *B. arvensis*, panicula nutante, spic. ovato-oblongis L. Leers, t. 11. f. 3.

Ad margines viarum, agrorum; fl. Jun. Jul. (Var. coroll. muticis; Fl. dan. t. 293.)

11. 2. *tectorum*, panicula nutante, spic. linearibus L. Leers, t. 10. fig. 2.

In muris, tectis, collibus; fl. Maj. — Jun.

12. *E. giganteus*, panicula nutante, spic. 4-floris, aristis brevioribus L. Schreb. t. 11.

In

In sylvis humidis; fl. Jul. Aug. (Var. spic. 6-7, aristis rectis et flexuosis. B. aquaticus spic. glabris minoribus, hujus loci.)

13. B. *montanus*, panicula nutante, spic. sub-6-floris, aristis longioribus Poll.

In sylvis montosis (Palat. Hass. Bav.) Fl. Jul.

14. B. *arundinaceus*, panicula erecta contracta, spic. oblongis scabris subaristatis paucifloris Roth.

In nemorosis humidis (Lipsiae, prope Vege-sack.) Fl. Jun. Jul. (Fest. arund. SCHRANK.)

† 15. B. *angustifolius*, panicula erecta, spic. linearibus 3-7. floris, aristis brevibus: foliis linearibus SCHRANK.

In pratis (prope Ingolst.) Fl. Jun.

16. B. *triflorus*, panicula patente, flori-bus subtrifloris L.

In nemorosis (Siles. Bavar. Palat. Hannov. —) Fl. Jun. Jul.

* 17. B. *pinnatus*, culmo indiviso, spic. alternis subsessilibus teretibus subaristatis L. Leers, tab. 10. fig. 3.

In sylvis montosis dumetis; fl. Jun. Jul. (Var. panic. breviori, spic. hirsutis: valvulis exterioribus apice rotundatis arista terminatis; B. fragilis Schrank.)

* 18. B. *gracilis*, spica terminali debili: spiculis alternis remotis teretibus subulatis glabris, aristis longioribus Weig. Ehrh. gram. 107.

In sylvis montosis (Saxon. Bavar. Palat. Siles. Hannov. Hass. —) Fl. Jun. Jul. (Var. spiculis et foliis magis villosis; Br. sylvaticus Poll.)

†19. *B. distachyos*, spicis duabus erectis alternis L.

Bavariae etiam prope Tubingam; fl. aestate.

40. *STIPA* (Pfriemengras) *G. pl.* 121.

Cal. 2-valvis; 1-florus; coroll. valvula exteriori arista terminali longissima, basi articulata.

1. *s. pennata*, aristis lanatis L. *Schk. t.* 16.

In montosis (Siles. Saxon. Palat. Berol. Götting. Barbi, Carn. Austr. Ger. Lips.) Fl. Maj. Iun.

†2. *s. juncea*, aristis nudis rectis, calyc. semine longioribus; foliis intus laevibus L.

In montosis aridis (Siles. Carn. Saxon. Lips. —) Fl. Iun. Iul.

3. *s. capillata*, aristis nudis curvatis, calyc. semine longioribus; foliis intus pubescentibus L. *Ehrh. phyt.* 91.

In collibus siccis (Siles. Austr. Saxon. Palat. Hannov. Lips.) Fl. Iul. Aug.

†4. *s. tenacissima*, aristis basi pilosis, panicula spicata; fol. filiformibus L.

In montosis (Siles? —) Fl. aestate.

41. *AVENA* (Hafer) *G. pl.* 122.

Cal. 2-valvis saepius multiflorus: arista dorsali geniculata intorta.

*1. *A. elatior*, paniculata, calyc. bifloris, flosculo hermaphrodito submutico, masculo aristato L. *Schreb. t.* 1.

In pratis, pomariis; fl. Maj. Iul. (*Holcus avenaceus* Wigg.)

* 2. *A. satua*, paniculata, cal. trifloris, flosculis omnibus aristatis basique pilosis L. *Schreb. t. 15.*

Inter segetes vulgaris; fl. Iun. — Aug.

3. *A. sesquiteria*, paniculata, cal. subtrifloris; flosculis omnibus aristatis, receptaculis barbatis L.

In agris (Siles. Austr. Saxon. Hass. Erford. Tubing. —) Fl. Iun. — Aug.

* 4. *A. pubescens*, subspicata, cal. subtrifloris basi pilosis; fol. planis pubescentibus L. *Leers, t. 9. fig. 2.*

In pratis vulgaris; fl. Jun. Jul.

* 5. *A. flavescens*, panicula laxa, cal. trifloris brevibus, flosculis omnibus aristatis L. *Leers, t. 10. fig. 5.*

In pratis, versuris, pomariis vulgaris; fl. Iun. Jul. (Var. minoribus vel majoribus locustis, etiam viviparis.)

6. *A. pratensis*, subspicata, cal. quinquefloris L. *Leers, t. 9. f. 1.*

In pratis et pascuis montosis; fl. Iun. Jul.

7. *A. strigosa*, panicula oblonga subnuntante secunda, flosculis geminis apice biaristatis, dorso arista geniculata RETZ. *Ehrh. gram. 38.*

In agris inter segetes (Siles. Brem. Megapol. Hannov; prope Lipsiam, Barbi —) Fl. Iun. Jul.

8. *A. dubia*, paniculata, calyc. subtrifloris: flosculo infimo terminali arista recta,

reliquis apice biaristatis, dorsali arista re.
Hexa *Leers*, t. 9. f. 3.

In collibus siccis, arvis sterilibus (Nassov. Hass.
Lips.) Fl. Jun. Jul.

9. *A. brevis*, paniculata, calyc. subtriflo-
ris; seminibus brevibus obtusis apice 2-
dentatis; arista dorsali scabra *Roth*.

Inter segetes (Ducat. Bremens.) —

42. ARUNDO (Rohr) *G. pl.* 124.

Cal. 2-valvis uni-vel multiflorus: flos-
culis lana cinctis; semen 1, pappo instru-
ctum.

* 1. *A. phragmitis*, calyc. quinquefloris,
panicula laxa L. *Leers*, t. 7. fig. 1.

In fossis, lacubus, ad ripas fluviorum; fl. Jul.
Aug.

2. *A. epigejos*, calyc. unifloris, panicula
erecta; fol. subtus glabris L. *Ehrh. gram.*
74.

In pratis udis, dumetis, ad ripas fluviorum,
in versuris, collibus aridis; fl. Jun. — Aug.

* 3. *A. Calamagrostis*, calyc. unifloris lae-
vibus, coroll. lanuginosis; culmo ramoso
L. *Fl. dan.* t. 280.

In pratis paludosis, ad ripas fluviorum, etiam
in montanis; fl. Iun — Aug.

4. *A. Leersii*, panicula incrassata; calyc.
unifloris scabris, petalo exteriori fissi ari-
stato.

In sylvaticis paludosis (Nassov; prope Berol.)
Fl. Jul. (*Agr. Calamagrostis Leers*, 285.
Arund. Halleri Wild. prodr. 187.)

5. *A.*

5. *A. arenaria*, calyc. unifloris; flor. involutis mucronato - pungentibus L. *Ehrh. gram.* 17.

In arenosis (Siles. Hass. Holsat. Oldenb. Cell. Megap. Pom. Wittenb. Hannov; prope Barbi -)
Fl. Iun. Aug.

+6. *A. canescens*, panicula laxissima, calyce unifloro subaequali: valvulis mucronato - aristatis *Wigg.*

In turfosis (Holsat.) (Ab *A. Calamagr.* differre debet culmo simplici debili, panicula laxa; tota planta tenera.)

43. *LOLIUM* (Lolch) *G. pl.* 126.

Cal. 1 - valvis, rachi oppositus, multiflorus.

* 1. *L. perenne*, spica mutica: spiculis compressis multifloris L. *Schreb. t.* 37.

Ad vias et agrorum margines vulgaris; fl. Iun. - Aug. (Var. spica lata, secunda; spica ramosa.)

2. *L. tenue*, spica mutica tereti: spiculis trifloris L.

Ad vias et agrorum margines, in collibus limosis (Bavar. Brem; prope Tubing. et Berol.)
Fl. Iun. Iul.

* 3. *L. temulentum*, spica aristata: spiculis compressis multifloris L. *Jeers, t.* 12. f. 2.

Inter segetes, in agris, ad vias; fl. Jun - Aug. (Var. aristis brevioribus: *L. remotum* *SCHRANK*; vel nullis.)

44. *ELYMUS* (Haargras) *G. pl.* 128.

Cal. 4 - phyllus, 2 - valvis, multiflorus.

1. *E. arenarius*, spica erecta arcta; calyc. tomentosis flosculo longioribus L.

Ad littora arenosa (Holsat. Megap. Pom. Gryph.)
Fl. aestate.

* 2. *E. caninus*, spica nutante arcta: spicul. rectis aristatis, infimis geminis L. *Leers*,
t. 12. f. 4. 1 - 11.

In cultis, ad sepes; fl. Jun. Jul. (Var. spicul. majoribus, 7 - 9 floris.)

* 3. *E. europaeus*, spica erecta: spiculis 2-floris, involucri aequalibus L.

In sylvis, ad vias (Siles. Holsat; prope Berol. Francof. Goett. Jen. Hannov. Lips. Ratisb. —)
Fl. Jul. Aug.

45. HORDEUM (Gerste) *G. pl.* 129.

Cal. 6 - phyllus: fol. per paria digestis, triflorus.

* 1. *H. murinum*, flosculis lateralibus masculis aristatis, involucri intermediis ciliatis L. *Schk. t.* 19.

In ruderatis, ad muros, vias; fl. Jun. Jul.

2. *H. secalinum*, flosculis lateralibus aristatis, involucri setaceis scabris. *Vaill. t.* 17.
fig. 6.

In pratis pascuis, ad vias, sepes (Bavar. Saxon. Hannov. Duc. Bremens; prope Berol. Francof. Gött. Barbi, Lips. etc.) Fl. Jun. Jul. (Cal. glumae bipartitae, aristae breviores, saepe in masculis lateralibus flosculis deficientes.)

3. *H. maritimum*, flosculis lateralibus spuris aristatis, dorso hirsutissimis, involucri scabris *Roth. Fl. dan. t.* 650.

In pratis ad ripas (Visurgis Duc. Bremens.)

46. TRITICUM (Weitzen) G. pl. 130.

Cal. 2 - valvis, solitarius subtriflorus;
flor subaristatus.

†1. *T. monococcum*, calyc. subtrifloris: primo aristato, intermedio sterili L.

Inter segetes (prope Erlangam, Norimb. ROTH.)
Fl. aestate.

*2. *T. repens*, calyc. 4 - floris, subulatis acuminatis; fol. planis L. Schreb. t. 26.

In agris vulgaris; fl. aestate. (Var. calyc. multifloris, corollis muticis et aristatis.)

†3. *T. junceum*, calyc. quinquefloris truncatis; fol. involutis L.

In montanis graminosis (Austr. Carn. Siles.)
Fl. aestate.

TRIGYNIA.

47. MONTIA (Montie) G. pl. 133.

Cal. 2 - phyllus; cor. 1 - petala, irregularis; caps. 1 - locularis, 3 - valvis.

**M. fontana*, fol. oblongo - ovatis subcarnosis, pedunculis unifloris; fructiferis deflexis Fl. lond.

In humidis, rivulosis; fl. Maj — Aug. (Var. magnitudine palmari Mich. t. 13. fig. 1, et unciali fig. 2. Cal. saepe 3 - phyllus, stam. 5.)

48. HOLOSTEUM (Sparre) G. pl. 136.

Cal. 5 - phyllus; petala 5; caps. 1 - locularis apice dehiscens.

**H. umbellatum*, floribus umbellatis L. Schk. t. 20.

In arvis et agris; fl. April. Maj. (Petala apice tridentata; caps. apice 6-valvis: valvulis revolutis; columellae lineari villosae semina affixa, hinc convexa inde angulata.)

49. POLYCARPON (Nagelkraut) G.
pl. 138.

Cal. 5-phyllus; petala 5, minima ovata; caps. 1-locularis, 3-valvis.

P. tetraphyllum, caule ramoso prostrato, fol. quaternis L. Krock. 1. t. 22.

In agris (Siles. Carn.) Fl. aestate.

Classis IV.

TETRANDRIA

MONOGYNIA.

50. GLOBULARIA (Kugelblume) G.
pl. 146.

Cal. communis imbricatus: proprius tubulatus inferus; corollul. labio superiore 2-partito, inferiore 3-partito; recept. paleaceum.

+ 1. *G. vulgaris*, caule herbaceo, fol. radicalibus tridentatis, caulinis lanceolatis L. Schk. t. 21.

In montosis apricis (Siles. Bavar. Palat. Saxon. Carn. Gött. Fuld. Helms. Jen. Tubing -) Fl. Maj. Jun. (Var. flore albo et caeruleo.)

+ 2. *G. cordifolia*, caule subnudo, fol. cuneiformibus tricuspidatis: intermedio minimo L.

In ericetis montosis, subalpinis (Carn. Austr. Bavar.) Fl. Maj.

+ 3. *nudicaulis*. +

51. DIP.

51. DIPSACUS (Karten) G. pl. 148.

Cal. communis polyphyllus: proprius stipetus vix manifestus; recept. paleaceum.

* 1. *D. fullonum*, fol. sessilibus serratis L. †
Schk. t. 21.

In agris et arvis (Siles. Bavar. Saxon. Wittenb. Lips. etc.) Fl. Jul. Aug. (Var. aristis squamarum hamatis: *D. sativus*.)

2. *D. sylvestris*, fol. integris; paleis rectis L. Jacq. austr. 5. t. 402.

Ad vias et sepes; fl. Jul. Aug.

* 3. *D. laciniatus*, fol. connatis sinuatis L. †
Jacq. austr. 5. t. 405.

Ad fossas (Siles. Palat. Austr. Carn. Gött. Lips. Erford. Ien. Gies. etc.) Fl. Jul. Aug.

* 4. *D. pilosus*, fol. petiolatis appendiculatis L. †
Jacq. austr. t. 48.

Ad fossas, in humidiusculis; fl. Jul. Aug.

52. SCABIOSA (Scabiosen) G. pl. 149.

Cal. communis polyphyllus: proprius duplex superus; recept. paleaceum s. nudum.

Corollul. 4-fidis.

* 1. *S. succisa*, corollul. 4-fidis aequalibus; caule simplici, ramis approximatis, fol. lanceolato-ovatis L. Fl. lond.

In pascuis humidiusculis; fl. Aug. Sept. (Var. locis sylvat. hirsuta, apricis glabra; floribus carneis et albis.)

2. *S. integrifolia*, corollul. 4-fidis ra. var. *apennina* dianthibus; fol. indivisis: radicalibus ovatis uti et dubia
ser:

1. *S. transylvanica*. 2. *leucantha*. 3.

serratis, rameis lanceolatis; caule herba-
ceo L.

In montosis (Tubing. GMEL.) Fl. aestate.

* 3. *s. arvensis*, corollul. 4 - fidis radian-
tibus; fol. pinnatifidis incisis; caule hispi-
do L. *Fl. dan. t. 447.*

In pratis ad margines agrorum; fl. Maj - Aug.
(Var. fol. integris, coroll. albis. Calyculus ger-
minis setis 15 - 20. constans radiantibus; calyx
seminis 5 dentibus latioribus, interjectisque aliis
6 angustioribus.)

4. *s. sylvatica*, corollul. 4 - fidis radian-
tibus; fol. omnibus indivisis ovato-oblon-
gis serratis; caule hispido L. *Iacq. austr. 4.*
t. 362.

In sylvaticis montosis (Siles. Austr. Carn. Ba-
var. Hassiae, Nassov. Palat. Francon. Tubing.
Ratisb. Francof. -) Fl. Iul. Aug.

Corollul. 5 - fidis.

5. *s. columbaria*, corollul. 5 - fidis ra-
diantibus; fol. radicalibus ovatis crenatis,
caulinis pinnatis setaceis L. *Hoppe, Ect. 117.*

In montosis ad vias, graminosis sabulosis lo-
cis; fl. aestate. (Var. foliorum divisio.)

6. *s. ochroleuca*, corollul. 5 - fidis radian-
tibus; fol. linearibus pinnatis: radicalibus
bipinnatis, petiolis perfoliatis *Iacq. austr.*
5. t. 439.

In pratis siccis; montosis (Siles. Austr. Bavar.
Carn. Saxon. Barbi, Erford. Lips. Götting. Ien.
Wittenb. Duderstadt etc.) Fl. Iul. - Sept. (Var.
flore caerulea. Priori affinis.)

7. *s.*

canescens

norica

raminifolia.

7. *s. dubia*, corollul. 5-fidis radiantibus
aequalibus, involucro tetraphyllo *Moench.*
t. 3.

Hassiae —

53. *SCHERARDIA* (Scherardie) *G. pl.* 156.

Coroll. 1-petala, infundibuliformis; se-
mina 2, calyc. dentibus 3 coronata.

* *s. arvensis*, fol. omnibus verticillatis;
floribus terminalibus L. *Fl. lond.*

Inter segetes; fl. Iul. Aug. (Cal. 6, nec 4-
dentatus SCOP. LEERS, SCHK.)

54. *ASPERULA* (Meyerkrant) *G. pl.* 157.

Cor. 1-petala, infundibuliformis; semi-
na 2, integumento globoso tecta.

* 1. *A. odorata*, fol. octonis lanceolatis,
florum fasciculis pedunculatis L. *Fl. lond.*

In umbrosis, montosis; fl. Maj — Iul.

* 2. *A. arvensis*, fol. senis; flor. sessilibus
terminalibus aggregatis L. *Hoppe, Ect.* 78.

Inter segetes (Siles. Austr. Carn. Palat. Lips.
Erford. Gies. Jen. Oldenb. Tubing. Ratisb. etc.)
Fl. Maj — Iul.

3. *A. tinctoria*, fol. linearibus, inferiori-
bus senis, intermediis quaternis, caule flac-
cido; flor. plerisque 5-fidis L. *Hoppe,*
Ect. 584.

In sylvaticis nemorosis (Siles. Bavar. Austr.
Carn. Saxon. Barbi, Berol. Francof. Gött. Ien.
Ratisb. Lips. —) Fl. Iun. Iul.

adde:

Asp. laurin

†4. *A. pyrenaica*, fol. quaternis lanceolato-linearibus, caule erecto; floribus saepius trifidis L.

In montosis (Helmstad. Cappol.) Fl. Iul.

*5. *A. Cyaanchica*, fol. quaternis linearibus: superioribus oppositis, caule erecto; flor. 4-fidis L. Hoppe, Ect. 84.

Ad vias in collibus aridis (Bavar. Austr. Carn. Palat. Saxon. Barbi, Berol. Francof. Erford. Gies. Ien. Isenac. Lips. Tubing. Ratisb. Wittenb. —) Fl. Jun. — Aug.

6. *A. laevigata*, fol. quaternis ellipticis enerviis laeviusculis; pedunc. divaricatis trichotomis; sem. scabris L.

In montanis (Siles. Austr. Carn. Barbi —) Fl. Iun — Aug.

55. GALIUM (Labkraut) G. pl. 162.

Cor. 1-petala rotata; sem. 2. integumento globoso tecta.

Fructu glabro.

1. *G. rubioides*, fol. quaternis lanceolato-ovatis aequalibus, subtus scabris, caule erecto; fructibus glabris L.

In pascuis montanis (Siles. Carn. Palat.) Fl. Iul.

*2. *G. palustre*, fol. quaternis obovatis inaequalibus, caulibus diffusis L. Fl. dan. t. 423.

In pratis humidis, rivulis limosis; fl. Jun. — Aug. (Var. caule erecto cubitali; fol. infer. 5-6.)

†5.

le.
glabrum.
rubiata
clausia rub.
demontan
fructum.
illorum seu

valanthi aparinne L.

† 3. *G. trifidum*, fol. quaternis linearibus, caule procumbente scabro; corollis trifidis L. *Fl. dan.* t. 48.

In saxosis (Siles. KROCK.) Fl. Iul.

4. *G. montanum*, fol. subquaternis linearibus laevibus, caule debili scabro; sem. glabris L.

In montosis sylvaticis (Siles. Bav. Saxon. Nassov. Dantisc. Helmst. Gött. Lips. Ien.) Fl. Iul. Aug. (Coroll. magnae, clausae purpurascentes.)

* 5. *G. uliginosum*, fol. senis lanceolatis retrorsum serrato-aculeatis, mucronatis rigidis; corollis fructu majoribus L. *Ehrh. herb.* 102.

In pratis uliginosis; fl. Iun. Iul. (Caulem retrorsum, fol. antrorsum aculeata per lentem observo.)

6. *G. hircynicum*, fol. subsenis obovatis acutis; caule procumbente: ramis confertis elongatis, pedunculis multifloris Weig. *Ehrh. herb.* 82.

In cricetis montosis (Siles. Hass. Brem. Holst. Oldenb. Hannov. Ien. Isenac. Gött. Francof. —) Fl. Iul.

7. *G. decipiens*, *Ehrh. herb.* 63.

In Hercynia.

8. *G. sylvestre*, fol. suboctonis lineari-lanceolatis subasperis aristatis; fructibus glabris Pollich.

Silisch Schre

In nemorosis (Siles. Saxon. Palat. Ratisb. Lips —) Fl. Maj — Iul. —

9. *G. minutum*, fol. octonis lanceolatis mucronatis serrato - aculeatis glabris incurvis; fructibus reflexis L.

In montosis (Bavar. SCHRANK. —) Fl. April. — Iun.

10. *G. pusillum*, fol. octonis hispidis linearibus acuminatis subimbricatis; pedunc. dichotomis L. *Villars*, t. 8.

In montosis apricis (Siles. Bavar. Tubing.) Fl. Iul.

* 11. *G. verum*, fol. octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis brevibus L. *Schk.* t. 23.

In pratis, versuris, agris; fl. aestate. (Coroll. luteae, etiam pallidiores; fol. senis latioribus variat.)

* 12. *G. Mollugo*, fol. octonis ovato - linearibus subserratis patentissimis, mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus L. *Fl. dan.* t. 455.

In pratis, sepibus, dumetis vulgaris; fl. Maj. — Iun. (Var. fol. latioribus, angustioribus.)

* 13. *G. sylvaticum*, fol. octonis laevibus subtus scabris: floralibus binis, pedunc. capillaribus, caule laevi L. *Hoppe*, *Ect.* 163.

In nemorosis montosis; fl. Iun. — Aug. (Semina nigra rugosa, saepe altero abortivo.)

† 14. *G. scabrum*, fol. suboctonis scabris, mucronatis, ramis floriferis subtrichotomis L. *Macq. austr.* 5. t. 422.

Austr. Bavar.; fl. Maj — Iun.

15. *G.*

15. *C. glaucum*, fol. verticillatis linearibus, pedunculis dichotomis, caule laevi L. *Fl. dan. t. 609.*

In montosis apricis (Siles. Austr. Carn. Bav. Saxon. Lips. Tubing? Erford. Ratisb.—) Fl. Iul. Aug. (Ex observatione DE LA CHENAL diversum a *C. glauco*, *Lacq. t. 81.* quocum ab Auctoribus confunditur.)

16. *C. rubrum*, fol. verticillatis linearibus patulis; pedunc. brevissimis L.

In agris (Siles. Carn. Palat. —) Fl. aestate.

* 17. *C. spurium*, fol. senis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis geniculis simplicibus; fructibus glabris L. *Vaill. t. 4. fig. 3.*

Inter segetes, in agris; fl. Iun. Iul. (Caule erecto simplici, fol. retrorsum spinosis, fructu magis glabro a *V. Aparine* differt EHRH.)

Fructo hispido.

18. *C. boreale*, fol. quaternis lanceolatis trinerviis glabris, caule erecto; sem. hispidis L. *Ehrh. herb. 92.*

In pratis, nemoribus (Siles. Austr. Carn. Bav. Saxon. Hass. Barbi, Berol. Francof. Gött. Ien. Ratisb. Wittenb. Lips. —) Fl. Iul. Aug.

19. *C. rotundifolium*, fol. quaternis ovatis obtusis aculeato, ciliatis; sem. hispidis Schreb. *Krock. 1. t. 42.*

In montosis sylvaticis (Siles. Austr. Carn. Bav. Thuring. Lips. Barbi —) Fl. Iun. — Aug.

* 20. *C. Aparine*, fol. octonis lanceolatis; carinis scabris retrorsum aculeatis, geniculis

lis villosis; fructibus hispidis L. *Fl. dan.*
t. 495. *Fl. lond.*

In ruderatis, cultis, sepibus vulgatissima; fl.
Iun. — Aug. (Var. fol. 6; habitu tenuiori BAUMG.)

56. RUBIA (Röthe) *G. pl.* 164.

Coroll. 1 - petala, campanulata; baccae 2,
1 - spermae.

R. tinctorum, fol. annuis, caule aculeato
L. *Schk. t.* 23.

Ad vias, in dumetis (Carn. Palat. Francof.
ad Viadr?) Fl. aestate. (Sem. globosis intus
cavis carne exteriori farts; altero frequenter
abortivo M e d.)

57. PLANTAGO (Wegerich) *G. pl.* 186.

Cal. 4 - fidus; cor. 4 - fida, reflexa; filam.
longissima; caps. 2 - locularis, circumcis-
sa, receptac. centrali libero.

Scapo nudo.

* 1. *P. major*, fol. ovatis glabris, scapo te-
reti; spica flosculis imbricatis L. *Fl. lond.*

Ad margines agrorum, ad vias; fl. Iun. Aug.
(Var. magnitudine, fol. sinuatis, spica multi-
plici.)

* 2. *P. media*, fol. ovato - lanceolatis pu-
bescentibus; spica cylindrica, scapo tereti
L. *Fl. lond.*

Ad vias, in pascuis siccis; fl. Maj. Iun.

var. lanceol. 3. *P. altissima*, fol. lanceolatis 5 - ner-
viis dentatis glabris; spica oblonga cylin-
drica, scapo subangulato L.

Locis udis (Siles. KROCK.) Fl. aestate.

* 4. *P.*

* 4. *P. lanceolata*, fol. lanceolatis; spica subovata nuda, scapo angulato L. *Fl. lond.*

Ad vias in campis sterilioribus; fl. Maj—Aug. (Var. fol. 3-5-7-nerviis, spica prolifera.)

5. *P. maritima*, fol. semicylindraceutis integerrimis basi lanatis; scapo tereti L. *Fl. dan. t. 243.*

In maritimis littoribus (Holsat. Palat. Saxon. Pom. Thuring. Oldenburg. Megap. Gött. Barbi, Lips. —) Fl. aestate.

6. *P. dentata*, fol. lanceolatis carnosius planiusculis glabris tricostatis, hinc inde dentatis: dentibus carnosius terectiusculis; scapo tereti Roth.

Cum priori (cui affinis.) —

7. *P. subulata*, fol. subulatis triquetris striatis scabris; scapo tereti L.

In arenosis, siccis pascuis (Siles. Saxon. Carinth. Gött. Lips. Isenac.) Fl. Inn. Iul.

† 8. *P. Serraria*, fol. lanceolatis 5-nerviis dentato-serratis; scapo tereti L.

Ad littora (Siles. Krock.) Fl. Inn.

9. *P. coronopifolia*, fol. hirsutis linearibus dentatis; scapo tereti L. *Fl. dan. t. 272.*

In maritimis (Holsat. Siles. Megap. Pomer. Carn.) Fl. Iul.

Caule ramoso.

10. *P. Psyllium*, caule ramoso herbaceo, fol. subdentatis recurvatis, capitulis aphyllis L. *Bull. t. 363.* *Syn. arenaria*

Inter segetes, in sabulosis (Siles. Austr. Carn. Berol. Barbi, Ien. Ratisb. Francof. ad Viadr.) Fl. Iul. Aug.

† 11. *P. pumila*, caule ramoso herbaceo, fol. integerrimis ramosis; ramis laevibus L.
In agris glareosis (Hal. Saxon. ROTH.) —

58. CENTUNCULUS (Centunkel) *G. pl.* 189.
Cal. 4 - fidus; cor. 4 - fida; stam. brev-
via; caps. 1 - locularis circumscissa.

* *C. minimus*, L. *Vaill. t.* 4. *fig.* 2.
In agris arenosis humidis; fl. Iul. Aug.

59. SANGVISORBA (Wiesenknopf) *G.*
pl. 190.

Cal. 2 - phyllus; germen inter calycem
et corollam.

* *s. officinalis*, spicis ovatis L. *Fl. dan.*
t. 97.

In pratis vulgaris; fl. Iul — Aug.

60. CORNUS (Hartriegel) *G. pl.* 194.
Involucrum (saepius) 4 - phyllum; pe-
rianthium superum, persistens; petala su-
pera 4; drupa 2 - locularis.

1. *C. mascula*, arborea, umbellis involu-
crum aequantibus L. *Schk. t.* 24.

In hortis sepibus (Siles. Saxon. Austr. Thu-
ring. Bavar. Lips. Berol. Gött. Ien.) *Fl. Maj.*

* 2. *C. sanguinea*, ramis rectis, fol. ovatis
concoloribus; cymis depressis *L'Hérit. Fl.*
dan. t. 481.

In sepibus; fl. Iun. Iul.

3. *C. suecica*, herbacea ramis binis L.
Fl. dan. t. 6.

Locis turfosis, umbrosis (Oldenburg. Roth.)
Fl. Iun. Iul.

61. is-

61. ISNARDIA (Isnardie) *G. pl.* 207.

Cal. 4 - fidus; cor. 0; caps. 4 - locularis calyce cincta.

1. *palustris* L. *Schk. t.* 25.

In fossis et fluviis turfosis (Holsat. Oldenb. Hannov. Carinth.) Fl. Iul.

62. TRAPA (Stachelnuss) *G. pl.* 208.

Cal. 4 - partitus in spinas fructus adolescens; cor. 4 - petala; unx 1 - locularis cornuta.

* *T. natans*, nucibus 4 - cornibus: spinis patentibus L. *Schk. t.* 25.

In aquis stagnantibus; fl. Iun. Iul.

63. CAMPHOROSMA (Kampferkraut) *G. pl.* 221.

Cal. urceolatus semiquadrifidus: segmentis acutis: oppositis majusculis recurvatis; cor. 0; caps. 1 - locularis calyce tecta.

† 1. *c. monspeliaca*, fol. hirsutis L. *Schk. t.* 26.

In arvis sabulosis (Palat? POLLICH.) Fl. Iul. Aug. (Iam de veritate huius speciei cel. EHRHART dubitavit, cuius sententiam ultra in litt. ad me datis confirmavit ill. POTT, exsiccata planta edoctus revera Salsolae speciem esse.)

† 2. *c. acuta*, fol. subulatis rigidis glabris L.

In arvis siccissimis (Palat. Ien. Gies.) Fl. Iul. Aug.

64. *ALCHEMILIA* (Sinau) *G. pl.* 222.

Cal. 8 - fidus: cor. 0; stylus ad basin
germinis insertus; sem. 1.

* 1. *A. vulgaris*, fol. lobatis L. *Fl. dan.*
t. 693.

In pascuis, pratis; fl. Maj — Iun. (Var. fol.
magis incisiss; hirsuta ELW.)

* 2. *A. Aphanes*, fol. 3 - lobatis: lobis 3 -
et 2 - partitis. *Schk. t.* 26.

In arvis et agris; fl. Maj — Nov. (Stam. 4
etiam 1 - 2.)

3. *A. alpina*, fol. digitatis serratis L. *Fl.*
dan. t. 40.

In alpibus (Siles. Austr. Bavar.) etiam monto-
sis sylvaticis (Helmstad. CAPPEL.) *Fl.* Iul. Iul.

DIGYNIA.

65. *CUSCUTA* (Flachsseide) *G. pl.* 227.

Cal. 4 - 5 - fidus; cor. 1 - petala; caps.
carnosa, 2 - locularis circumscissa.

* 1. *c. europaea*, flor. sessilibus L. *Fl.*
dan. t. 199.

In sepibus inter gramina, urticas, parasitica;
fl. Iul. Aug.

* 2. *c. Epithymum*, flor. sessilibus 5 - fidis,
bracteis obvallatis L. *Fl. dan. t.* 427.

In terra supra Ericas et humiles plantas; fl.
cum priori. (Caps. dehiscentis sup. pars $\frac{1}{4}$ ma-
ior inferiore, cui dissepimentum affigitur.)

3. *c. lupuliformis*, floribus pedunculatis
racemosis. *Krock. 1. t.* 36.

Arbores more Lupuli scandens; fl. Iul. Aug.

TETRA-

2
monogyna.

TETRAGYNIA.

66. ILEX (Stechpalme) *G. pl.* 232.

Cal. 4 - dentatus; cor. 1 - petala rotata; styl. 0; bacca subtretrasperma.

1. *Aquifolium*, fol. ovatis acutis spinosis L. *Fl. dan. t.* 508.

In nemoribus, dumetis (Carn. Nassov. Holsat. Oldenb. Brem. Megap. Helmst. Hannov. Cell. Berol. etc.) Fl. Maj. (Flos hermaphr. fructiferus, masculus saepe abortiens.)

67. PATAMOGETON (Saamkraut) *G. pl.* 234.

Cal. 0; cor. 4 - petala; stylus 0; sem. 4, acuminata, gibba.

* 1. *P. natans*, fol. oblongo - ovatis petiolatis natantibus L. *Schk. t.* 28.

In fluviis, lacubus; fl. Iun. Iul.

† 2. *P. fluitans*, fol. inferioribus longissimis lanceolatis acuminatis membranaceis, superioribus ovali lanceolatis coriaceis, omnibus petiolatis ROTH.

In fossis et aquis lente fluentibus; fl. Iul. Aug. (Priori affinis.)

* 3. *P. perfoliatum*, fol. cordatis amplexicaulibus L. *Fl. dan. t.* 196.

In lacubus, fluviis argillosis; fl. Iun. Iul.

* 4. *P. densum*, fol. ovatis acuminatis oppositis confertis, caulibus dichotomis; spica 4 - flora L.

In fossis (Siles. Bavar. Austr. Holsat. Palat. Oldenb. Brem. Gött. Ien —) Fl. Iun. Iul.

* 5. *P. lucens*, fol. lanceolatis planis in petiolos desinentibus L. *Fl. dan. t. 195.*

In stagnis, fossis; fl. Iun. Iul. (Fol. striis obliquis venosis decussata BAUMG.)

* 6. *P. crispum*, fol. lanceolatis alternis oppositisve undulatis serratis L. *Fl. lond.*

In fossis, piscinis, rivulis; fl. Maj. Iun.

7. *P. serratum*, fol. lanceolatis oppositis subundulatis L.

In rivulis, in fluviis; fl. Iun. Iul.

* 8. *P. compressum*, fol. linearibus obtusis, caule compresso L. *Fl. dan. t. 203.*

In fossis, rivulis turfosis; fl. Iul. (Affinis *P. pusillo*.)

* 9. *P. marinum*, fol. linearibus alternis distinctis, inferne vaginantibus L. *Vaill. t. 32. fig. 5.*

In fluviis et fossis (Siles. Holsat. Palat. Saxon. Oldenb. Brem. Pom. Lips. Gött. Francof. Ien. Ratib. etc.) Fl. aestate. (Affinis *P. pectin.*)

10. *P. pectinatum*, fol. setaceis parallelis approximatis distichis L.

In fossis, fluviis lente motis (Siles. Bav. Saxon. Megap. Erford. Ien. Lips. —) Fl. Iun. Iul.

11. *P. setaceum*, fol. lanceolatis oppositis acuminatis L.

In lacubus, fossis (Siles. Holsat. Hercyn. Lips. Gött. Francof. Wittemb. —) Fl. Iun. Iul. (Affinis *P. denso*.)

* 12. *P. gramineum*, fol. lineari-lanceolatis alternis sessilibus, stipula latioribus L. *Fl. dan. t. 222.*

* 13. *P.*

* 13. *P. heterophyllum*, foliis submersis linearibus sessilibus, natantibus ovato-lanceolatis petiolatis.

Cum priori in fossis et paludosis (Siles. Bav. Nassov. Holsat. Berol. Gott. Lips.) Fl. Iun. — Aug.

* 14. *P. pusillum*, fol. linearibus oppositis alternisque distinctis basi patentibus, caule tereti L. *Vaill. t. 32. fig. 4.*

In paludibus, piscinis, fossis; fl. Iun. Iul.

68. RUPIA (Ruppie) *G. pl. 235.*

Cal. 0; cor. 0; sem. 4, pedicellata.

R. maritima L. *Mich. t. 35.*

In maritimis, rivulis (Siles. Holsat. Nassov. —) Fl. Iul. Aug.

69. SAGINA (Mastkraut) *G. pl. 236.*

Cal. 4 - phyllus; petala 4; caps. 1 - locularis 4 - valvis polysperma.

* 1. *s. procumbens*, ramis procumbentibus L. *Schk. t. 27.*

In pascuis sterilibus, agris sabulosis; fl. Iun. — Sept. (Apetalam nunquam observavi; caps. maturescens nutat, excussis seminibus erigitur.)

2. *s. apetala*, caule erectiusculo pubescente, floribus alternis apetalis L. *Fl. lond.*

In muris, ambulacris sabulosis, agris (Hannov. Hildes. Pyrmont. EHRH.) Fl. Maj — Aug. (Cal. margin. purpurascens; petala minutissima vix nudo oculo conspicua, alba, obcordata; Antherae albae Curtis.)

* 3. *s. erecta*, caule erecto subuniifloro L. *Vaill. t. 3. fig. 2.*

In rupibus et agris sterilibus, glareosis (Siles. Bavar. Palat. Ien. Gies. Isenac. Lips. —) Fl. Maj

Maj — Iul. (Caps. univalvis apice 8-fariam dehiscens; *Moenchia Quaternella* EHRH.)

70. *TILLAEA* (Tillie) *G. pl.* 237.

Cal. 3-4-partitus; pet. 3-4; caps. 3-4. longitudinaliter dehiscentes.

T. aquatica, erecta dichotoma, fol. acutis; flor. 4-fidis L. *Vaill. t.* 10. *fig.* 2.

In montosis, muris antiquis (Siles. Krock.) locis aquosis arenosis (Wittenb. Schk.) Fl. Maj — Aug. (Pet. rosea, etiam alba, calyce majora; filamenta 8: 4 saepissime sterilia; semina in qualibet capsula 8, opposita. Schk. tab. ined.)

Classis V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

71. *HELIOTROPIUM* (Sonnenwende) *G. pl.* 239.

Cor. hypocrateriformis, 5-fida, interjectis laciniis fauce clausa.

(*H. europaeum*, fol. ovatis integerrimis tomentosis rugosis, spicis conjugatis L. *Jacq. austr.* 3. *t.* 207.

In agris, vineis (Austr. Carn. Siles. Palat.) Fl. Iul. Aug.

72. *MYOSOTIS* (Mausohr) *G. pl.* 240.

Cor. hypocrateriformis 3-fida emarginata, squamulis fornicatis fauce clausa.

* 1. *M. arvensis*, seminibus laevibus, calyc. tubo corollae longioribus clausis; fol. hirsu-

hirsutis, caule multifloro. *Bull. t.* 355, b.

In pratis, pascuis, arvis; fl. Maj — Aug. (Var. minor in campis *Bull. l. c. a.*)

* 2. *M. palustris*, seminibus laevibus, calyc. patulis obtusis corollam aequantibus, fol. subglabris ligulatis. *Schk. t.* 29.

In paludosis; fl. Maj. Oct.

* 3. *M. sylvatica*, calyc. patulis acutis hirsutis, fol. ovato-lanceolatis. *Ehrh. herb.* 31.

In sylvaticis umbrosis; fl. Iun. Iul.

4. *M. collina*, calyc. patulis; fol. cespitosus hirsutis, caule nudo. *Ehrh. herb.* 51.

In collinis montosis; fl. Maj. Iun.

* 5. *M. Lappula*, semin. aculeis glochidibus; fol. lanceolatis pilosis *L. Fl. dan. t.* 692.

In rudèratis, muris antiquis; fl. Iun. Iul. (Sem. lignosum, pericarpiforme *MED.*)

73. LITHOSPERMUM (Steinsaame *G.* pl. 241.

Cal. 5-partitus; cor. infundibuliformis, fauce perforata.

* 1. *L. officinale*, sem. laevibus; cor. vix calycem superantibus; fol. lanceolatis *L. Schk. t.* 29.

Inter segetes, ad vias; fl. Apr. — Iun. (Pericarp. nitida alba 1. locularia, semen 1 continent *M e d.* In fauce corollae squamae 5, pericarp. saepe 2.)

* 2. *L. arvense*, sem. rugosis, cor. vix calycem superantibus L. *Fl. dan.* t. 456.
In agris et arvis; fl. Maj. Iun.

3. *L. purpureo - coeruleum*, sem. laevibus; cor. calycem multoties superantibus L. *Jacq. austr.* t. 14.

In sylvaticis montosis (Austr. Carn. Siles. Palat. Hannov. Erford. Gött. Ien. Isenac. Ratisb. —) Fl. Maj. Iun.

74. *ANCHUSA* (Ochsenzunge) *G. pl.* 242.

Cor. infundibuliformis, fauce clausa squamulis 5 fornicatis; pericarpia basi insculpta perforata.

* 1. *A. officinalis*, fol. lanceolatis; spicis imbricatis secundis L. *Fl. dan.* t. 572.

In rudcratis, agris (Siles. Carn. Austr. Bavar. Palat. Holsat. Saxon. Pom. Oldenb. Barbi, Berol. Erford. Francof. Ien. Helmstad. Lips. Wit-tenb.) Fl. Maj. Iun. (Var. flor. alb. et varieg.)

* 2. *A. angustifolia*, racemis subnudis conjugatis L.

In rudcratis, montanis (Siles. Bavar. Borus. Hass. Holsat. Palat. Saxon. Barbi, Francof. Ratisb. etc.) Fl. Maj. Iun.

3. *A. tinctoria*, tomentosa, fol. lanceolatis obtusis; stam. cor. brevioribus L.

Locis siccis, montosis (Siles. Bohem.) Fl. Iun. Iul.

75. *CYNOGLOSSUM* (Hundszunge) *G. pl.* 243.

Cor. infundibuliformis, fauce clausa squamis 5 fornicatis; pericarp. 4 depressa, apice receptaculo subulato affixa.

* 1. *c. officinale*, staminibus cor. brevioribus, fol. lato-lanceolatis, tomentosis sessilibus L. Schk. t. 30.

In ruderatis, ad vias; fl. Maj—Iul. (Var. flore albo, fol. atro-viridibus.

2. *c. cheirifolium*, cor. calyce duplo longioribus; fol. lanceolatis L.

Ad vias (Austr. Carn. Siles.) Fl. Maj.

3. *c. apenninum*, staminibus cor. aequantibus L.

In montosis (Hercyn.) depressis (Lips.) Fl. Maj.

† 4. *c. sylvaticum*; staminibus cor. brevioribus; fol. lanceolatis asperis planis, subsessilibus remotis Haenke, Jacq. collect.

2. 77.

In montosis (Austr. inf.) Fl. Maj—Iun. (Priori affinis, vel ejus varietas?)

5. *c. omphalodes repens*, fol. radicalibus cordatis L. Scop. 1. t. 3.

In sylvaticis montosis (Carn. Austr.) Fl. Mart.—Apr.

6. *c. scorpioides*, caule prostrato, fol. lanceolatis scabris; pedunculis axillaribus unifloris; seminibus umbilicatis glabris Haenke, Jacq. collect. 2. 1.

Locis nemorosis, umbrosis, subhumidis (Pragae) Fl. primo vere.

76. PULMONARIA (Lungenkraut) G.
pl. 244.

Cor. infundibuliformis, fauce pervia;
cal. prismatico-5-gonus.

1. P.

1. *P. angustifolia*, fol. radicalibus lanceolatis L. *Fl. dan. t. 483.*

In sylvis et nemoribus (Siles. Austr. Hass. Holsat. Palat. Saxon. Francof. Tub. Ien. Wit-tenb. Lips.) Fl. Apr. Maj. (Var. flore albo.)

* 2. *P. officinalis*, fol. radicalibus ovato-cordatis scabris L. *Fl. dan. t. 482.*

In sylvis umbrosis; fl. Apr. Maj. (Var. fol. maculosis.)

† 3. *P. maritima*, calyc. abbreviatis; fol. ovatis caule ramoso procumbente L. *Lightf. Scot. t. 7.*

In sylvis opacis, locis humidis (Siles. K r o c k.) Fl. Maj. Iun.

77. SYMPHYTUM (Beinwell) *G. pl. 245.*

Corollae tubus ventricosus - cylindricus: fauce clausa radiis subulatis.

* 1. *s. officinale*, fol. ovato - lanceolatis decurrentibus L. *Fl. lond.*

In umbrosis humidis vulgaris; fl. Iun. Iul.

2. *s. tuberosum*, fol. semidecurrentibus: summis oppositis L. *Iacq. austr. 3. t. 225.*

Locis humidis umbrosis (Siles. Bavar. Austr. Carn. Ratisb.) Fl. Apr. Maj.

78. CERINTHE (Wachshlume) *G. pl. 246.*

Cor. tubulato - ventricosa, fauce pervia; pericarp. 2, bilocularia.

1. *c. major*, fol. amplexicaulibus; cor. obtusiusculis patulis L. *Schk. t. 30.*

In agris, campis, montosis (Siles. Carn. Bavar.) Fl. Iun. Iul. (Var. flore variegato.)

2. *c.*

2. *c. minor*, fol. amplexicaulibus integris; corollis acutis clausis L. *Jacq. austr. t. 2. fig. 124.*

Ad sepes, in sylvis, agris (Siles. Austr. Carn. Bavar. Ien. Ratisb. —) Fl. Iun.

79. BORAGO (Borragen) *G. pl. 248.*

Cor. rotata, fauce radiis clausa.

* *B. officinalis*, fol. omnibus alternis; calyc. patentibus L. *Schk. t. 31.*

In ruderatis, locis sabulosis; fl. Iun. Iul. (Var. flore albo et caeruleo.)

80. ASPERUGO (Scharfkraut) *G. pl. 249.*

Cal. fructus compressus: lamellis plano-parallelis, sinuatis.

A. procumbens, calyc. fructus compressis L. *Fl. dan. t. 552.*

In ruderatis (Siles. Bavar. Carn. Saxon. Hol. sat. Oldenb. Barbi, Francof. Erford. Gött. Ien. Wittenb. Lips. Tub. etc.) Fl. Maj.

81. LYCOPSIS (Krummhals) *G. pl. 250.*

Cor. infundibuliformis, incurvata.

1. *L. vesicaria*, fol. integerrimis, caule prostrato; calyc. frutescentibus inflatis pendulis L.

Locis siccis montosis (Siles. Austr. Erford.) Fl. Iun. Iul.

2. *L. pulla*, fol. integerrimis, caule erecto; calyc. frutescentibus inflatis pendulis L. *Jacq. austr. 2. t. 188.*

Locis siccis, ad margines viarum, inter segetes
(Siles. Bavar. Austr. Saxon. Thuring. Berol.
Barbi, Erford. Ien. Ger. Lips. —) Fl. Iun. Iul.

* 3. *L. arvensis*, fol. lanceolatis hispidis,
calycibus florescentibus erectis L. *Fl. lond.*
In agris, arvis, inter segetes; fl. Iun. — Aug.

82. *ECHIU*M (Natterkopf) *G. pl.* 251.

Cor. campanulata limbo irregulari, fauce
nuda.

* 1. *E. vulgare*, caule tuberculato-hispido,
fol. caulinis lanceolatis hispidis; flor. spi-
catis lateralibus L. *Fl. dan. t.* 445.

In campis, muris, ruderatis; fl. Iun. Iul.
(Var. flore albo et rubro.)

2. *E. violaceum*, corollis stamina aequan-
tibus, tubo calyce brevior L.

In campis siccis, sylvaticis (Siles. Austr. Tu-
bing.) Fl. Iul.

83. *ANDROSACE* (Mannsharnisch)

G. pl. 257.

Cor. tubus ovatus: faux glandulis ob-
sessa; caps. 1 - locularis globosa.

1. *A. maxima*, perianthiis fructuum ma-
ximis L. *Jacq. austr. 4. t.* 331.

In agris et arvis (Austr. Carn. Palat. Dresd.)
Fl. Maj. Iun.

2. *A. elongata*, fol. subdentatis, pedi-
cellis longissimis; cor. calyce brevioribus
L. *Schk. t.* 33.

In rupibus, agris elatioribus (Saxon. Austr.
Barbi, Lips. BAUMG. —) Fl. Apr. Maj.

3. *A.*

3. *A. septentrionalis*, fol. lanceolatis dentatis glabris; perianthiis angulatis, cor. brevioribus L. *Fl. dan.* t. 7.

In montosis (Hassiae MOENCH.) In muris (Vien. SCHRANK.) Fl. Iul. Aug.

84. PRIMULA (Schlüsselblume) G. pl. 258.

Cor. tubus cylindricus superius ampliat, patulus; caps. 1 - locularis apice 10 - dentato dehiscens.

* 1. *P. officinalis*, fol. rugoso - dentatis; limbo corollarum concavo, tubi collo oblongo. *Fl. dan.* t. 433. *Bull. herb.* t. 171.

* 2. *P. inodora*, fol. rugoso - dentatis, limbo cor. plano, tubi collo hemisphaerico. *Fl. dan.* t. 434.

In pratis et nemorosis cum priori; fl. April. Maj. (Var. Cor. limbo ad faucem usque 5 - dentato. *P. elatior*.)

3. *P. acaulis*, fol. subtus villosis, pedunculis radicalibus unifloris. *Fl. dan.* t. 194.

In nemorosis (Bavar. Carn. Saxon. Lips. —) Fl. Apr. Maj.

* 4. *P. farinosa*, fol. crenatis glabris; flor. limbo plano L. *Fl. dan.* t. 125.

In montosis, pratis humidis (Austr. Carn. Bavar. Rom. Ratisb. —) Fl. Maj — Nov.

5. *P. glutinosa*, fol. serrulatis lanceolatis glutinosi; involucri longitudine florum sessilium L. *Jacq. austr. ap.* t. 26.

In montosis, subalpinis (Austr. Bav.) Fl. Iul. Aug.

85. CYCLAMEN (Schweinbrod) *G. pl.* 262.

Cor. rotata reflexa tubo brevissimo; fauce prominente; bacca tecta capsula.

c. europaeum, corolla retroflexa L. *Jacq. anstr.* 5. t. 401.

In umbrosis siccis, nemorosis (Austr. Carn. Siles. Bavar.) Fl. Jul — Sept. (Receptaculum baccans, theca inclusum MED.

86. MENYANTHES (Zottenblume) *G. pl.* 263.

Cor. hirsuta; stigma 2 - lobum; caps. 1 - locularis, 2 - valvis.

1. *M. Nymphoides*, fol. cordatis integerrimis; cor. (dentato-) ciliatis L. *Fl. dan.* t. 339.

In fossis et lacubus (Bavar. Palat. Holsat. Borussia. Brem. Oldenb. Gies. Ien. Danisc. Ratisb. —) Fl. Jul. Aug.

* 2. *M. trifoliata*, fol. ternis L. *Fl. lond.*

In pratis paludosis; fl. Apr. — Iun. (Laciniarum apices nudi; stigma longitudine staminum: staminibus conniventibus illudque tegentibus, anthesi peracta ultra assurgens.)

87. HOTTONIA (Wasserfeder) *G. pl.* 265.

Cor. hypocrateriformis; stam. tubo corollae imposita; stigma globosum; caps. 1 - locularis.

* *H. palustris*, pedunculis verticillato-multifloris L. *Fl. lond.*

In fossis, paludibus; fl. Maj. Iun.

88. *LYSIMACHIA* (Lysimachie) *G.**pl.* 269.

Cor. rotata; caps. globosa mucronata, 5-10 - valvis.

Pedunculis multifloris.

* 1. *L. vulgaris*, paniculata: racemis terminalibus *L. Bull. t.* 347.

In nemoribus, ad ripas fluviorum; fl. Iun. Iul. (Filamenta basi connata inaequali longitudine; stigma ad lentem triangulare.)

* 2. *L. thyrsiflora*, racemis lateralibus pedunculatis *L. Fl. dan. t.* 517.

In fossis, paludibus (Siles. Bav. Palat. Barbi, Berol. Wittenb. Lips. Tubing. etc.) Fl. Iun. Iul.

Pedunculis unifloris.

3. *L. punctata*, fol. subquaternis subsessilibus; pedunc. verticillatis unifloris *L. Jacq austr. 4. t.* 366.

In montosis, ad fossas, in paludosis (Siles. Austr. Carn. Bavar.) Fl. Iul. Aug.

* 4. *L. nemorum*, fol. ovatis acutis; flor. solitariis; caule procumbente *L. Fl. dan. t.* 174.

In nemorosis montosis; fl. Iun. Iul.

* 5. *L. Nummularia*, fol. subcordatis; flor. solitariis; caule repente *L. Fl. lond.*

In umbrosis, locis humidis depressis; fl. Iun. Iul. (Fol. magnitudine variant.)

89. *ANAGALLIS* (Gauchheil) *G. pl.* 270.

Cor. rotata; caps. globosa 1 - locularis, circumscissa.

* 1. *A. phoenicea*, fol. ovato-lanceolatis: calyc. segmentis lanceolatis. *Schk. t. 36. Fl. lond.*

In agris, arvis; fl. Iun. Iul. (Var. flore carneo alboque.)

* 2. *A. caerulea*, fol. ovato-lanceolatis calyc. segmentis acutioribus.

In agris, arvis, inter segetes; fl. Iul. Aug.

90. CONVULVULUS (Winde) *G. pl. 287.*

Cor. campanulata plicata; stigmata 2; caps. 2 - 3 - locularis: loculis dispermis.

* 1. *C. arvensis*, fol. sagittatis utrinque acutis; pedunculis subunifloris L. *Fl. lond.*

In agris, arvis; fl. Maj - Iul. (Dissepimentum bialatum.)

* 2. *C. sepium*, fol. sagittatis postice truncatis; pedunculis tetragonis 1 - floris L. *Fl. lond.*

In sepibus, salicetis; fl. Iun - Aug. (Dissepimentum utrinque laterale, dimidiatum.)

91. POLEMONIUM (Speerkraut) *G. pl. 289.*

Cor. rotata; filamentis tubo insertis basi dilatatis; caps. 3 - locularis.

P. coeruleum, fol. pinnatis; floribus erectis, calyc. tubo corollae longioribus *Fl. dan. t. 255.*

In sylvis, pratis (Austr. Siles. Bavar. Boruss. Hassiae, Hercyn.) fl. Iun. Iul. (Var. albo flore.)

92. CAM-

92. CAMPANULA (Glockenblume) G.
pl. 290.

Cor. campanulata, fundo clausa valvis staminiferis; stigma 3 - fidum; caps. infera 3 - 5 - locularis; totidem prope basin foraminibus dehiscens.

Foliis laevioribus.

* 1. *C. rotundifolia*, fol. radicalibus reniformibus, caulinis linearibus L. *Fl. dan.* t. 189.

Locis gramineis; fl. Iul. Aug. (Var. foliorum radicalium figura, Panzer obs. p. 41; statura et figura: minor, linifolia, uniflora. Inter quas tamen jure meritoque camp. pusillam et linifoliam accuratius distinxit cel. HÄENKE, Jacq. coll. v. 2. p. 79.)

* 2. *C. patula*, fol. strictis: radicalibus lanceolato - ovalibus, panicula patula L. *Fl. dan.* t. 373.

In arvis, agris, locis graminosis; fl. Iun. Iul. (Flores exigui parvi; cal. ad laciniarum basin denticulo 2 - fido. BAUMG.)

* 3. *C. Rapunculus*, fol. undulatis: radicalibus lanceolato - ovalibus, panicula coarctata L. *Fl. dan.* t. 855.

In agris, sylvis, locis graminosis; fl. Maj - Iul. (Caul. angulatus, hirsutus.)

* 4. *C. persicifolia*, fol. radicalibus obovatis, caulinis lanceolato - linearibus subserratis sessilibus remotis L. *Bull.* t. 367.

In nemorosis montosis; fl. Iul. Aug.

5. *c. pyramidalis*, fol. laevibus serratis cordatis: caulinis lanceolatis; caulibus junceis simplicibus, umbellis sessilibus lateralibus L.

In sylvis (Carn. Austr. Tubing. Halae Sax. —) Fl. Jul. Aug.

+ 6. *c. rhomboidea*, fol. rhomboidibus serratis, spica secunda; calyc. dentatis L.

In montosis, subalpinis (Carn. Tubing.) Fl. Jul. Aug.

Fol. Scabris.

7. *c. latifolia*, fol. ovato - lanceolatis, caule simplicissimo tereti; flor. solitariis pedunculatis, fruct. cernuis L. *Fl. dan. t. 85.*

In montosis (Siles. Holsat. Nassov. Hannov. Berol. Tubing. —) Fl. Jul. Aug.

* 8. *c. rapunculoides*, fol. cordato - lanceolatis, caule ramoso; flor. secundis sparsis; calyc. reflexis L.

In cultis, arvis, agris; fl. Inn. Jul.

9. *c. bononiensis*, fol. ovato - lanceolatis, subtus scabris, sessilibus, caule paniculato L.

In nemorosis montosis (Carn. Saxon.) In agris inter segetes (Brunsvig. POTT.) Fl. Jul.

* 10. *c. Trachelium*, caule angulato, fol. petiolatis; calyc. ciliatis, pedunc. trifidis L. *Bull. t. 319.*

In sepibus, ad sylvarum margines frequentes, fl. Jul. Aug. (Var. pedunculis unifloris.)

* 11. *c. glomerata*, caule angulato simplici; flor. sessilibus, capitulo terminali L. *Hoppe, Ect.* 334.

In montosis, campis; fl. Iun. Iul. (Var. fol. et capitulis confertissimis ALLION. p e d. t. 39. f. i.)

12. *c. Cervicaria*, hispida, flor. sessilibus, capitulo terminali; fol. lanceolato-linearibus undulatis L. *Fl. dan. t.* 787.

In sylvaticis montosis (Siles. Saxon. Hercyn. Hass. Palat. etc.) Fl. Iun. Iul.

+ 13. *c. thyrsoidea*, hispida, racemo ovato-oblongo terminali, caule simplicissimo, fol. lanceolato-linearibus L. *Jacq. austr. 5. t.* 411.

In montosis (Austr. Carn. Hercyn. —) Fl. Aug.

Capsulis obtectis calycis sinibus reflexis.

14. *c. Medium*, caps. 5-locularibus obtectis, caule dichotomo; flor. cernuis L.

In sylvis, montosis (Austr. Carn. Bavar. Nassov. Tubing. —) Fl. Aug.

+ 15. *c. barbata*, caps. 5-locularibus obtectis, caule simplicissimo subunifolio, fol. lanceolatis; cor. barbatis L. *Krock. 1. t.* 38?

In montosis, subalpinis (Siles. Thuring. Tubing. —) Fl. Aug.

+ 16. *c. spicata*, hispida spica laxa, flor. alternis; fol. linearibus integerrimis L.

In montosis, subalpinis (Siles. Hass.) Fl. Iul.

* 17. *c. Speculum*, caule ramosissimo diffuso, fol. oblongis subcrenatis; flor. solitariis, caps. primaticis L.

Inter segetes (Siles. Austr. Carn. Bavar. Hass. Palat. Lips. etc.) Fl. Iun — Aug.

18. *c. hybrida*, caule basi subramoso stricto, fol. oblongis crenatis; calyc. aggregatis corolla longioribus; caps. prismaticis L.

Inter segetes (Siles. Holsat.) Fl. Iul. Aug.

19. *c. hederacea*, fol. cordatis 5 - lobis petiolatis glabris, caule laxo L. Fl. dan. t. 330.

Locis depressis (Oldenb. ROTH.) Fl. Aug.

93. PHYTEUMA (Rapunzel) G. pl. 292.

Cor. ab initio corniculata, ad basin dein 5 - partita, rotata: laciniis linearibus; caps. 2 - 3 - locularis, utrinque foramine laterali dehiscens.

1. *P. hemisphaerica*, capitulo subrotundo, fol. linearibus subintegerrimis L.

In alpinis (Styr. Tirol. Austr.) subalpinis (Hass. Thuring? Hercyn?) in pratis (Ratisb. DÜVAL.) Fl. Iul. Aug.

2. *P. orbicularis*, capitulo subrotundo, fol. serratis, radicalibus cordatis L. Jacq. austr. 5. t. 437.

In montosis nemorosis (Austr. Siles. Carn. Bavar. Hercyn. Saxon. Hassiae, Lips. etc.) Fl. Iun. Iul.

* 3. *P. spicata*, spica oblonga; caps. 2 - locularibus; fol. radicalibus cordatis L. Fl. dan. t. 362.

In pratis et nemoribus frequens; fl. Iun. Iul. (Var. coroll. albic. caerule; tubus coroll. basi glo.

globosus, intra quem ante explicationem laciniarum, antherae arcte stigmati indiviso adpressae; anthesi peracta dehiscit tubus corollae, stylus eminet, stigma 2 - 3 - fidum, revolutum. Receptacula superiori tantum parte dissepimenti adnata.)

94. SAMOLUS (Pungen) *G. pl.* 294.

Cor. hypocrateriformis 5 - fida: lacinulis 5 accessoriis ad basin divisionum; caps. infera, 1 - locularis, 5 - valvis.

s. *Valerandi*. *L. Fl. lond.*

In maritimis, ad fontes (Holsat. Saxon. Bav. Palat. Boruss. Hannov. Calenb. Francon. Helmstad. Barbi, Lips. —) Fl. Iul.

95. LONICERA (Lonizere) *G. pl.* 319.

Cor. 1 - petala irregularis: laciniis revolutis: una profundius separata; stigma capitatum; bacca infera.

Caule volubili.

1. *L. Caprifolium*, flor. verticillatis terminalibus sessilibus; fol. summis connatoperfoliatis *L. Jacq. austr.* 4. t. 357.

Inter frutices (Austr. Carn. Siles. Bay. Palat. Thuring. Fuld. Lips. Ratisb. —) Fl. Iul.

* 2. *L. Periclymenum*, capitulis ovatis imbricatis terminalibus; fol. omnibus distinctis *L. Fl. lond.*

Inter frutices, ad sepes; fl. Iun. Iul. (Bacca ovalis, sem. 4 continens.)

Pedunculis bifloris.

* 3. *L. nigra*, pedunculis bifloris, baccis distinctis; fol. ellipticis integerrimis L. *Jacq. austr. 4. t. 514.*

In montosis, ad sepes (Siles. Austr. Bavar. Saxon. Ien. —) Fl. Maj — Iul.

* 4. *L. Xylosteum*, pedunculis bifloris, baccis distinctis; fol. integerrimis pubescentibus L. *Fl. dan. t. 808.*

Ad sepes; fl. Maj. Iun. (Baccam observo 2. locularem, semina filo dissepimento adnata; cel. GAERTNER baccam 1. locularem, semina undique carni adnata.)

96. VERBASCUM (Kerze) *G. pl. 531.*

Cor. rotata subaequalis; filamenta inclinata villosa; caps. 2. locularis, dissepimentum alatum.

* 1. *v. Thapsus*, fol. decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici L. *Fl. dan. t. 631.*

In collibus sabulosis; fl. Iul. Aug. (Filamenta 2 inferiora glabra. Var. caule ramoso; stigmate bifido; cor. albidis majoribus.)

2. *v. phlomoides*, fol. ovatis utrinque tomentosis: inferioribus petiolatis L.

In montosis saxosis (Siles. Austr. Saxon. Hass. Boruss. Barbi, Tubing. —) Fl. Iul. (Filamenta basi pilosa.)

* 3. *v. Lychnitis*, fol. cuneiformi. oblongis L. *Fl. dan. t. 586.*

In ruderalis, rupestribus; fl. Iul — Sept. (Filamenta subaequalia, lutescente villo vestita.)

* 4. *v. nigrum*, fol. cordato - oblongis petiolatis L.

Ad vias, sepes; fl. Iun - Aug. (Filamenta purpureo villo adspersa.)

5. *v. phoeniceum*, fol. ovatis nudis crenatis radicalibus, caulē subnudo racemoso L. *Jacq. austr. 2. t. 125.*

In montosis (Austr. Siles. Carn. Bavar. Bohem Barbi, -) in collinis (comit. Regenstein POTT.) Fl. Iun. Iul. (Filamenta 2. atro - purpurea, barbata.)

* 6. *v. Blattaria*, fol. amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis solitariis L.

Locis argillosis, arenosis ad fossarum margines (Siles. Austr. Carn. Bavar. Holsat. Palat. Saxon. Wittenb. Fuld. Lips. etc.) Fl. Iun. Iul. (Filamenta violacea barbata, stylus violaceus.)

97. DATURA (Stechapfel) *G. pl. 332.*

Cor. infundibuliformis plicata, cal. deciduus, basi orbiculata persistente; caps. 4 - valvis.

* D. *Stramonium*, pericarpis spinosis erectis ovatis; fol. ovatis glabris L. *Fl. dan. 436.*

In ruderatis, incultis; fl. Iun - Sept.

98. HYOSCYAMUS (Bilsenkraut) *G. pl. 333.*

Cor. infundibuliformis obtusa; semi 5-fida: lacinia unica reliquis latiore; stam. inclinata; caps. 2 - locularis, circumscissa operculo dehiscente.

* 1. *H. niger*, fol. amplexicaulibus sinuatis; floribus sessilibus L. *Bull. t.* 93.

Ad vias, in ruderatis; fl. Iul. Aug.

2. *H. albus*, fol. petiolatis sinuatis obtusis; flor. sessilibus L. *Bull. t.* 99.

In elatioribus siccis (Siles. Boruss. —) Fl. Iul.

99. *ATROPA* (Wolfskirsche) *G. pl.* 335.

Cor. campanulata; stamina distantia; bacca globosa, 2 - locularis.

* *A. Belladonna*, caule herbaceo; fol. ovatis integris L. *Fl. lond.*

In sylvis montosis; fl. Iul. Aug.

100. *PHYSALIS* (Schlutte) *G. pl.* 336.

Cor. rotata: stamina conniventia; bacca intra calycem inflatum coloratum.

* *P. Alkekengi*, fol. geminis integris acutis, caule herbaceo inferne subramoso L. *Schk. t.* 45.

Ad vias, sepes (Siles. Austr. Carn. Bay. Sax. Francof. Hass. etc.) Fl. Iul. Aug.

101. *SOLANUM* (Nachtschatten) *G. pl.* 337.

Cor. rotata; antherae subcoalitae apice poro gemino dehiscentes; bacca 2 - locularis.

* 1. *s. Dulcamara*, caule inermi frutescente flexuoso, fol. superioribus hastatis, racemis cymosis L. *Fl. lond.*

In sepibus, locis aquosis; fl. Iun. — Aug. (Receptaculum planum vel potius meniscoideum, sensim evanescens.

* 2. s. *nigrum*, caule inermi herbaceo, fol. ovatis dentato - angulatis, racemis distichis mutantibus L. *Fl. lond.*

In ruderatis, locis incultis; fl. Iul. Aug. (Varietates vel subspecies: baccis luteis, croceis; caule aspero, aculeato; fol. angulatis, integris.)

3. s. *villosum*, caule inermi herbaceo, ramis teretibus villosis, fol. ovatis angulosis villosis, baccis nigris acinis luteis BAUMG.

Cum priori (Planta odore Moschi BAUMG.)

102. RHAMNUS (Wegdorn) G. pl. 358.

Cor. squamulis conniventibus stamina munientes; drupa subrotunda.

* 1. R. *catharticus*, spinis terminalibus; flor. 4 - fidis dioicis; fol. ovatis caule erecto L. *Fl. dan. t. 850.*

In sepibus dumetis; fl. Maj. Iun. (Flores dioici, etiam hermaphroditi; drupa 4 - 5 - locularis.)

2. R. *infectarius*, spinis terminalibus; flor. 4 - fidis dioicis; caul. procumbentibus L.

In montosis asperis duris (Carn. Carinth. —) Fl. Maj.

* 3. R. *alpinus*, inermis; floribus dioicis; fol. duplicato crenatis L.

In montosis (Siles. Hass. Austr. Carn. Carinth. —) Fl. Maj.

4. R. *pumilus*, inermis repens; flor. hermaphroditis; fol. petiolatis ovatis crenatis Wulf. Jacq. coll. 2. t. 11.

In montosis rupestribus (Carn. Carinth. —) Fl. Iun.

5. R.

* 5. *R. Frangula*, inermis; floribus monogynis hermaphroditis; fol. integerrimis L. *Fl. dan. t. 278.*

In nemorosis humidis; fl. Maj. Iun. (Drupa 2 - sperma; 3 - sperma SCHKUR; ossiculis 4. MED.

103. *EVONYMUS* (Spindelbaum) *G. pl. 373.*

Cor. 4 - 5 - petala; filamenta germini imposita; theca antrorsa, 4 - 5 - gona colorata.

1. *E. latifolius*, flor. plerisque 5 - fidis; capsulis alato - angulatis in pedunculis folio longioribus L. *Jacq. austr. 3. t. 289.*

Ad sepes (Siles. Austr. Carn. Bavar. Hass. -) Fl. Maj. Iun.

* 2. *E. europaeus*, flor. plerisque 4 - fidis; fol. sessilibus L. *Bull. t. 135.*

Ad sepes vulgaris; fl. Maj. Iun.

104. *RIBES* (Krausbeere) *G. pl. 390.*

Pet. 5. et stamina calyci inserta; bacca infera.

Inermia.

* 1. *R. rubrum*, inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis L.

In sepibus; fl. Apr. Maj. (Petala 2 - fida. Var. bacois albidis et incarnatis, fol. aureo - maculatis.

* 2. *R. alpinum*, inerme, racemis erectis; bracteis flore longioribus L. *Jacq. austr. 1. t. 47.*

In montosis dumetis (Austr. Siles. Bav. Hass. Palat. Nassov. Saxon. etc.) Fl. Maj. Iun. (Planta dioica.)

* 3. *R. nigrum*, inerme, racemis pilosis, floribus oblongis L. *Fl. dan. t. 556.*

In sepibus, dumetis; fl. Maj. Iun.

4. *R. acidum*, Ehrh. *frut. 81.*

Hannoverae —

Aculeata.

5. *R. Grossularia*, ramis aculeatis, petiolorum ciliis pilosis; baccis hirsutis L.

Ad sepes; fl. Apr. Maj. (Var. baccis rubris.)

* 6. *R. Uva crista*, ramis aculeatis; baccis glabris, pedicellis bractea monophylla L. *Schmid. icon. t. 1.*

Ad sepes, dumeta; fl. Apr. Maj. (Styli ut in priori 2; semina pedicellata.)

105. *HEDERA* (Ephen) *G. pl. 395.*

Petala 5 apice incurva; bacca globosa receptaculi rudimento coronata.

* *H. Helix*, fol. ovatis lobatisque L. *Fl. lond.*

In sylvis, ad muros, scopulos parasitice; fl. Sept. Oct. (Bacca 5 - sperma; 2 - 3 - sperma ROTH; exsucca 5 - locularis, sem. solitaria: nucleo ruminato GAERT.; var. ratione aetatis foliis in arbore ovatis lobatisque, 5 - lobis; humi repens lanceolatis; etiam variegatis.)

106. *ILLECEBRUM* (Knorpelkelch) *G. pl. 407.*

Cal. 5 - phyllus, cartilagineus; cor. 0; caps. 5 - valvis, 1 - sperma.

F

1. var.

1. *verticillatum*, floribus verticillatis nudis; caule procumbente L. *Schk. t. 50.*

In pascuis subhumidis (Siles. Hass. Holsat. Brem. Hannov. Oldenb. Wittenb. Berol. Barbi, Gött. Helmstad. Ratisb. Fuld. Erford. —) Fl. Iul. Aug. (Bractea sub calyce diphylla, intra foliola calycis laciniae 5 minutae lanceolatae SCHKUH.)

107. GLAUX (Milchkraut) *G. pl. 408.*

Cal. 0; cor. 1 - petala, 5 - partita; caps. 1 - locularis 5 - valvis.

G. maritima, L. *Fl. dan. t. 548.*

In maritimis, humidis (Siles. Holsat. Pomer. Megap. Boruss. Hannov. Saxon. Palat. etc.) Fl. Maj. Iun. (Cor. viridis, demum alba vel rubra potius pro calyce sumenda.)

108. THESIUM (Leinblatt) *G. pl. 410.*

Cal. 1 - phyllus, cui stamina inserta; cor. 0; sem. 1, inferum.

* 1. *T. Linophyllum*, panicula foliacea: foliis linearibus L. *Schk. t. 51.*

In siccis montosis (Siles. Bavar. Austr. Carn. Hass. Palat. Saxon. etc.) Fl. Iun. Iul. (Ad basin filamenti fasciculus pilorum SCHK.)

2. *T. montanum*, Ehrh. *herb. 2.*

In montosis; fl. Iul. (Hujus loci *T. bavaricum*, ramis virgatis, fol. lanceolatis trinerviis, floribus paniculatis SCHRANK.)

* 3. *T. alpinum*, racemo foliato, foliis linearibus L. *Jacq. austr. 5. t. 416.*

In montosis (Siles. Austr. Carn. Bavar. Palat. etc.) Fl. Iun. Iul.

4. *T.*

4. *T. pratense*, Ehrh. herb. 12.

In Hercynia —

109. VINCA (Sinngrün) G. pl. 419.

Contorta. Cor. hypocrateriformis; stigma capitatum orbiculo plano insidens; folliculi 2, 1 - valves.

* 1. *V. minor*, caulib. procumbentibus, fol. lanceolato - ovatis; flor. pedunculatis L.

In umbrosis; fl. Apr. — Iun. (Filamenta apice barbata; var. flor. albis, foliis variegatis.)

DIGYNIA.

110. ASCLEPIAS (Aesculapie) G. pl. 429.

Contorta. Cor. 5 - partita; nectaria 5 carnosae s. cucullatae, tuba filamentorum infra antheras adnata; corniculum exsertentia; folliculi 2, 1 - loculares; semina pappo coronata, receptaculo libero adnata.

* *A. Vincetoxicum*, fol. ovatis basi barbatis, caule erecto, umbell. proliferis L. Schk. t. 55.

In nemorosis montosis, dumetis; fl. Maj. Iun. (Cornicula nect. deficiunt SCHK.)

111. HERNIARIA (Bruchkraut) G. pl. 434.

Cal. 5 - partitus; cor. 0; stamina 5 - sterilia, calyci alterna; caps. 1 - sperma.

* 1. *H. glabra*, L. Fl. dan. t. 529.

In apricis, glareosis, siccis; fl. Iun — Sept.

* 2. *H. hirsuta*, L.

Ad vias glareosas (Carn. Palat. Lips. —) Fl. Iul. Aug.

112. CHENOPODIUM (Gänsefuß) *G. pl.* 435.

Cal. 5 - partitus, persistens, pentagonus clausus; cor. 0; sem. 1, lenticulare superum.

Foliis angulosis.

* 1. *c. bonus Henricus*, fol. triangulari-sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis axillaribus L. *Bull. t.* 517.

Ad vias, locis ruderatis; fl. Maj — Aug. (Semen ovato-lenticulare, membrana vestitum.)

2. *c. urbicum*; fol. triangularibus subdentatis, racemis confertis strictissimis cauli approximatis longissimis L.

Ad pagos, in ruderatis; fl. Iul. Aug.

* 3. *c. rubrum*, fol. cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subfoliosis caule brevioribus L.

In cultis, ruderatis, humidiusculis; fl. Iul. Aug. (Adulta vel gelu tacta planta citissime rubet.)

* 4. *c. murale*, fol. ovatis nitidis dentatis acutis, racemis ramosis nudis L.

In muris, aggeribus, vallibus; fl. Iun — Sept.

* 5. *c. album*, fol. rhomboideo-triangularibus erosis, postice integerrimis: summis oblongis, racemis erectis L. *Fl. lond.*

In cultis; arvis, inter segetes; fl. Iun — Aug.

* 6. *c. viride*, fol. rhomboideis dentato-sinuatis, racemis ramosis subfoliatis L. *Fl. lond.*

In cultis oleraceis; fl. Iun. Iul. (Calyces argute pentagoni.)

* 7. *c.*

*7. *c. hybridum*, fol. cordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis nudis L. *Fl. lond.*

In cultis oleraceis, graminosis; fl. Iul. Aug.

8. *c. Botrys*, fol. oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis L.

Locis sabulosis (Siles. Carn. Bavar —) Fl. Iun. Iul.

†9. *c. ambrosioides*, fol. lanceolatis dentatis, racemis foliatis simplicibus L.

In exstructis (Barbi, Austr. —) Fl. Iul.

*10. *c. glaucum*, fol. ovato-oblongis repandis, racemis nudis simplicibus glomeratis L. *Hoppe, ect. t. 524.*

In ruderatis, cultis, fimetosis; fl. Iul. Aug.

Foliis integris.

*11. *c. Vulvaria*, fol. integerrimis rhomboideo-ovatis; flor. conglomeratis axillaribus L. *Fl. lond. (c. olidum.)*

Ad sepes, fimeta; exstructa; fl. Iul. Aug.

*12. *c. polyspermum*, fol. integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus L. *Fl. lond.*

In oleraceis, agris, ruderatis; fl. Iul. Aug.

13. *c. maritimum*, fol. subulatis semicylindricis L. *Fl. dan. t. 489.*

In littoribus marinis (Carn. Pom. Holsat. Megap. Oldenb.) ad salinas (prope Hal. Saxon. Barbi, Lips —) Fl. Iul. Aug.

113. *SALSOLA* (Salzkraut) *G. pl. 437.*

Cal. 5-partitus persistens; cor. o; caps. 1-locularis; semen cochleatum.

s. *Kali*, herbacea decumbens, fol. subulatis spinosis; calyc. marginatis axillari-
bus L. *Fl. dan.* t. 818.

In littoribus marinis (Holsat. Megap. Oldenb. Boruss. Barbi, Danic. —) Fl. aestate.

114. ULMUS (Rüster) G. pl. 443.

Cal. 5 - fidus, interne coloratus; cor. o;
pericarpium compressum membranaceo -
alatum, 1 - locale.

* 1. *U. campestris*, fol. duplicato - serra-
tis, basi inaequalibus L. *Fl. dan.* t. 632.

In sylvis, ad sepes; var. *carpinifolio* in mon-
tosis; fl. Apr. Maj. (Var. *cortice rimoso*, fol.
majoribus, glabris, hirsutis; stam. 3 - 5. u. n u.
d a, Ehrh. arb. 62.)

2. *U. octandra*, fol. duplicato - serratis
hirsutis; flor. octandris longe peduncula-
tis Schk. t. 57.

Cum priori (Var. *staminibus* 7, pericarp. hir-
sutis, pedunculis effusis: an eadem cum effusa
Wild? *U. ciliata* Ehrh. arb. 72.)

115. SWERTIA (Swertie) G. pl. 449.

Cor. rotata: nectariferi pori ad basin la-
ciniarum; caps. 1 - locularis, 2 - valvis.

s. *perennis*, cor. 5 - fidis; fol. radicali-
bus ovalibus L. *Jacq. austr.* 3. t. 243.

In montosis, subalpinis (Austr. Siles. Bav.
Megap —) Fl. Iul. Aug. (Coroll. 4 - fidis Schk.)

116. GENTIANA (Enzian) *G. pl.* 450.

Cor. 1 petala inferne tubulosa; caps. 2 - valvis 1 - locularis; recept. 2, longitudinalibus; sem. parva.

1. *G. lutea*, cor. subquinquefidis rotatis verticillatis; calyc. spathaceis L.

In alpinis (Carn. Siles. Bav.) etiam in sylvis montosis (prope Tubing. —) Fl. Iun. Iul.

2. *G. Pneumonanthe*, cor. 5 - fidis campanulatis oppositis pedunculatis, fol. linearibus L. *Fl. dan. t.* 269.

Locis graminosis, in pascuis humidis; fl. Iul — Sept.

3. *G. acaulis*, cor. 5 - fida campanulata caulem excedente L. *Jacq. austr. 2. t.* 135.

Locis excelsis (Austr. Siles. Carn. Bavar. —) etiam depressis (prope Ratisb. Monach.) Fl. Iul. Aug.

4. *G. verna*, cor. 5 - fida infundibuliformi caulem excedente; fol. radicalibus confertis majoribus L.

In pratis (Siles. Austr. Carn. Bav. Nassov —) Fl. primo vere.

† 5. *G. bavarica*, cor. 5 - fida infundibuliformi - serrata; fol. ovatis obtusis L.

In alpinis (Tirol. Salisb. Styr.) montosis (Bavar. Tubing? —) Fl. Iul. Aug.

6. *G. utriculosa*, cor. 5 - fidis hypocrateriformibus, calyc. plicato - carinatis L.

In pratis siccis (Carn. Bavar. Palat —) Fl. Iun — Sept.

7. *G. Centaurium*, cor. 5 - fidis infundibuliformibus; caule dichotomo pistillo simplici L. *Fl. dan. t. 617. Fl. lond.*

In sylvaticis, pratis, pascuis; fl. Iun. Aug. (Var. statura proceriori, minori Vaill. t. 6. f. 1, caule ramosissimo; flore inaperto Vaill. t. 6. f. 2.)

† 8. *G. spicata*, cor. 5 - fidis infundibuliformibus, floribus alternis sessilibus L.

In sylvaticis (prope Tubingam GMEL.) Fl. Aug.

* 9. *G. Amarella*, cor. 5 - fidis hypocrateriformibus fauce barbatis L. *Fl. dan. t. 328.*

In pratis, pascuis, montosis; fl. Aug. Sept. (Var. caule digitali et bipedali; cor. faux ciliis conniventibus.)

10. *G. campestris*, cor. 4 - fidis fauce barbatis L. *Fl. dan. t. 367.*

In pratis, siccis (Siles. Austr. Carn. Bavar. Hannov. Nassov. Holsat. Saxon. Megap. Pomer. etc.) Fl. cum priori, cui valde affinis.

† 11. *G. tetragona*, cor. 4 - fidis imberbibus, pedunculis tetragonis longis terminalibus in caule dichotome subramoso, fol. ovatis ROTH. *Fl. dan. t. 318.*

In pascuis nemorosis (Oldenb.) —

* 12. *G. ciliata*, cor. 4 - fidis margine ciliatis L. *Jacq. austr. 2. t. 113.*

In montosis, pratis, pascuis; fl. Aug. Sept.

* 13. *G. Cruciata*, cor. 4 - fidis imberbibus, floribus verticillatis sessilibus L. *Jacq. austr. 4. t. 372.*

In montosis pratisque siccis; fl. Iul. Aug.

14. *G.*

14. *G. filiformis*, cor. 4 - fidis imberbi-
bus; caule dichotomo filiformi L. *Fl.*
dan. t. 324.

In campis, ericetis humidis, arenosis, turfosis
(Oldenb. Brem. Hannov. — Brunsvig. Pott —)
Fl. Iul. Aug.

117. *ERYNGIUM* (Manstreu) *G. pl. 456.*

Flores capitati; recept. paleaceum; fruc-
tus calyce et squamulis muricatus.

1. *E. maritimum*, fol. radicalibus subro-
tundis plicatis spinosis, capitulis peduncu-
latis, paleis tricuspidatis L. *Fl. dan. t. 875.*

Ad littora marina (Holsat. Carn. Megap. Po-
mer. Gryph. Danisc —) Fl. Iun. Iul.

2. *E. planum*, fol. radicalibus ovalibus
planis crenatis, capitulis pedunculatis L.
Jacq. austr. 4. t. 391.

In pratis (Siles. Austr. Danisc —) Fl. Iul.

3. *E. campestre*, fol. radicalibus ample-
xicaulibus pinnato lanceolatis L. *Fl. dan.*
t. 554.

In campis, versuris; fl. Iul. Aug.

4. *E. amethystinum*, fol. radicalibus tri-
fidis basi subpinnatis L.

In montosis (Styr. Austr. Tubing —) Fl. Iun.
(Priori affinis.)

118. *HYDROCOTYLE* (Wassernabel *G.*
pl. 457.

Umbella simplex pedicellata; involucr.
2 - 4 - phyllum; petala integra; fructus
a latere compressus gibbus bipartibilis.

* *H. vulgaris*, fol. peltatis, umbellis 5 -
floris L. Schk. t. 59.

Locis inundatis, uliginosis (Siles. Palat. Sax-
on. Megap. Pom. Oldenb. Wittenb. Barbi, Be-
rol. Lips. Gött. etc.) — Fl. Iul. Aug.

119. *SANICULA* (Sanikel) *G. pl.* 458.

Umbellae confertae subcapitatae; fructus
aculeis hamatis undique muricatus.

* *s. europaea*, fol. radicalibus simplicibus;
flosculis omnibus sessilibus L. *Fl. dan. t.*
283.

In sylvis montosis; fl. Maj. Iun. (Flores disci
vel masculi calyce turbinato semi 5 - fido; vel
foeminei; etiam hermaphroditi.)

120. *ASTRANTIA* (Meisterwurz) *G. pl.* 459.

Involucra partialia lanceolata patentia
aequalia colorata; fructus costis 5, rotun-
datis, transverse rugosis et scabratis.

1. *A. major*, fol. 5 - lobis: lobis 3 - fi-
dis L. Schk. t. 60.

In sylvis montosis (Austr. Carn. Bavar. Siles.
Hannov. Fuld. Tubing. Bohem. —) Fl. Iun. Iul.

2. *A. minor*, fol. digitatis serratis L.
Scop. Carn. t. 7.

In sylvis montosis (Siles. Carn. Tubing. —)
Fl. Iul. Aug.

121. *BUPLEURUM* (Durchwachs) *G. pl.* 460.

Involucr. parziale 5 - phyllum: foliolis
patentibus ovatis acutis; petala involuta
lutea; fructus ovato-oblongus, striatus
compressus bipartibilis.

* 1. *B. rotundifolium*, involucris universalibus nullis, fol. perfoliatis L. *Schk. t. 60.*

In agris, inter segetes; fl. Iun — Aug. (Involucr. parziale saepius 3 - phyllum, foliolis lateralibus minoribus bitidis; sem. inter nervos transversim striata.

2. *B. longifolium*, involucellis 5 - phyllis ovatis: universali subpentaphylla; fol. amplexicaulibus L.

In montosis (Siles. Saxon. Hassiae, Thuring. Bavar. Bohem. Helmst. Isenac. Ien. Gött. Francof. etc.) Fl. Iun. Iul.

3. *B. semicompositum*, umbellis compositis simplicibusque, caule ramoso leviter flexuoso, fol. simplicibus alternatis lanceolatis; basi setula obductis BAUMG.

In pratis (Lips.) Fl. Iun. Iul.

* 4. *B. falcatum*, involucellis 5 - phyllis acutis: universali subpentaphyllo, fol. lanceolatis, caule flexuoso L. *Jacq. austr. 2. t. 128.*

In sylvaticis montosis (Hass. Palat. Saxon. Austr. Carn. Wittenb. Helmstad. Barbi, Francof. Gött. Hannov. etc.) Fl. Iul.

+ 5. *B. ranunculoides*, involucellis pentaphyllis lanceolatis longioribus: universali 3 - phyllo, fol. caulinis lanceolatis L.

In montosis (prope Tubingam) Fl. Iul.

6. *B. rigidum*, caule dichotomo subnudo, involucris minimis acutis L.

In nemoribus montosis (Austr. Saxon. Thuring. Ger. Francof?) Fl. Iul.

7. *B. tenuissimum*, umbellis simplicibus alternis 5 - phyllis subtrifloris L.

Locis inundatis (Austr. Saxon. Lips. Barbi, — Salzthalen POTT, HEINZE.) Fl. Iul. Aug.

8. *B. junceum*, caule erecto paniculato, fol. linearibus, involucris 3 - phyllis, involucellis 5 . phyllis L.

In montosis (Carinth) ad salinas (Palatinatus?) Fl. Aug. Sept.

122. *TORDYLIUM* (Zirnet) *G. pl.* 463.

Involucr. universale foliolis indivisis longitudine saepius umbellae; parziale umbella fere longius; fructus suborbiculatus compressus, margine crenulato (vel hispidus) bipartibilis.

1. *T. maximum*, umbellis confertis radiatis, foliolis lanceolatis inciso - serratis L. *Jacq. austr.* 2. t. 142.

Ad vias, sepes (Austr. Carn. Barbi, Lips.) Fl. Iun. Iul.

2. *T. Anthriscus*, umbellis confertis, foliolis ovato - lanceolatis pinnatifidis L. *Jacq. austr.* 5. t. 261.

Ad vias, sepes; fl. Iun. Iul. (Semina ovato-oblonga sulcis 5 longitudinalibus exarata, nervis et margine setis rigidis hamatis (ut in Caucas.) hispida; setae in caule deorsum, in radiis umbellae sursum adpressae.)

3. *T. nodosum*, umbellis simplicibus sessilibus; semin. exterioribus hispidis L. *Jacq. austr.* 5. t. 24.

Cum priori (Austr. Carn. Wittenb. —) Fl. Iun. Iul.

123. CAUCALIS (Haftdolde) G. pl. 464.

Involucris universalis foliola simplicia; cor. radiatae, disci masculae; fructus duplicato - spinosus.

* 1. *c. grandiflora*, involucris singulis 5 - phyllis: foliolo unico duplo majore L. Jacq. austr. 1. t. 24. Gaertn. t. 20.

Inter segetes, in agris montosis; fl. Iun — Aug. (Umbella 3 - 5 fida, involucris 3 - 5 phyllis, involucria lateralia, membranacea margine SCHRANK.)

* 2. *c. daucoides*, umbellis 3 - fidis aphyllis, umbellulis 3 - spermis 3 - phyllis L. Jacq. austr. 2. t. 157. Gaertn. t. 20.

Inter segetes, in agris montosis; fl. Iul.

3. *c. latifolia*, umbella universali 3 - fida, partialibus 5 - spermis; fol. pinnatis serratis L. Jacq. austr. 2. t. 128. Gaertn. t. 20.

Inter segetes; fl. Iul.

* 4. *c. leptophylla*, involucro universali subnullo, umbella 2 - fida, involucellis 5 - phyllis L. Jacq. hort. 3. t. 16.

Inter segetes; fl. Iun. Iul.

5. *c. helvetica*, involucro universali subnullo, umbella a 3 ad 10 - fida ramis stricte divaricatis L. Jacq. hort. 395. t. 6.

In montosis, inter segetes (Norimb. PANZER.) Fl. Iul. Aug. (*C. arvensis*, HUDS. A. Tord. Anthriscus differt: canle procumbente, piloso, sem. in minori planta duplo majoribus; nec non diversa satis a *C. leptophylla*.)

124. DAUCUS (Möhre) *G. pl.* 466.

Involucr. universale pinnatifidum; umbella fructifera concavo - connivens; fructus setis rigidis longitudinalibus hispidi.

1. *D. Carota*, seminibus hispidis, petiolis subtus nervosis *L. Fl. dan. t.* 725.

In pratis, pascuis, dumetis; fl. Iun. Iul. (Flosculus centralis in sylvestri saepius observandus; atro - purpureus, reliquis major, pedicello insidens simplici rarius ramoso, bracteis 2 - 4 cincto. Var. sativa: fructuum setis apice hamatis *SCHK. t.* 61; var. sylvestris fructuum setis simplicibus *Gaertn. t.* 20. f. 4.)

†2. *D. mauritanicus*, semin. hispidis, flosculo centrali sterili carnosio, receptaculo communi hemisphaerico *L.*

In pascuis, pratis (Siles. Saxon. Berol. Lips -) Fl. Iun. Iul. (Hirsute differre debet a priori cui valde affinis.)

125. BUNIUM (Erdnuss) *G. pl.* 468.

Involucr. universale et parziale polyphyllum; germen incrassatum; fructus ovatus.

B. Bulbocastanum, *L. Fl. lond.*

In agris, arvis, inter segetes (Palat. Saxon. Nassov. Helmstad -) Fl. Iul. (Invol. plerumque 8 - phyllum; cor. petalum exterius paulo majus.)

126. CONIUM (Schierling) *G. pl.* 469.

Involucell. parziale 3 - phyllum, unilaterale; fructus ovatus gibbus, costis compressis ante maturitatem undulatis.

* *c. maculatum*, seminibus striatis L.
Jacq. austr. 3. t. 156. Fl. lond.
 In ruderatis, ad vias; fl. Iul. Aug.

127. *SELINUM* (Silge) *G. pl. 470.*

Involucr. parziale polyphyllum; fructus compresso planus, ovali-oblongus in medio striatus, lateribus membranaceis.

1. *s. sylvestre*, radice fusiformi multiplici; stylis erectis; corollis explicatis L.
Schk. t. 63.

In umbrosis humidis; fl. Iul. Aug.

* 2. *s. pulustre*, sublactescens, radice unica L.

In paludosis; fl. Iun. Iul.

* 3. *s. Carvifolium*, caule sulcato acutangulo involucri universali evanido; stylis reflexis petalis conniventibus *Schk. t. 79.*

In pratis, paludosis; fl. Iul. Aug.

4. *s. Chabraei*, vaginis foliorum caulinarum planis flaccidis pendulis L. *Hoppe, ect. 519.*

In sylvaticis montosis (Austr. Ratisb. *HOPPE.*) Fl. Aug.

128. *ATHAMANTA* (Hirschwarz) *G. pl. 471.*

Involucr. parziale umbellulis aequale; fructus ovato-oblongus striatus.

* 1. *A. Libanotis*, fol. bipinnatis planis, umbella hemisphaerica; sem. hirsutis L.
Jacq. austr. 4. t. 392. Gaertn. t. 21. f. 1.

In

In montosis siccis (Siles. Bav. Austr. Carn. Nassov. Saxon. Gött. Danisc. Ratisb. —) Fl. Iul. Aug. (Fructus oblongus villosus, deterso villo striatus.)

* 2. *A. Cervaria*, fol. pinnatis decussatis inciso-angulatis; sem. nudis L. *Jacq. austr.* 1. t. 69.

In montosis sylvaticis (Siles. Bavar. Austr. Carn. Saxon. Palat. etc.) Fl. Iul. Aug. (Fructus compressus obsoletissime striatus subpubescens non marginatus G a e r t n. t. 21. fig. 10.)

* 3. *A. Oreoselinum*, foliolis divaricatis L. *Jacq. austr.* 1. t. 68.

In pratis, collibus apricis; fl. Iul. Aug. (Fructus striatus margine alatus.

4. *A. cretensis*, foliolis linearibus planis hirsutis; petal. bipartitis, semin. oblongis hirsutis L. *Jacq. austr.* 1. t. 62.

In montosis, subalpinis (Siles. Austr. Carn. Bavar. —) Fl. Iul. Aug.

† 5. *A. annua*, fol. multipartitis: laciniis linearibus teretiusculis acuminatis L.

In agris (Austr. Holsat —) Fl. aestate.

129. (PEUCEDANUM (Haarstrang) G.
pl. 472.

Umbella universalis longissima; involu-
cra brevissima; petala lutea; fructus ellip-
ticus, compressus striatus, margine mem-
brana lata cinctus.

* 1. *P. officinale*, fol. quinquies 3 - par-
titis filiformibus linearibus L. *Schk.* t. 63.

In pratis, nemorosis; fl. Iun.

* 2. *P.*

* 2. *P. Silaus*, foliolis pinnatifidis: laciniis oppositis involucro universalis diphylo L. *Jacq. austr.* 1. t. 15.

In pratis siccis (Siles. Bavar. Austr. Nassov. Saxon. Palat. Hannov. Wittenb. Helmst. Lips. etc.) Fl. Iun — Sept.

3. *P. alsaticum*, fol. pinnatifidis: laciniis 3-fidis obtusiusculis L. *Jacq. austr.* 1. t. 70.

In dumetis, pratis rudis montosis (Siles. Austr. Bavar. Palat —) Fl. Iul.

130. *LASERPITIUM* (Laserkraut) *G. pl.* 476.

Fructus oblongus, undique alatus.

* 1. *L. latifolium*, foliolis cordatis incisoserratis L. *Schk. t.* 67.

In nemorosis montosis (Siles. Austr. Carn. Bavar. Boruss. Hass. Palat. Saxon. Hercyn. Hannov. etc.) Fl. Iul. Aug.

2. *L. prutenicum*, foliolis lanceolatis integerrimis: extimis coalitis L. *Jacq. austr.* 2. t. 153.

In nemorosis, montosis (Siles. Boruss. Austr. Carn. Bav. Hass. Saxon. Wittenb. Lips. Berol. Erford. etc.) Fl. Iun. Iul.

3. *L. Siler*, foliolis ovali-lanceolatis integerrimis petiolatis L. *Jacq. austr.* 2. t. 145.

In montosis (Austr. Carn. — Helmstad. CAP. PBL) Fl. Iul.

131. *HERACLEUM* (Bärenklau) *G. pl.* 477.

Involucr. caducum; flosculi inflexo-uncinati; fructus membranaceo-compressus, striatus marginatus.

* 1. *H. Sphondylium*, fol. pinnatifidis laevibus: floribus uniformibus L. *Schk. t. 67.*

In pratis, nemorosis; fl. Iul. Aug. (Flosculi radii inaequales majores, subaequales in disco, saepe abortientes; folia hirsuta plus minusve divisa, palmato - 5 - loba.)

2. *H. angustifolium*, fol. cruciato - pinnatis: foliolis linearibus; corollis flosculosis L.

In pratis, locis subalpinis (Siles. Saxon. Hass —) Fl. Iul. Aug. (Foliorum laciniae acutae angustiores cruciatim pinnatae; cor. ex flavo - virides uniformes patentissimae. An hujus varietas *H. elegans*, Jacq. austr. 2. t. 175? KROCK. 1. 437?).

3. *H. longifolium*, foliorum pinnis longissimis L. *Jacq. austr. 2. t. 174.*

Cum priori promiscue; flor. Iul. Aug. (Lacinis pedalis semipedalibus lanceolatis acutis, floribus albis inflexis irregularibus a priori differt KROCK.)

4. *H. Panaces*, fol. pinnatis: foliolis quinque: intermediis sessilibus; flor. radiatis L.

In pratis, locis declivibus (Siles. Austr?) Fl. Iul. Aug. (Amplissima generis: 6 - pedalis.)

5. *H. austriacum*, fol. pinnatis utrinque rugosis scabris; flor. subradiatis L. *Jacq. austr. t. 61.*

Cum priori in umbrosis, elatis, subalpinis (Siles. Carn. Austr.) Fl. Iul. Aug.

6. *H. alpinum*, fol. simplicibus; flor. radiatis L.

In alpinis; etiam pratis (Siles. — Lips. JAHN.)
Fl. Iul. Aug. (Caulis 1 - 2 cubitalis; cor. mino-
res quam in reliquis KROCK.)

132. *LIGUSTICUM* (Liebstöckel) G. pl. 478.

Fructus oblongus 5 - sulcatus utrinque;
cor. aequales, petalis involutis integris.

† 1. L. *Levisticum*, fol. multiplicibus: fo-
liolis superne incisis L. Schk. t. 68.

In hortis gramineis (Siles.) sponte; fl. Iul. Aug.

2. L. *peloponense*, fol. multiplicato - pin-
natis: foliol. pinnatim incisis L. Jacq.
austr. 5. t. 13.

In alpinis, etiam depressis (Siles. Austr. Carn.
Bavar. Tubing. —) Fl. aestate.

133. *ANGELICA* (Angelike) G. pl. 479.

Fructus subrotundus, alis marginalibus
duris, dorso tribus lineis exaratus; cor.
aequales, petalis incurvis lanceolatis.

* 1. A. *Archangelica*, foliorum impari lo-
bato L. Fl. dan. t. 206.

In pratis, ad ripas fluviorum, in montosis
(Siles. Austr. Bohem. Carinth. Holsat. Megap.
Nassov. Pomer. Oldenb. etc.) Fl. Iul. Aug.
(Haec species non cum *Archangelica* veterum
confundenda, cujus absolutam sub nomine La-
serpit. *Archangel.* dedit historiam rev. a
WULFEN, Jacq. collect. 1. 214.)

* 2. A. *sylvestris*, foliolis aequalibus ova-
to - lanceolatis serratis L. Schk. t. 68.

In sylvaticis humidis; fl. Iul. Aug.

3. *A. verticillaris*, fol. divaricatissimis: foliolis ovatis serratis, caule pedunculis verticillato L. *Jacq. hort. t. 130.*

Cum priori ad littora fluviorum (Siles. K r o c k.)
Fl. Iul.

134. *sium* (Merk) *G. pl. 480.*

Involucrum polyphyllum; flores aequales; fructus subovatus striatus transverse crassior.

1. *s. latifolium*, fol. pinnatis, umbella terminali L. *Fl. dan. t. 246.*

Locis inundatis, rivulosis; fl. Iul. Aug. (Fructus globosus, lateribus compressiusculis, costato-sulcatus. ROTH.)

2. *s. angustifolium*, fol. pinnatis, umbellis axillaribus pedunculatis, involucrio universali pinnatifido L.

In aquosis - fossis; fl. Iul. Aug. (Umbellae pedunculatae oppositifoliae; involucr. universale et parziale pinnatifidum longitudine umbellae.)

3. *s. nodiflorum*, fol. pinnatis, umbellis axillaribus sessilibus L.

In rivulis, fossis, ad ripas; fl. Iul. Aug.

*4. *s. Falcaria*, foliolis linearibus decurrentibus connatis L. *Jacq. austr. 3. t. 257.*

In pratis et agris; fl. Iun. Iul.

135. *sison* (Sison) *G. pl. 481.*

Umbella inaequalis; involucr. sub-4-phylla; fructus ovatus substriatus.

1. s.

1. s. *Amomum*, fol. pinnatis, umbellis erectis L. Schk. t. 69.

Locis humidis, rivulosis, montosis (Austr. Carn. Gies. —) Fl. Iun. Iul.

2. s. *inundatum*, repens, umbellis 2-fidis L. Fl. dan. t. 89.

Locis inundatis, ad margines lacuum (Hol. sat. Bavar. Oldenb. Brem. Hannov. Francof. —) Fl. Iul. Aug.

+ 3. s. *verticillatum*, foliolis verticillatis capillaribus L.

In pratis, sylvaticis (Gies. Erford. —) Fl. Iul.

136. OENANTHE (Rebendolde) G. pl. 484.

Umbella partialis globosa; involucr. parziale polyphyllum; flosculi difformes in disco sessiles; fructus suberoso-corticatus, calyc. et stylis persist. coronatus.

* 1. o. *fistulosa*, stolonifera, fol. caulinis pinnatis filiformibus fistulosis L. Schk. t. 70.

In fossis, locis inundatis; fl. Iun. Iul.

2. o. *Pimpinelloides*, foliol. radicalibus cuneatis fissis; caulinis integris linearibus longissimis simplicibus L. Jacq. austr. 4. t. 395.

In pratis paludosis, submarinis (Palat. Austr. Carn. Megap. Oldenb. —) Fl. Iul.

3. o. *Peucedanifolia*, fol. omnibus linearibus: radicalibus bipinnatis, caulinis pinnatis: involucrio universali nullo; radicum napulis ovatis sessilibus Poll. 1. t. 3.

In pratis humidis (Palat. Oldenb. —) Fl. Iun.

137. PHELLANDRIUM (Peersaat) *G. pl.* 425.

Involucr. parziale 7 - phyllum, longitudine umbellulae; flosculi disci minores; fructus ovatus levissime striatus, coronatus perianthio et pistillo.

* *P. aquaticum*, foliorum ramificationibus divaricatis L. *Schk. t.* 71.

In fossis et paludosis; fl. Iul — Aug. (Calyculacinae 2, reliquis majores.)

138. CICUTA (Wüterich) *G. pl.* 486.

Umbella univers. et part. subrotunda; Involucr. parziale polyphyllum setosum; Flores aequales; fructus subovatus, sulcatus.

* *C. virosa*, umbellis oppositifoliis, petiolis marginatis obtusis L. *Fl. dan. t.* 208. *Schk. t.* 71.

In fossis, aquis stagnantibus; fl. Iul.

139. AETHUSA (Gleisse) *G. pl.* 487.

Involucella dimidiata 3 . 5 - phylla, pendula; fructus striatus.

* 1. *A. Cynapium*, fol. conformibus L. *Schk. t.* 72. *Fl. lond.*

Locis cultis et incultis frequens; fl. Iul. Aug. (Fructus glaber subglobosus, sulcato - costatus.)

* 2. *A. Meum*, fol. omnibus multipartito-setaceis L. *Iacq. austr. 4. t.* 303.

In montosis, subalpinis (Siles. Austr. Carn. Hercyn. —) Fl. Iun. (Fructus ellipticus sulcis acutangulis *G a e r t n. t.* 23. fig. 6.)

140. CORIANDRUM (Coriander) *G. pl.* 488.

Involucella 3 - 5 - phylla; cor. radiata; fructus sphaericus glaber.

1. *c. sativum*, fructibus globosis L. *Schk. t.* 72.

In cultis, ad margines arborum (Siles. Saxon. Austr. Nassov. Tubing. Berol. Erford. Ien. Lips. —) Fl. Iul.

† 2. *c. testiculatum*, fructibus didymis L.

In arvis (Siles. KROCK.) Fl. Iun. Iul.

141. SCANDIX (Körbel) *G. pl.* 489.

Fructus subulatus.

1. *s. odorata*, seminibus sulcatis angulatis. L. *Jacq. austr.* 5. *t.* 37.

In sylvaticis, montosis (Siles. Austr. Carn. Bavar. Holsat. Hass. Lips. —) Fl. Iun. Iul.

* 2. *s. Pecten*, semin. rostro longissimo L. *Fl. lond.*

Inter segetes; fl. Maj. Iun. (Involucelli foliola apice 2 - fida, petala lanceolata incurva.)

3. *s. Cerefolium*, semin. nitidis ovato-subulatis, umbellis sessilibus lateralibus L. *Jacq. austr.* 4. *t.* 390.

Inter segetes, locis umbrosis, graminosis; fl. Apr. Maj.

* 4. *s. Anthriscus*, semin. ovatis hispidis; cor. uniformibus, caule brevi L. *Fl. dan. t.* 863.

Ad sepes; fl. Maj. Iun.

142. CHAEROPHYLLUM (Kälberkropf)

G. pl. 490.

Involucrum reflexum concavum; fructus oblongus vel subrostratus.

* 1. *c. sylvestre*, caule sublaevi striato, geniculis tumidiusculis L. Schk. t. 73. Fl. lond.

In pomariis, ad sepes frequens; fl. Maj – Iul. (Petala plana obcordata emarginata, neque inflexa.)

* 2. *c. bulbosum*, caule laevi geniculis tumido, basi hirto L. Jacq. austr. 1. t. 63.

In sepibus, dumetis sylvosis; fl. Iun. Iul.

* 3. *c. temulum*, caule scabro, geniculis tumidis L. Fl. lond.

Ad vias, sepes, in ruderatis; fl. Iun. Iul.

* 4. *c. hirsutum*, caule aequali, foliolis incisis, fructibus biaristatis L. Jacq. austr. 2. t. 148.

In nemorosis, montosis, etiam pratis; fl. Iul. Aug.

5. *c. aureum*, caule aequali, foliolis incisis; semin. coloratis sulcatis muticis L. Jacq. austr. 1. t. 64.

In alpinis, etiam in aggeribus, ad sepes (Siles. Austr. Hass. Saxon. Lips. Gött. Ien. Ger. Erford. –) Fl. Iul. Aug.

6. *c. aromaticum*, caule aequali, foliol. serratis integris; fructibus biaristatis L. Jacq. austr. 2. t. 150.

Locis graminosis, umbrosis (Siles. Austr. Carn. – Dresd. Schk.) Fl. Iun – Aug.

143. IMPERATORIA (Meisterwurz) G.

pl. 491.

Involutum universale subnullum; parziale foliolis paucis; semen compressum, margine lato membranaceo et tribus costis dorsalibus apterygiis.

1. *Ostruthium*, L. Schk. t. 74.

In nemorosis, montosis (Siles. Austr. Carn. Bavar. Saxon. —) Fl. Iun. Iul.

144. SESELI (Roskümme) G. pl. 492.

Involutum universale 0; parziale foliolo uno alterove; fructus ovatus striatus.

1. s. *glaucum*, petiol. ramiferis membranaceis oblongis integris, foliol. singularibus binatisque canaliculatis laevibus petiolo longioribus L. Jacq. austr. 2. t. 144.

Locis siccis, elatis, graminosis (Siles. Austr. Carn. —) Fl. Iul. Aug.

2. s. *annuum*, petiol. rameis membranaceis ventricosis emarginatis L. Vaill. t. 9. fig. 4.

In montosis, sylvis, dumetis, pratis (Siles. Austr. Carn. Bav. Saxon. Barbi, Wittenb. Helmstadt. —) Fl. Iul. Aug.

3. s. *tortuosum*, caule alto rigido, foliol. linearibus fasciculatis L.

In sylvaticis, pratis, montosis (Siles. Carinth. Palat. Saxon. Berol. —) Fl. Aug. Sept.

4. s. *Hippomarathrum*, involucellis conato-monophyllis L. Jacq. austr. 2. t. 143.

In montosis (Siles. Austr. Carn. Saxon. Helmstad. Ien. —) Fl. Iul. Aug.

† 5. *s. saxifragum*, caule filiformi divaricato, fol. duplicato - ternatis linearibus, umbellis sub 5 - fidis L.

In montanis, sylvaticis (Siles. Lips. Erford. Ien. Barbi, —) Fl. Iul. Aug.

6. *s. elatum*, caule elongato, geniculis callosis, fol. bipinnatis: pinnis linearibus distantibus L.

In montosis, sylvaticis (Siles. Austr? —) Fl. Aug.

7. *s. coloratum*, Ehrh. herb. 113.

In montosis. —

145. PASTINACA (Pastinak) G. pl. 494.

Petala involuta lutea; fructus ellipticus compresso - planus.

* *p. sativa*, fol. simpliciter pinnatis L. Schk. t. 76.

In ruderatis, pratis, ad ripas fossarum; fl. Iul. Aug.

146. ANETHUM (Dill) G. pl. 496.

Petala involuta lutea; fructus ovato - striatus.

1. *A. graveolens*, fructibus compressis L. Schk. t. 77.

In cultis, ruderatis: fl. Iun. Iul.

2. *A. foeniculum*, fructibus ovatis L.

Ad vias, in hortis, agris oleraceis (Siles. Saxon. Nassov. Tubing. Berol. Ien. etc.) Fl. Iun. Iul.

147. CARUM (Kümmel) G. pl. 497.

Involucr. o, saepe 1 - phyllum; petala alba carinata; fructus ovato - oblongus gibbus, tereti - striatus.

* *C. carvi*, L. Schk. t. 77.

In pratis; fl. Iun. Iul.

148. PIMPINELLA (Bibernell) G. pl. 498.

Umbellae juniores nutantes; stigmata subglobosa; fructus ovato-oblongus superne angustior, striatus.

* 1. *P. Saxifraga*, fol. pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis, summis linearibus L. Schk. t. 78.

In pomariis, collibus apricis; fl. Iul — Sept. (Var. fol. radicalibus ovatis vel subrotundis.)

2. *P. nigra*, caule striato piloso, fol. villosis pinnatis: radicalibus foliol. obcordatis incisiss obtuse dentatis: caulinis bipinnatis: foliol. cuneiformibus dentatis WILD. Fl. dan. t. 669.

In pascuis, siccis, fl. cum priori.

* 3. *P. magna*, fol. uniformibus pinnatis: impari 3 - lobo L. Jacq. austr. 4. t. 396.

In pratis, nemorosis; fl. Iun. Iul.

4. *P. media*, fol. omnibus pinnatis, fol. radical. subcordatis subtrilobis serratis: caulinis inciso - angulatis RETZ.

Locis siccioribus, arenosis; fl. Iun. Iul.

5. *P. dissecta*, fol. omnibus pinnatis: pinnis multipartitis, segmentis subfoliatis acutis RETZ obs. 3, t. 2.

In

In sylvis, montosis (Bavar. Megap. Hannov. etc.) Fl. Iun.

6. *P. hircina*, fol. bipinnatis: pinnulis profunde lobatis LEERS.

In pratis et collibus (Hass. Siles. Palat. Nassov. Brem. —) Fl. Iul. Aug.

7. *P. glauca*, fol. supra decompositis, caule angulato ramosissimo L.

In collibus vinearum (Palat. Francon. Carn. Tub. —) Fl. cum prioribus.

8. *P. dioica*, pumila, umbellis numerosissimis compositis simplicibusque L. Jacq. austr. 1. t. 28.

In pratis, montosis (Siles. Austr. —) Fl. Majo.

149. *APIUM* (Eppich) G. pl. 499.

Involucr. 0, vel 1 - phyllum partiale; fructus parvus gibbus costatus.

* *A. graveolens*, fol. caulinis cuneiformibus L. Schk. t. 78.

In pratis humidis, maritimis; fl. Iul.

150. *AECOPODIUM* (Giersch) G. pl. 500.

Umbella convexa, part. plana, involucr. 0; fructus ovato - oblongus gibbus striatus.

A. Podagraria, fol. caulinis summis ternatis L. Schk. t. 79.

Ad sepes, in pomariis; fl. Maj. Iun.

TRIGYNIA.

151. *VIBURNUM* (Schwelke) G. pl. 503.

Cal. 5 - partitus superus; cor. 5 - fida; bacca 1 - sperma.

* 1. v. *Lantana*, fol. cordatis serratis venosis, subtus tomentosis L. *Jacq. austr.* 4. t. 341.

In sepibus (Siles. Austr. Carn. Bav. Hass. Palat. Saxon. etc.) Fl. Maj. Iun. (Drupa 1 - locularis MED; ossiculum basi emarginatum, apice acutiusculum.)

* 2. v. *Opulus*, fol. lobatis, petiolis glandulosis L. *Schk.* t. 81.

In sepibus, nemorosis; fl. Iun. (Fructus Antrum pomum MED. Var. flor. omnibus sterilibus.)

152. *SAMBUCUS* (Hollunder) G. pl. 505.

Cal. 5 - partitus; cor. 5 - fida; drupa 3 - sperma.

* 1. s. *Ebulus*, cymis 3 - partitis, stipulis foliaceis, caule herbaceo L. *Fl. lond.*

In sepibus, ad vias sylvas; fl. Iul. Aug. (Cor. laciniae concavae ovato-acutae, apicibus incurvis; antherae oblongae.)

* 2. s. *nigra*, cymis 5 - partitis, fol. pinnatis: foliol. subovatis serratis, caule arboreo L. *Fl. dan.* t. 545.

Ad sepes, dumeta; fl. Maj. Iun.

* 3. s. *racemosa*, racemis compositis ovatis, caule arboreo L. *Jacq. icon. rar.*

In nemorosis montosis; fl. Iun. Iul. (Cor. minima virescens; fructu rubro.)

153. *STAPHYLEA* (Pimpernus) G. pl. 507.

Cal. 5 - partitus; cor. 5 - petala; styli 2 - 3; caps. 2 - 3, connatae inflatae; sem. nucamentacea, basi truncata.

* *s. pinnata*, fol. pinnatis L. Schk. t. 84.

In sylvaticis, montosis (Siles. Bavar. Austr. Carn. Bohem. Nassov. Saxon. Hannov. etc.) Fl. Maj. Iun.

154. TAMARIX (Tamarisken) G. pl. 510.

Cal. 5 - partitus; petala 5; caps. 1 - locularis annulo superius coarctata; recept. parietalia; semina crinica.

t. germanica, flor. decandris L. Schk. t. 85.

Ad littora lacuum, fluviorum (Austr. Carn. Bavar. Tirol. —) Fl. Iun. Iul.

155. CORRIGIOLA (Knotenkraut) G. pl. 516.

Cal. 5 - phyllus margine membranaceo albo; cor. 5 - petala; nux parva rotundato-trigona.

c. littoralis, L. Schk. t. 85.

In pascuis humidis, ad littora fluviorum (Siles. Hannov. Holsat. Hass. Wittenb. Oldenb. Brem. Barbi, Helmst. Berol. etc.) Fl. Iun. Aug.

156. ALSINE (Miere) G. pl. 518.

Cal. 5 - phyllus; pet. 5; caps. 1 - locularis, calyce tecta.

* 1. *A. media*, petalis 2 - partitis, fol. ovato - cordatis L. Fl. lond.

Ad sepes, in cultis vulgaris; fl. Mart. — Dec. (Caps. dehiscens 3 - seminibus excussis 6 - valvis; sem. receptaculo columnari filis affixa.)

2. *A. segetalis*, petal. integris, fol. subulatis L. Vaill. t. 3. fig. 3.

Inter segetes (Siles. Hannov. —) Fl. Iul. — Aug.

TETRA-

TETRAGYNIA.

157. PARNASSIA (Pinblatt) *G. pl.* 523.

Cal. 5 - partitus; cor. 5 - petala; nectaria 5, ciliata: radiis capitellatis; caps. 1 - locularis; recept. parietalia; sem. membranacea marginata.

* *P. palustris*, L. *Schk. t.* 86.

In pratis humidis, uliginosis, turfosis; fl. Jul. Aug.

PENTAGYNIA.

158. STATICE (Grasnelke) *G. pl.* 527.

Cal. 1 - phyllus scariosus; cor. 5 - petala; caps. 1 - locularis evalvis; sem. erectum e longo funiculo pendens.

* 1. s. *Armeria*, scapo simplici capitato, fol. linearibus L. *Schk. t.* 87.

In campis, collibus; fl. Jul. Aug.

2. s. *Limonium*, scapo paniculato tereti, fol. laevibus enerviis subtus mucronatis L. *Fl. dan. t.* 315.

In maritimis (Carn. Siles. Oldenb. —) Fl. Jul.

159. LINUM (Lein) *G. pl.* 528.

Cal. 5 - phyllus; petala 5; caps. 5 - valvis, 10 - locularis; sem. solitaria.

Fol. alternis.

1. *L. usitatissimum*, calyc. capsulisque mucronatis, petalis crenatis; fol. lanceolatis alternis, caule solitario L. *Fl. lond.*

In

In arvis, inter segetes (Austr. Siles. Carn. Bavar. Hass. Nassov. etc.) Fl. Iun. Iul. (Var. humilis, capsulis majoribus.)

2. *L. perenne*, calyc. capsulisque obtusis, fol. alternis lanceolatis integerrimis L.

In pratis siccis (Ratisb. HOPPE.) Fl. Mart — Aug.

3. *L. viscosum*, fol. lanceolatis pilosis 5-nerviis L.

In montosis, sylvaticis (Carn. Bavar. Carinth. —) Fl. Iun — Aug.

4. *L. hirsutum*, calyc. hirsutis acuminatis sessilibus alternis, fol. alternis: rameis oppositis L. *Jacq. austr. t. 31.*

In montosis (Carn. Austr. —) Fl. aestate. (Priori affinem putant, flore caeruleo aliisque notis diversam.)

† 5. *L. narbonense*, calyc. acuminatis; fol. lanceolatis sparsis strictis scabris acuminatis, caule tereti basi ramoso L.

In arenosis (Palat. DILL.) Fl. aestate.

6. *L. tenuifolium*, calyc. acuminatis; fol. sparsis lineari-setaceis retrorsum scabris L. *Jacq. austr. 3. t. 215.*

In montosis, agris, ad vias (Siles. Carn. Austr. Palat. Hass. Ratisb. Tubing. Francof. etc.) Fl. Iul — Sept.

7. *L. austriacum*, calyc. rotundatis obtusis; fol. linearibus acutis retiusculis L. *Jacq. austr. 5. t. 418.*

In arvis, montosis, sylvaticis (Siles. Austr. Carn. Bavar. Palat. etc.) Fl. Aug. Sept.

Fol.

Fol. oppositis.

* 8. *L. catharticum*, fol. oppositis ovato-lanceolatis, caule dichotomo; coroll. acutis L. *Schk. t. 47.*

In pascuis humidiusculis; fl. Iun. Iul. (Filamenta ut in aliis speciebus basi coalita germen cingunt, interjectis alternis denticulis.)

* 9. *L. Radiola*, fol. oppositis, caule dichotomo, florib. tetrandis tetragynis L. *Fl. dan. t. 178. Vaill. t. 4. fig. 6.*

Locis arenosis, inundatis; fl. Iun - Sept. (Caps. 4 - valvis, 8 - locularis.)

POLYGYNIA.

160. *DROSERA* (Sonnenhau) *G. pl. 531.*

Cal. 5 - fidus; petala 5; caps. 1 - locularis, 3 - 5 - valvis.

* 1. *D. rotundifolia*, scap. radicata, fol. orbiculatis L. *Bull. herb. t. 181. a.*

In paludosis, turfosis; fl. Maj. Iun. (Germen ovatum, styli 6 - 8; caps. 3 - 4 - valvis; semina membrana involuta SCHK.)

2. *D. longifolia*, scap. radicata, fol. ovali - oblongis L. *Bull. herb. t. 181. h.*

In paludosis, turfosis, cum priori. (Germen subangulatum, styli 6 - 8, stigmata denticulata SCHK.)

161. *MYOSURUS* (Mäuseschwanz) *G. pl. 588.*

Cal. 5 - phyllus deciduus; pet. 5, unguiculata oblique aperta; recept. subulatum

tum capsulis imbricatim tectum; caps 2 - valvis.

* *M. minimus*, Schk. t. 88. *Fl. lond.*

In agris arenosis, inter segetes; fl. April - Jun. (Stam. 5 - 12.)

Classis VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

162. CALANTHUS (Schneetropfen) G.
pl. 547.

Petala 3 exteriora concava, interiora nectarifera 3 breviora emargiuata; stylus subulatus.

C. nivalis, L. Schk. t. 89. *Batsch, anal. 2.*

In pratis, sylvaticis (Siles. Austr. Carn. Bav. Nassov. Hass. Hannov. Wittenb. Lips. etc.)
Fl. Ian - Apr.

163. LEUCOIUM (Knotenblume) G. pl. 548.

Cor. campaniformis 6 - partita, apicibus incrassata; stylus clavatus, vel filiformis.

* 1. *L. vernum*, spatha uniflora; stylo clavato L. Schk. t. 89.

In pomariis, pratis humidis; fl. Febr - Mart. (Sem. ut in priori membrana cucullata vestita SCHK.)

2. *L. aestivum*, spatha multiflora, stylo clavato L. *Fl. lond.*

In pratis, montosis (Siles. Austr. Carn. -)
Fl. Maj. Jun.

164. NARCISSUS (Narzisse) *G. pl.* 550.

Pet. 6. exteriora aequalia; pet. interius infundibuliforme, 1 - phyllum; stam. recondens.

1. *N. poëticus*, spatha uniflora; nectario (petaliformi) rotato brevissimo scarioso crenulato *L. Schk. t.* 90.

In pratis, pomariis (Carn. Nass. —) Fl. Majo.

2. *N. Pseudo - Narcissus*, spatha uniflora; nectario (petaliformi) campanulato erecto crispo aequante petala ovata *L. Bull. herb. t.* 389.

In pomariis, pratis (Siles. Carn. Nass. Brem. Hannov. Isenac. Gies. —) Fl. Mart. Apr.

165. ALLIUM (Lauch) *G. pl.* 557.

Spatha multiflora arida; cor. 6 - petala; caps. supera 3 - locularis.

Folia caulina plana, umbella capsulifera.

1. *A. Ampeloprasum*, caule planifolio umbellifero, umbella globosa; stam. tricuspidatis, petalis carina scabris *L.*

In agris montosis, pratis. (Siles. Austr. —) sponte; fl. aestate.

2. *A. rotundum*, caule planifolio umbellifero; stam. tricuspidatis, umbella subglobosa; flor. lateralibus nutantibus *L.*

In pratis, dumetis (Siles. Palat. Tub. Ien. —) Fl. Iul.

† 3. *A. roseum*, caule planifolio umbellifero, umbella fastigiata; petal. emarginatis;

stam. brevissimis simplicibus L. Krock.

t. 43.

In montosis (Siles. —) Fl. Iul. Aug.

Fol. caul. plana, umbella bulbifera.

4. A. *Scorodoprasum*, caule planifolio bulbifero, fol. crenulatis, vaginis ancipitibus; stam. tricuspidatis L. *Rup. jen. t. 2.*

In pratis sylvaticis (Siles. Carn. Austr. Palat. Saxon. Megap. Wittenb. Barbi, Lips. etc.) Fl. Iun.

5. A. *arenarium*, caule planifolio bulbifero, vaginis teretibus, spatha mutica; stam. tricuspidatis L. *Fl. dan. t. 290.*

In arenosis, dumetosis (Siles. Bavar. Holsat. Pomer. Thuring. Wittenb. Gött. Ien. Gryph. —) Fl. Iun.

6. A. *carinatum*, caule planifolio bulbifero; stam. subulatis L. *Hall. all. t. 2. f. 2.*

In sylvaticis, montosis; fl. Iul. Aug.

Fol. caul. teretia, umbella capsulifera bulbifera.

7. A. *sphaeroccephalon*, caule teretifolio umbellifero, fol. semiteretibus; stam. tricuspidatis corolla longioribus L. *Hall. all. t. 2. fig. 1.*

Locis graminosis, siccis montosis (Siles. Palat. Erford. Francof. —) Fl. Iul. Aug.

8. A. *paniculatum*, caule subterifolio umbellifero, pedunculis capillaribus effusis: stam. subulatis; spatha longissima L. *Hall. all. t. 1. fig. 1.*

In pratis (Siles. Carn. —) Fl. Iul. Aug.

9. A.

9. *A. vineale*, caule teretifolio bulbifero; stam. tricuspidatis L. *Krock. 1. t. 44.*

In pratis, agris, nemorosis; fl. Iun. Iul.

* 10. *A. oleraceum*, caule teretifolio, bulbifero, fol. scabris semiteretibus subtus sulcatis; stam. simplicibus L. *Hall. all. t. 1. fig. 2.*

In pomariis, pratis, nemorosis; fl. Iul.

Fol. radicalia, scapus nudus.

11. *A. senescens*, scapo nudo ancipiti, fol. linearibus subtus convexis laevibus, umbella subrotunda; stam. subulatis L.

In pratis elatioribus, sylvis, dumetis (Siles. Carn. Bavar. Austr. Erford. Wittenb. Franc. etc.)
Fl. Maj — Iul.

12. *A. angulosum*, scapo nudo ancipiti, fol. linearibus canaliculatis subtus subangulatis, umbella fastigiata L. *Iacq. austr. v. 5. t. 423.*

In pratis subhumidis (Siles. Austr. Bav. Palat. Saxon. Barbi, Gött. Wittenb. Erford. Lips. etc.)
Fl. Iun — Sept.

* 13. *A. ursinum*, scapo nudo triquetro, fol. lanceolatis petiolatis, umbella fastigiata L. *Fl. dan. t. 757.*

In nemorosis (Siles. Austr. Carn. Bavar. Nass. Hass. Saxon. Helmst. Lips. Tub. Fuld. etc.) Fl. Maj. Iun.

14. *A. Schoenoprasum*, scapo nudo adaequante, fol. teretia subulato-filiformia L. *SCHK. t. 91.*

In montosis, pratis (Siles. Bavar. Hass. Barbi, Wittenb. Lips. —) Fl. Maj — Sept. (Var. culta.)

166. LILIUM (Lilie) *G. pl.* 558.

Cor. 6 - petala : linea longitudinali nectarifera; caps. valvulis pilo cancellato connexis.

1. *L. bulbiferum*, fol. sparsis; cor. campanulatis erectis, intus scabris *L. Jacq. austr.* 3. t. 226.

In ruderatis, pratis (Austr. Carn. Hercyn. Francof. —) Fl. Iun. Iul.

* 2. *L. Martagon*, fol. verticillatis, floribus reflexis, cor. revolutis *L. Jacq. austr.* 4. t. 351.

In sylvis, nemorosis montosis; fl. Iun. Iul.

167. UVULARIA (Zapfenkraut) *G. pl.* 560.

Cor. 6 - petala erecta: nectarii fovea basios petali; filamenta brevissima.

U. amplexifolia, fol. amplexicaulibus mollibus, caule glabro *L. Schk. t.* 93.

In montosis (Siles. Bavar. Bohem. Austr. —) Fl. Iul. Aug.

168. TULIPA (Tulpe) *G. pl.* 563.

Cor. 6 - petala campanulata; stigma 3-lobum germiini insidens.

* *T. sylvestris*, flore subnutante, fol. lanceolatis *L. Schk. t.* 93.

In pomariis, sylvaticis (Carn. Bav. Hass. Saxon. Nass. etc.) Fl. Maj. Iun.

169. ORNITHOGALUM (Milchstern) *G. pl.* 566.

Cor. 6 - petala erecta supra medium patens; filamenta alterna basi dilatata.

* 1. O,

* 1. *O. luteum*, scapo anguloso, 2 - phyllo, pedunc. umbellatis simplicibus L. *Fl. dan. t. 378.*

In pomariis, sylvis; fl. Apr. Maj.

* 2. *O. minimum*, scapo angulato 2 - phyllo, pedunc. umbellatis ramosis L. *Fl. dan. t. 612.*

In agris, ad sepes; fl. Apr. Maj. (Styl. cum germine leviter hirsutus, in priori glaber.)

3. *O. pyrenaicum*, racemo longissimo; filament. lanceolatis; pedunc. floriferis patentibus aequalibus, fructiferis scapo approximatis L. *Iacq. austr. 2. t. 103.*

In montosis (Siles. Carn. Austr. Nassov. Dant. —) Fl. Iun. Iul.

4. *O. narbonense*, racemo oblongo; filamentis lanceolatis membranaceis; pedunc. floribus patentibus L.

In vineis, agris, sylvis (Siles. Francof. — in pomariis et hortis prope Lipsiam quasi sponte Baumg.) Fl. Iun.

5. *O. umbellatum*, flor. corymbosis, pedunc. scapo altioribus; filamentis basi dilatatis L. *Schk. t. 94.*

In pomariis, agris (Siles. Austr. Carn. Bavar. Bohem. Nassov. Saxon. Hass. Holsat. Barbi, Berol. Hannov. Wittenb. Francof. Helmst. Lips. etc.) Fl. Maj. Iun.

6. *O. nutans*, floribus secundis pendulis, nectario stamineo campaniformi L. *Iacq. austr. 4. t. 301.*

In pratis, pomariis (Siles. Austr. Hass. Holsat. Hannov. Brem. Oldenb. Barbi, Berol. Francof. Ratisb. Wittenb. etc.) Fl. Maj. Iun.

170. *SCILLA* (Meerzwiefel) *G. pl.* 567.

Cor. 6 - petala patens decidua, filamenta subaequalia.

† 1. *s. amoena*, flor. lateralibus alternis subnulantibus, scapo angulato L. *Schk. t.* 94.

In pomariis, ad sepes (Austr. Saxon. Nassov. Francof. Lips? Barbi, Wittenb. —) Fl. Maj.

2. *s. bifolia*, flor. erectiusculis paucioribus L. *Jacq. austr.* 2. *t.* 117.

In pratis, sylvis (Bavar. Carn. Austr. Palat. —) In dumetis (Ratisb. Hoppe) Stuttgart. (Kerner) Fl. Mart. Apr. (Valvulae capsularum duplicatae MED.)

171. *ASPHODELUS* (Asphodil) *G. pl.* 569.

Cor. 6 - partita; filamenta squamis 6 germen cingentibus, arcuatis, inserta.

A. ramosus, caule nudo, fol. ensiformibus carinatis laevibus L. *Murr. t.* 7.

In graminosis (Carn. Bavar. Tubing. —) Fl. Maj — Iul.

172. *ANTHERICUM* (Zaunblume) *G. pl.* 570.

Cor. 6 - petala patens; stigma trigonum; caps. ovata supera, 3 - locularis.

* 1. *A. ramosum*, fol. planis, scapo ramoso; cor. planis, pistillo recto L. *Jacq. austr.* 2. *t.* 161.

In nemorosis, montosis (Carinth. Siles. Austr. Carn. Francon. Bavar. Palat. Saxon. Wittenb. etc.) Fl. Maj — Aug.

* 2. *A.*

* 2. *A. Liliago*, fol. planis, scapo simplicissimo; cor. planis, pistillo declinato L. *Fl. dan. t. 616.*

In nemorosis, montosis, iisdem in locis; fl. Maj. Iun.

3. *A. ossifragum*, fol. ensiformibus; filamentis lanatis L. *Fl. dan. t. 42.*

Locis humidis, turfosis (Siles. Holsat. Luneb. Brem. Oldenb.) Fl. Iun.

4. *A. calyculatum*, fol. ensiformibus; perianthiis 3 - lobis, filament. glabris, flor. trigynis L. *Fl. dan. t. 36.*

In montosis, sylvaticis, turfosis (Siles. Bavar. Carn. Austr. Holsat. Tubing. Ratish. Stuttgart. etc.) Fl. Iun. Aug. (Heriteria, SCHRANK. Scheuchzeria, SCOP. ROTH. Tofieldia, HUDS.) Fl. Iun. Aug.

173. ASPARACUS (Spargel) G. pl. 573.

Cor. 6 - partita: petalis 3 interioribus apice reflexis; bacca globosa 3 - locularis 6 - sperma.

* *A. officinalis*, caule herbaceo tereti erecto, fol. setaceis stipulis paribus L. *Fl. dan. t. 805.*

In pratis et sylvis; fl. Iun. Iul. (Planta saepe dioica.)

174. CONVALLARIA (Zauken) G. pl. 575.

Cor. 6 - fida 1 - petala; bacca immatura maculata.

Cor. campanulatis.

* 1. *c. majalis*, scapo nudo L. *Fl. lond.*

In nemorosis; fl. Maj. Iun.

H 5

Cor.

Cor. infundibuliformibus.

2. *c. verticillata*, fol. verticillatis L. *Fl. dan. t. 86.*

In sylvaticis, montosis (Siles. Bav. Austr. Carn. Hass. Holsat. Palat. etc.) Fl. Maj. Iun.

* 3. *c. Polygonatum*, fol. alternis amplexicaulibus, caule ancipiti; pedunc. axillaribus subunifloris L. *Fl. dan. t. 377.*

In nemorosis, montosis; fl. Maj. Iun.

4. *c. latifolia*, fol. alternis amplexicaulibus acuminatis, caule angulato; pedunc. axillaribus multifloris L. *Iacq. austr. 3. t. 232.*

In montosis, nemorosis (Austr. Bav. Ger. etc.) Fl. Iun. Iul. (Fol. ovata alterna subsessilia, pedunc. racemosi vel solitarii SCHKUHR; magnitudine a sequenti diversa.)

5. *c. multiflora*, fol. alternis amplexicaulibus, caule tereti; pedunc. axillaribus multifloris L. *Fl. dan. t. 192. Schk. t. 97.*

In montosis, nemorosis; fl. Maj. Iun.

Cor. rotatis.

* 6. *c. bifolia*, fol. cordatis; flor. tetrandris L. *Fl. dan. t. 291.*

In nemorosis, pratis, umbrosis; fl. Maj. Iun. (Cor. 4-partita; stam. 4; stigma 2-fidum; bacca rubro punctata, 2-locularis, rarius 3-locularis; sem. 2-3. Majanthemum WIG. ROTH.)

175. HYACINTHUS (Hyacinthe) G. *pl. 577.*

Cor. campanulata: limbo 6-fido reflexo; pori 3 melliferi juxta germen.

1. H.

1. *H. comosus*, cor. angulato - cylindricis: summis sterilibus longius pedicellatis L. *Iacq. austr.* 2. t. 126.

In agris, nemoribus, pratis (Siles. Austr. Carn. Bavar. Palat. Saxon. Ien. Gies. Ratisb. etc.) Fl. Maj. Iun. (Var. flore albo, carneo, pallide caeruleo.)

2. *H. botryoides*, cor. globosis uniformibus, fol. canaliculato - cylindricis, strictis L.

In graminosis, montosis (Carn. Austr. Bav. Saxon. Tubing. —) Fl. Maj. (In hac et prima specie deficiunt pori melliferi SCHKUHR.)

3. *H. racemosus*, cor. ovatis: summis sessilibus; fol. laxis L. *Iacq. austr.* 2. t. 187.

Locis montosis (Siles. Austr.) in agris (Francof. —) Fl. Iun. Iul.

176. *HEMEROCALLIS* (Tagblume) G.
pl. 585.

Cor. campanulata: tubo cylindrico; stam. declinata.

† *H. flava*, fol. lineari-subulatis carinatis, cor. flavis L. *Iacq. hort.* 2. t. 139. *Schk.* t. 98.

In viridariis (Siles. Carn. Bavar. —) Fl. Iun. — Aug. (Cor. plana.)

177. *ACORUS* (Calmus) G. pl. 585.

Spadix conicus ex margine folii, tectus flosculis; cor. 6-petala: antherae adnatae; caps. hexagona, 3-locularis.

* *A. Calamus*, L. *Leers*, t. 13. fig. 12. *Schk.* t. 97.

In fossis, ad ripas; fl. Iun. Iul.

178. IUNCUS (Binsen) G. pl. 590.

Gluma floralis 2 - valvis, cal. corollaeformis, 6 - phyllus; caps. 3 - locularis polysperma, vel 1 - locularis 3 - sperma.

Culmis nudis.

* 1. I. *conglomeratus*, culmo nudo stricto, capitulo laterali L. *Leers*, t. 13. fig. 1.

Locis humidis, paludosis; fl. Iun. Iul. (Stam. 3; caps. trigona: angulis acutis. (Var. capitulo gemino.)

* 2. I. *effusus*, culmo nudo stricto, panicula laterali L. *Leers*, t. 13. fig. 2.

Locis humidis, paludosis; fl. Iun. Iul. (Caps. obovata.)

3. I. *inflexus*, culmo nudo incurvo, panicula laterali L. *Leers*, t. 13. fig. 3.

Locis humidis, paludosis; fl. Iun. Iul. (Caps. inferius gibba. I. *glaucus*, Ehrh. gram. 85.)

* 4. I. *filiformis*, culmo nudo filiformi nutante; panicula laterali (pauciflora) L. *Leers*, t. 13. fig. 4.

Locis montosis, humidis, turfosis (Siles. Bav. Hass. Holsat. Bohem. Tirol. Brem. Oldenb. Barbi, Lips. Wittenb. etc.) Fl. Iun. Iul. (Capsula obovata trigona.)

5. I. *trifidus*, culmo nudo, foliis floribusque tribus terminalibus L. *Krock*. t. 48.

In montosis (Carn. Bav. Siles.) paludosis (Tubing. Gmel.) Fl. Iul. Aug. (Caps. subtriquetra acuminata; var. floribus 1 - 3, LIGHTF.)

* 6. I. *squarrosus*, culmo nudo, fol. setaceis, capitulis glomeratis aphyllis (terminalibus) L. *Ehrh.* gram. 39.

In

In pratis, pascuis, ericetis (Siles. Bavar. Hol-
sat. Palat. Hannov. Megap. Oldenb. Brem. etc.)
Fl. Iun. Iul. (Caps. subtriquetra ovata.)

Culmis foliosis.

* 7. *I. acutiflorus*, fol. nodoso-articulatis
floribus acutis. *Ehrh. gram.* 66.

In paludosis, inundatis, sylvaticis, fl. Iul.
Aug. (Caps. acuminata. Var. vivipara.)

* 8. *I. obtusiflorus*, fol. nodoso-articula-
tis, floribus. *Ehrh. gram.* 76.

In paludosis, inundatis; fl. Iun. Iul. (Var.
vivipara.)

* 9. *I. bulbosus*, fol. linearibus canalicu-
latis; caps. obtusis L. *Leers*, t. 13. fig. 7.

In pratis pascuis, humidis, locis uliginosis;
fl. Iun. Iul. (Caps. obtusissimae) fere subrotun-
dae.)

* 10. *I. bufonius*, culmo dichotomo, fol.
angulatis, floribus solitariis sessilibus L.
Leers, t. 13. fig. 8.

Locis inundatis, arenosis; fl. Iun. Aug. (Caps.
subcylindrica. Var. vivipara et procerior.)

11. *I. Tenageja*, annuus, culmo ramoso
paniculato; flor. solitariis sessilibus, peta-
lis ovato-oblongis, caps. subglobosa *EHRH.*
phyt. 63. *Vaill.* t. 20. fig. 1.

Locis inundatis, sabulosis (Siles? Hannov.
Megap. Brem. Berol. etc.) Fl. aestate.

12. *I. supinus*; culmo dichotomo, fol.
canaliculatis filiformibus, capitulo 3-phyl-
lo *MOENCH*, *Hass.* t. 5.

In campis sterilioribus (Siles. Carinth. Hass. Brem. Francon. etc.) Fl. Iul. Aug. (Hujus locis
1. uliginosus, ROTH. subverticillatus,
WULF. setifolius, EHRH.

13. 1. *capitatus*, fol. setaceis, capitulo terminali alarique subfoliosis, petalis acutis integris pericarpio aequantibus WEIG. Ehrh. gram. 8.

Locis inundatis, uliginosis; fl. Iun. Iul.

14. 1. *vernalis*, fol. planis pilosis; pedunculis simplicibus inferioribus reflexis. Leers, t. 13. fig. 10. Fl. lond.

In montosis, nemorosis; fl. Maj. Iun.

15. 1. *maximus*, fol. planis pilosis, panicula terminali ramosissima; flor. fasciculatis ROTH. Fl. lond. (1. *sylvaticus*.)

In nemorosis, montosis; fl. Iun. Iul. (Var. fol. angustioribus.)

16. 1. *albidus*, fol. pilosis acuminatis planis; corymbis folio brevioribus, peduncul. subtrifloris. Leers, t. 13. fig. 9.

In sylvaticis, montosis; fl. Iun. Iul. (Pro 1. *niveo* Linn. in alpinis Siles. Bohem. Carinth. etc. occurrente, diversam hanc speciem plerique habuere.)

17. 1. *campestris*, fol. planis subpilosis, spicis sessilibus pedunculatisque L. Leers, t. 13. fig. 5.

In pascuis, campis siccis; fl. Maj. Iun. (Plures hunc. species et varietates difficilius absque iconicis delineationibus, quas proxime ab ill. Schrebero expectare debeamus, intelligi ac erui possunt.)

179. BERBERIS (Sauerdorn) *G. pl.* 595.

Cal. 6 - phyllus; petala 6: ad basin glandulis 2; bacca 1 - locularis apice umbilicata.

* *B. vulgaris*, pedunculis racemosis, spinis triplicibus L. *Fl. dan.* 904. *Schk. t.* 99.

In sepibus dumetis; fl. Maj. Iun. (Autrum carnosum 1 - loculare MED.)

180. LORANTHUS (Riemenblume) *G. pl.* 600.

Cor. 6 - fida revoluta, stam. adnata basibus petalorum: germen inter utrumque calycem; bacca oblonga 1 - locularis.

L. europaeus, racemis simplicibus terminalibus, flor. dioicis L. *Iacq. austr. t.* 30.

In sylvaticis Quercubus parasitice Siles. Austr. —) Fl. Apr. Maj.

181. PEPLIS (Peplis) *G. pl.* 605.

Cal. campannatus 12 - dentatus: denticulis intercalaribus minimis; cor. 6 - petala aut 0; caps. supera 2 - locularis.

P. Portula, floribus apetalis L. *Vaill. t.* 15. *fig.* 5. *Schk. t.* 99.

Locis paludosis, inundatis; fl. Iun — Aug.

TRIGYNIA.

182. RUMEX (Ampfer) *G. pl.* 613.

Cal. 3 - phyllus; pet. 3. conniventia persistentia, sem. 1, triquetrum.

Flo.

Flores hermaphroditi: valvulis (s. petalis) granulo notatis.

* R. *Patientia*, flor. hermaphroditis: valvulis integerrimis, unica granifera; fol. ovato-lanceolatis L.

In cultis, pratis (Holsat. Nassov. Hass. — Fl. Iul.

2. R. *sanguineus*, flor. hermaphroditis; valvulis integerrimis, unica granifera; fol. cordato-lanceolatis L.

In cultis oleraceis (Saxon. Siles. Nassov. Berol. Lips. —) Fl. Iul. Aug. (Valv. granulo magno globoso rubro notata.)

† 3. R. *Britannica*, flor. hermaphroditis; valvulis integerrimis omnibus graniferis; fol. lanceolatis: vaginis obsoletis L.

In fossis (prope Spandau WILD. Wittenb. SCHK.) Fl. Iun. Iul.

* 4. R. *crispus*, flor. hermaphroditis: valvulis integris graniferis; fol. lanceolatis, undulatis acutis L. *Fl. lond.*

In pratis, ad vias, fossas; fl. Iun. Iul. (Valv. granulo unico notata.)

* 5. R. *Nemolapathum*, flor. hermaphroditis: valvulis linearibus obtusis integerrimis graniferis, verticillis remotis, ramis patentibus, fol. inferioribus cordato-lanceolatis, superioribus lanceolatis EHRH. *phyt.* 94.

In pratis paludosis, ad fossas; fl. Iun. Iul. (Valv. plerumque omnibus granulo purpureo, aurantio notatis. R. conglomerat. MURR.)

* 6. R.

* 6. *R. maritimus*, flor. hermaphr: valvulis dentatis graniferis, fol. linearibus L. *Fl. lond.* (*R. aureus*.)

Locis udis, ad fossas (Siles. Bavar. Austr. Holsat. Saxon. Hannov. Hass. Megap. Pom. etc.) *Fl. Iul. Aug.*

* 7. *R. acutus*, flor. hermaphr: valvulis dentatis graniferis; fol. ovato - oblongis acuminatis L. *Fl. lond.*

In pratis, fossis; fl. Iun. Iul.

* 8. *R. obtusifolius*, flor. hermaphr: valvulis dentatis graniferis: fol. cordato - oblongis obtusiusculis crenulatis L. *Fl. lond.*

In ruderatis, nemorosis, ad fossas; fl. Iun - Aug. (Valvula unica granifera, ante explicationem integerrima, deflorata denticulata.)

Hermaphroditi sine granulo.

* 9. *R. aquaticus*, flor. hermaphr: valvulis integerrimis nudis, fol. cordatis glabris acutis L.

Ad ripas, fossas; fl. Iun. Iul.

10. *R. scutatus*, flor. hermaphr. fol. cordato - hastatis, caule tereti L.

Sponte locis montosis (Siles. Bavar. Hass. Nass. Palat. etc.) *Fl. Iul. Aug.* (Pedunculi plerumque terni; valvulae subrotundae calyce minores.)

Flores diclini.

* 11. *R. Acetosa*, flor. dioicis, fol. oblongis sagittatis L.

In pomariis, pratis, pascuis; fl. Maj - Iul. (Masculus calyx patens, foem. reflexus connivens; valvulae eleganter coloratae; var. caule foliisque majoribus crispis.)

* 12. R. *Acetosella*, flor. dioicis, fol. lanceolato - hastatis L. *Fl. lond.*

In arvis, pascuis, cultis; fl. Apr - Jun. (Calices maris et foem. patuli.)

183. SCHEUCHZERIA (Scheuchzerie) G.
pl. 615.

Cal. 6 - partitus; cor. 0; caps. 3 - 6, compressae inflatae; 1 - loculares.

s. *palustris*, L. *Fl. dan. t. 76.*

In uliginosis, turfosis (Siles. Bavar. Holsat. Lauenb. Boruss. Palat. Megap. Francof. Lips. etc.)
Fl. Maj - Aug.

184. TRIGLOCHIN (Dreizak) G. pl. 616.

Cal. 0; cor. petala 6, duplici ordine, stamina recondentia; caps. basi dehiscens.

* 1. T. *palustre*, caps. 3 - locularibus sublinearibus L: *Leers, t. 12. fig. 5.*

In pratis et pascuis humidis; fl. Jun. Jul. (Receptaculum triangulare superne latius; sem. apice acuminata.)

2. T. *maritimum*, caps. 6 - locularibus ovatis L. *Fl. dan. t. 306.*

In pratis et pascuis udis priori rarius; fl. Jun - Aug.

185. COLCHICUM (Zeitlose) G. pl. 621.

Cor. tubo longissimo radicato, 6 - partita; caps. 3, coadunatae in unicam 3 - lobam superam.

* C. *autumnale*, fol. planis lanceolatis erectis L. *Bull. herb. t. 18. Schk. t. 101.*

In pratis; fl. Aug - Nov. (C. *vernale* var. fol. et laciniis angustioribus.)

POLYGYNIA.

186. ALISMA (Froschkraut) *G. pl.* 625.

Cal. 3 . phyllus; petala 3; caps. compressae, recept. communi affixae.

* 1. *A. Plantago*, fol. ovatis acutis; fructibus obtuse trigonis *L. Schk. t.* 102. *Fl. lond.*

In fossis, paludosis; fl. Iul. Aug.

2. *A. parnassifolia*, fol. cordatis acutis, petiolis articulatis *L.*

In paludosis, (Berol. Wild. loco *A. dub.* et *Damas.* quae revera non illinc existunt.) *Fl. Iul.*

3. *A. natans*, fol. ovatis obtusis, pedunculis solitariis *L.*

In aquis stagnantibus, paludosis (Palat. Megap. Oldenb. Berol.) *Fl. Iun. Iul.* (Pro loco natali var. fol. omnibus aequalibus vel inferioribus lanceolato-linearibus.)

4. *A. ranunculoides*, fol. lineari-lanceolatis; fructibus globoso-squarrosis *L. Fl. dan. t.* 122.

In paludosis (Siles. Holsat. Saxon. Pom. Oldenb. Brem. Barbi, Berol. Tubing. Francof. Ger. etc.) *Fl. Iun. Iul.*

Classis VII.

HEPTANDRIA

MONOGYNIA.

187. TRIENTALIS (Schirmkraut) *G. pl.* 626.

Cal. 7 - phyllus; cor. 7 - partita; theca globosa.

* *T. europaea*, fol. lanceolatis integerrimis
L. *Fl. dan.* t. 86.

In nemorosis montosis (Siles. Bavar. Hass.
Holsat. Saxon. Megap. Brem. Oldenb. Hannov.
Thuring. etc.) Fl. Maj. Iun.

Classis VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

188. OENOTHERA (Nachtkerze) G. *pl.* 637.

Cal. superus 4 - fidus; cor. 4 - petala;
caps. infera columnaris 4 - locularis; re-
cept. ab axi fructus non distinctum.

* *o. biennis*, fol. ovato-lanceolatis planis,
caule muricato villosa L. *Fl. dan.* t. 446.

In agris cultis, ruderatis; fl. Iul. Aug.

189. EPHIOBIUM (Weidrich) G. *pl.* 639.

Cal. 4 - fidus; petala 4; caps. longissima
cylindracea 4 - locularis, 4 - valvis; semina
papposa; recept. liberum coloratum.

Staminibus declinatis.

* 1. *E. angustifolium*, fol. sparsis lineari-
lanceolatis; flor. inaequalibus L. *Fl. dan.*
t. 289.

In pratis humidis, sylvaticis; fl. Iun - Aug.

2. *E. latifolium*, fol. alternis lanceolato-
ovatis; flor. inaequalibus L. *Fl. dan.* t.
565.

In alpinis (Siles.) in sylvaticis montosis (Saxon. LEYS.) locis humidis (Fuld. LIEBLEIN.) Fl. Iul.)

Staminibus erectis, petalis 2 - fidis.

* 3. *E. grandiflorum*, fol. ovato-lanceolatis, semiamplexicaulibus hirsutis, caule ramossissimo villosa ROTH. *Fl. lond.* (*E. hirsutum*.)

In paludosis, nemorosis, ad ripas; fl. Iul. (Flores 3 majores quam in sequenti; stigma 4-fidum crassum.)

* 4. *E. parviflorum*, fol. lanceolatis subseratis pubescentibus, caule simplici villosa *Fl. lond.* (*E. villosum*.)

Cum priori (Var. *E. hirsuti*, L.)

5. *E. roseum*, fol. oppositis alternisque ovato-lanceolatis petiolatis serratis glabris SCHREB.

Ad fossas, in cultis; fl. cum priori.

* 6. *E. montanum*, fol. oppositis ovatis dentatis L. *Fl. lond.*

In nemorosis, montosis; fl. Iul. Aug. (Stigma profunde 4-fidum; laciniis reflexis.)

* 7. *E. tetragonum*, fol. lanceolatis denticulatis: imis oppositis, caule tetragono L. *Fl. lond.*

In aquosis, humidis; fl. Iul. Aug. (Stam. alterna calyci inserta, stigma crassiusculum sub-4-fidum.)

* 8. *E. palustre*, fol. oppositis lanceolatis integerrimis; petalis emarginatis; caule erecto L.

In aquosis, paludosis; fl. Iul. Aug.

9. *E. rosmarinifolium*, flor. inaequalibus; staminibus pistilloque declinatis; fol. erectis sparsis lineari-angustissimis apice callosis mucronatis HAENKE. *Curt. bot. Mag. t. 76.*

In arenosis, ad ripas (Carinth. Tirol. —) Fl. Iul. Aug. (*E. angustissimum*, AIT. hort. kew. 2. p. 5.)

10. *E. obscurum*, caule ramosissimo, fol. oppositis alternisque lanceolatis glabris serratis basi decurrentibus SCHREB.

In humidis (Lips. Berol. —) Fl. cum praecedentibus. (An *E. tetragono* affinis?)

190. CHLORA (Chlora) *G. pl. 653.*

Cal. 8-phyllus; cor. monopetala, 8-fida; caps. 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

C. perfoliata, fol. perfoliatis L. *Schk. t. 106.*

In pratis et pascuis montosis (Carn. Carinth. Palat. —) Fl. Iul. Aug.

191. VACCINIUM (Heidelbeere) *G. pl. 658.*

Cal. superus; cor. 1-petala; filamentis receptaculo (germini) inserta, antherae bicornes; bacca globosa infera.

Foliis deciduis.

* 1. *V. Myrtillus*, pedunculis unifloris; fol. serratis ovatis deciduis, caule angulato L. *Schk. t. 107.*

In sylvis umbrosis; fl. Apr. Maj. (Differt baccis ex caeruleo nigricantibus vel albidis; calyce integerrimo, cor. 5-fida, stam. 5-10. Bacca immatura 4-5-locularis.)

* 2. *V.*

* 2. *v. uliginosum*, pedunc. unifloris; fol. integerrimis obovatis obtusis laevibus L. *Fl. dan. t. 231.*

In umbrosis, paludosis (Siles. Bav. Austr. Palat. Tirol. Holsat. Megap. Pom. etc.) Fl. Maj. Iun.

Fol. sempervirentibus.

* 3. *v. Vitis idaea*, racemis terminalibus nutantibus, fol. obovatis revolutis integerrimis, subtus punctatis L. *Fl. dan. t. 40.*

In nemorosis, siccioribus; fl. Apr. Maj.

* 4. *v. Oxycoccus*, fol. integerrimis revolutis ovatis; caulibus repentibus filiformibus nudis L. *Fl. dan. t. 80.*

In paludosis, turfosis; fl. Maj. Iun. (Cal. 4-fidus, cor. 4-fida demum revoluta. Scholle-
ra ROTH.)

192. ERICA (Heide) G. pl. 659.

Cal. 4-phyllus; cor. 4-fida; filamenta receptaculo inserta, antherae 2-fidae; caps. 4-locularis, 4-valvis: dissepimentis cum suturis coeuntibus.

* 1. *E. vulgaris*, antheris aristatis, cor. campanulatis subaequalibus, calycibus duplicatis; fol. oppositis sagittatis L. *Bull. herb. t. 341.*

In pascuis, campestribus sterilissimis; fl. Aug. Sept. (Var. flore albo.)

2. *E. Tetralix*, antheris aristatis, cor. ovatis, stylo incluso; fol. quaternis ciliatis, flor. capitatis L. *Fl. lond.*

In ericetis paludosis (Siles. Holsat. Westphal. Pom. Brem. Oldenb. Hannov. Berol. Gött. Gryph. Helmst. — Hal. Saxon. G es en.) Fl. Jul. Aug. (Cal. 6. phyllus: foliolis hirsutis, duo inferiora ovato-lanceolata, caetera linearia CURTIS.)

3. *E. herbacea*, anth. muticis exsertis, cor. oblongis, stylo exserto; fol. quaternis, flor. secundis L.

In montosis (Siles. Austr. Carn.) locis sylvaticis, arenosis (Bav. Ratisb. HOPPE herb. c. 1. 14.) Fl. Mart. Apr. (Var. flore rubro et carneo.)

193. DAPHNE (Kellerhals) *G. pl.* 664.

Cal. 0; cor. 1 - petala regularis 4 - fida infundibuliformis marcescens, stamina includens; theca baccans.

* 1. *D. Mezereum*, flor. sessilibus ternis caulinis; fol. lanceolatis deciduis L. *Fl. dan.* t. 268.

In sylvis, montosis; fl. Mart. Apr.

† 2. *D. Laureola*, racem. axillaribus 5 - floris; fol. lanceolatis glabris L. *Iacq. austr.* 2. t. 183.

In sylvis elatioribus (Austr. Carn. Bav. —) Fl. Jan — Mart.

3. *D. Cneorum*, floribus fasciculatis terminalibus sessilibus; fol. lanceolatis nudis mucronatis L. *Bull. herb.* t. 121.

In apricis sabulosis, sylvaticis (Austr. Carn. Bavar. Palat. Francof. Ratisb.) Fl. Maj — Jul.

194. STELLERA (Stellere) G. pl. 667.

Cal. 0; cor. infundibuliformis 4 - 5 - fl.
da; stam. brevissima in tubi medio; pe-
ricarp. rostratum.

* s. *Passerina*, fol. linearibus, flor. 4 -
fidis L. *Iacq. ic. rar.*

In aridis campis, inter segetes (Siles. Austr.
Palat. Saxon. Francof. Ratisb. —) Fl. Iul. Sept.
(Nux supera corticata ovato-rostrata persisten-
te corolla vestita GAERTN. t. 39. 2. Var. mul-
tiflora Hoppe herb. c. 1. 15.)

DIGYNIA.

195. MOEHRINCIA (Moehringie) G. pl.
676.

Cal. 4 - phyllus; cor. 4 - petala; caps. 1 -
locularis 4 - valvis.

M. *muscosa*, L. *Iacq. austr. 5. t. 449.*

In montosis, subalpinis (Siles. Bav. Austr.
Carn. Tirol. Francof. ad Viadr. —) locis saxosis,
aquosis (Helmstad. CAPPEL.) Fl. Maj.

TRIGYNIA.

196. POLYGONUM (Knöterich) G. pl. 677.

Cal. 0; cor. calycina 5 - partita; sem. 1,
angulatum.

Spica unica.

* 1. P. *Bistorta*, caule simplicissimo mo-
nostachyo; fol. ovatis in petiolum decur-
rentibus L. *Fl. lond.*

In pratis humidis; fl. Iun — Aug. (Stam. 8,
styli 3. Var. alpina maxima KROCK.)

2. *P. viviparum*, caule simplicissimo monostachyo, fol. lanceolatis L. *Fl. dan.* t. 13.

In montosis, subalpinis (Siles. Carn. Bavar. —) Fl. Maj — Iul.

Pistillo 2 - fido, aut stamina minus 8.

* 3. *P. amphibium*, flor. pentandris semidigynis, spica ovata L. *Fl. lond.*

In aquis stagnantibus, pratis, cultis; fl. Iun. Iul. (Var. aquatica: fol. petiolatis glabris; var. terrestris: foliis acutioribus scabris differre debet; utriusque generis folia, saepe in eadem planta.)

* 4. *P. Hydropiper*, flor. hexandris semidigynis, fol. lanceolatis, stip. submuticis L. *Fl. lond.*

Locis humidis; fl. Iul. Aug. (Stam. 6, cor. breviora; stip. ciliatae Curt. Folia masticata acerrima.)

* 5. *P. Persicaria*, flor. hexandris digynis, spicis ovato - oblongis, fol. lanceolatis, stipulis ciliatis L. *Fl. lond.*

In cultis, agris subhumidis; fl. Iul. Sept. (Semen compressum planiusculum; stam. longitudine corollae; var. fol. latioribus; subtus incanis; maculatis: *P. tomentosum* SCHRANK.)

6. *P. angustifolium*, flor. pentandris semidigynis, spicis filiformibus; fol. lanceolato - linearibus ROTH. *Fl. lond.*

Locis subhumidis (*P. mite*, SCHRANK. *P. minus*, flor. hexandris submonogynis Curt.) Fl. Iul. Aug.

7. *P. intermedium*, Ehrh. herb. 94. Hannoverae —

Flo-

Floribus octandris.

* 8. *P. aviculare*, flor. octandris trigynis axillaribus; fol. lanceolatis caule procumbente herbaceo L. *Fl. lond.*

In arvis, agris, plateis; fl. Iun — Sept. (Var. caule erecto, fol. oblongis, angustis, pellucidis, rubentibus; color externe quasi calycis corollae adnati; stam. medio tubo inserta; styli 3, cor. breviores, stigmata globosa.)

9. *P. maritimum*, flor. octandris trigynis axillaribus; fol. ovali-lanceolatis semper-virentibus, caule suffrutescente L.

Locis sanulosis (Siles. confiniis Polon. KROCK.)
Fl. Iul. Aug. (Priori affinis.)

Foliis subcordatis.

10. *P. Fagopyrum*, fol. cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi; seminum angulis aequalibus L.

In agris, inter segetes quasi sponte; fl. Iun — Aug.

* 11. *P. Convolvulus*, fol. cordatis; caule volubili angulato; flor. obtusatis L. *Fl. lond.*

In agris, inter segetes; fl. Iul. Aug. (Stylus 1, stigmata 3, globosa.)

* 12. *P. dumetorum*, fol. cordatis, caule volubili laevi; flor. carinato-alatis L. *Fl. dan. t. 756.*

In sepibus et dumetis; fl. Iul. Aug. (Stylus brevissimus, stigmata ut in priori; sem. calyce alato tecta.)

TETRAGYNIA.

197. PARIS (Einbeere) *G. pl.* 683.

Cal. 4 - phyllus; petala 4, angustiora; antherae medio filamentorum adnatae; bacca globosa, 4 - locularis.

* *P. quadrifolia*, L. *Bull. herb.* t. 119.

In sylvaticis; fl. Iun. Iul.

198. ADOXA (Bisamkraut) *G. pl.* 684.

Cal. 2 - 3 - fidus inferus; cor. 4 - 5 - fida; bacca 4 - 5 - locularis, calyce cincta.

* *A. Moschatellina*, L. *Fl. lond.* Schk. t.

109.

In nemorosis, ad sepes; fl. Mart — Maj. (Capitulum 5 - florum: flore terminali octandro, lateralibus decandris; semina integumento caroso molli a pulpa baccae distincto vestita.)

199. ELATINE (Tännel) *G. pl.* 685.

Cal. 3 - 4 - phyllus: petala 3 - 4; caps. 3 - 4 - locularis, 3 - 4 - valvis, depressa.

* 1. *E. Hydropiper*, fol. oppositis (floribus alternis) L. *Vaill.* t. 2. fig. 2. Schk. t. 109.

Locis inundatis (Siles. Holsat. Oldenb. Lips. Wildeshus. Ratisb. Wittenb. —) Fl. Iun. Iul.

2. *E. triandra*, fol. et floribus oppositis. Schkuhr, t. 103. *Vaill.* t. 2. fig. 1.

Locis inundatis (Wittenb. Schk.) Fl. Iul. Aug.

3. *E. Alsinastrum*, fol. verticillatis L. *Vaill.* t. 1. fig. 6.

In paludosis, turfosis (Siles. Lips. Ien. — Stuttgard. Kerner.) Fl. Iul. Aug.

Clas-

Classis IX.

ENNEANDRIA

HEXAGYNIA.

200. BUTOMUS (Wasserviole) G. pl. 695.

Involucrum simplex 3-phyllum; petala 6; caps. 6, introrsum dehiscentes polyspermae.

* *B. umbellatus*, L. Fl. lond.

In fossis, piscinis; fl. Iun — Aug.

Classis X.

DECANDRIA

MONOGYNIA.

201. DICTAMNUS (Diptam) G. pl. 726.

Cal. 5-phyllus; petala 5; filamenta punctis glandulosis adspersa; caps. 5, introrsum elastice dehiscentes.

D. albus, fol. pinnatis, caule simplici L. Jacq. austr. 5. t. 428.

In nemorosis, montosis (Austr. Carn. Bav. palat. Saxon. Francof. Erford. Helmstad. Batisb. Nordh. etc.) Fl. Iun.

202. TRIBULUS (Burrzeldorn) G. pl. 732.

Cal. 5-partitus, petala 5; stylus unicus; pericarpia 3-5 coadunata.

† *T. terrestris*, fol. subsexjugis subaequalibus; sem. 4-cornibus L.

In montosis, inter segetes (Siles. —) Fl. Iun. Aug.

203. MONOTROPA (Ohnblatt) *G. pl.* 737.

Petala (in flore terminali) 10, apicibus serrata, exteriora 5 basi gibba; caps. 5-valvis.

* *M. Hipopythys*, flor. lateralibus octandris: terminali decandro *L. Fl. dan. t.* 232.

Parasitice ad arborum radices, in sylvaticis, montosis; fl. Iun. Iul.

204. LEDUM (Post) *G. pl.* 744.

Cal. 5-fidus; cor. 5-partita plana; caps. 5-locularis basi dehiscens.

* *L. palustre*, (fol. linearibus subtus hirsutis, floribus decandris corymbosis) *L.*

In uliginosis, turfosis (Bohem. Siles. Bavar. Saxon. Megap. Pom. Lauenb. Gött. Lips. Francof. ad Viadr. Gryph. Ger. Helmst. Nordh. —) *Fl. Iun. Iul.*

205. ANDROMEDA (Andromeda) *G. pl.* 747.

Cal. 5-partitus; cor. ovata ore 5-fido; caps. 5-locularis, dissepimentis valvis contrariis.

* *A. polifolia*, pedunc. aggregatis; cor. ovatis; fol. alternis lanceolatis revolutis *L. Fl. dan. t.* 54.

In uliginosis, turfosis (Carinth. Carn. Siles. Bav. Megap. Pom. Hannov. Holsat. Palat. Brem. Oldenb. Gött. Gryph. — Norimb. Non dubium est Volkamerum hanc pro Ledo palustri habuisse, seductus plantae similitudine; neque enim locis ab eo indicatis, neque in aliis, omni fere anni tempore a me peragratis unquam aliam nisi

nisi *A. polifoliam* invenire potui PANZER in litt.)

206. *ARBUTUS* (Bärentraube) *G. pl.* 750.

Cal. 5 - partitus inferus; cor. ovata ore basi pellucida, 5 - fida; bacca supera 5 - locularis.

† 1. *A. Unedo*, caule arboreo, fol. glabris obtuse serratis, panicula terminali, baccis polyspermis L.

In sylvaticis, montosis (Tubing. GMEL.)

* 2. *A. Uva Ursi*, caul. procumbent. fol. integerrimis L. *Fl. dan.* t. 33. *Lightf.* t. 11.

In sylvaticis, ericetis, montosis (Siles. Bav. Carn. Austr. Hass. Holsat. Pom. etc.) *Fl. Maj. Iun.* (Fol. subtus reticulata punctis destituta.)

207. *PYROLA* (Wintergrün) *G. pl.* 752.

Cal. 5 - partitus; petala 5; caps. 5 - locularis, 5 - valvis angulis dehiscens, dissepimentis contrariis.

* 1. *P. rotundifolia*, stamin. adscendentibus, stylo declinato L. *Fl. dan.* t. 110.

In nemorosis, umbrosis; fl. Maj. Iun.

* 2. *P. minor*, flor. racemosis dispersis; staminibus pistillisque rectis L. *Fl. dan.* t. 55.

In nemorosis, umbrosis; fl. Maj. — Iul.

* 3. *P. secunda*, racemo unilaterali L. *Fl. dan.* t. 402.

In sylvaticis, montosis; fl. Maj. Iun.

* 4. *P. umbellata*, pedunc. subumbellatis L.
In sylvis umbrosis (Siles. Austr. Bav. Palat.
Megap. Saxon. Danisc. Berol. Francof. Lips.
Ger. Gies. Norimb. —) Fl. Iun. Iul.

* 5. *P. uniflora*, scapo unifloro L. *Fl. dan.*
t. 8.

In nemorosis, montosis (Siles. Carn. Austr.
Bav. Palat. Nassov. Saxon. Megap. Lips. Berol.
Gött. Tubing. —) Fl. Iun. Iul.

DIGYNIA.

208. *CHRYSOSPLENIUM* (Milzkraut) G.
pl. 763.

Cal. 4 - 5 - fidus coloratus, pericarpio in-
ferne adnatus; cor. o; caps. 2 - cornis, se-
mi 2 - valvis.

* 1. *C. alternifolium*, fol. alternis L. *Fl.*
dan. t. 366.

In nemorosis, paludosis; fl. Apr. Maj.

* 2. *C. oppositifolium*, fol. oppositis L.
Fl. dan. t. 365. *Fl. lond.*

In umbrosis; fl. cum priori. (Stam. saepius
8, flos. terminalis non raro stam. gaudet 10. Cau-
lis in priori triqueter, in posteriori specie tetra-
gonus, ex observatione ROTHII.)

209. *SAXIFRAGA* (Steinbrech) G. pl. 764.

Cal. 5 - partitus: petala 5; caps. 2 - ro-
stris, 1 - locularis polysperma.

1. *S. Hirculus*, fol. caulinis lanceolatis al-
ternis nudis inermibus, caule erecto L. *Fl.*
dan. t. 200.

In humidis turfosis (Bav. Hercyn. Holsat. Me-
gap. —) Fl. Aug.

* 2. *S.*

* 2. *s. granulata*, fol. caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata L. *Fl. lond.*

In collibus graminosis, apricis; fl. Apr — Jun. (Stam. 5 reliquis breviora.)

* 3. *s. tridactylites*, fol. caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso L. *Fl. lond.*

In rupibus, agris; fl. Apr. Maj.

4. *s. petraea*, fol. caulinis palmato-3-partitis: laciniis subtrifidis, caule ramosissimo laxo L. *Iacq. ic. rar.*

In montosis, subalpinis (Siles. Carinth. Tirol. —)

* 5. *s. decipiens*, Ehrh. *herb.* 5.

In rupibus (Hercyniae, ad Rübeland. EHRH.) — (Saxifr. *petraea* ROTH.)

210. SCLERANTHUS (Knaul) G. *pl.* 767.

Cal. 5 - fidus collo arctatus persistens; cor. 0; semen pericarpiforme calycis collo inclusum.

* 1. *s. annuus*, calycibus fructus patulis L. *Fl. dan. t.* 504.

In agris, arvis; fl. Jun — Aug. (Stam. plerumque 5, brevissimis, calycis laciniis acutioribus, vix marginatis)

* 2. *s. perennis*, calycibus fructus clausis L. *Fl. dan. t.* 563.

Locis elatioribus; fl. Maj — Iul. (Calycis lacinae obtusiores albo-marginatae.)

211. GYPSOPHILA (Gypskraut)) *G. pl.* 768.

Cal. 1 - phyllus campanulatus angulatus; petala 5; caps. globosa 1 - locularis, 4 - 5 - valvis.

1. *G. repens*, fol. lanceolatis, staminibus corolla emarginata brevioribus L. *Iacq. austr.* 5. t. 407.

In arvis, montosis (Austr. Bavar. Tubing. Fuld. —) Fl. Iun — Aug.

2. *G. fastigiata*, fol. lanceolato - linearibus obsolete triquetris laevibus obtusis secundis L. *Rupp*, t. 2. fig. 1.

In montosis, aridis (Siles. Hercyn. Boruss. Helmst. Steigerthal. —) Fl. Iul.

* 3. *G. muralis*, fol. linearibus planis; calycibus aphyllis; caule dichotomo, petalis crenatis L.

Ad muros, in agris, arvis; fl. Iul. Aug. (Petala inaequaliter crenata unguiculata; receptaculum columnare.)

† 4. *G. rigida*, fol. linearibus planis, caule dichotomo, pedunc. bifloris, petal. emarginatis L.

Inter segetes (Ratisb. Gött. —)

5. *G. saxifraga*, fol. linearibus, calycibus angulatis squamis 4, corollis emarginatis L.

In agris (Bohem. Bavar. Gött. — Ratisb. Hoppe.) Fl. Iul — Sept.

212. SAPONARIA (Seifenkraut) *G. pl.* 769.

Cal. 1 - phyllus tubulosus nudus; petala 5, unguiculata; caps. oblonga 1 - locularis.

* 1. S.

* 1. *S. officinalis*, calyc. cylindricis: fol. ovato-lanceolatis L. *Fl. lond.*

In sepibus, pratis; fl. Iul. Aug. (Petalorum ungues duplicatae: apice in duo cornicula divisa; receptaculum liberum pentagonum, apice bifido.)

2. *s. Vaccaria*, calyc. pyramidatis 5-angularibus; fol. ovatis acuminatis sessilibus L.

In agris, inter segetes; fl. Iun. Iul. (Capsula duplicata: interior tenuissima receptaculum liberum obtegens MED.)

213. DIANTHUS (Nelke) *G. pl. 770.*

Cal. cylindricus 1-phyllus, basi squamis 4 cinctus; petala 5, unguiculata; caps. cylindrica 1-locularis.

Flores aggregati.

1. *D. barbatus*, flor. aggregatis fasciculatis, squamis calycinis ovato-subulatis tubum aequantibus, fol. lanceolatis L.

Sponte in sylvaticis, montosis (Carn. Siles. Tubing. —) Fl. Iul. Aug.

2. *D. Carthusianorum*, flor. subaggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubum subaequantibus, fol. trinerviis L.

In sylvis, montosis, apricis; fl. Iun. Iul. (Stigmata apice recurva.)

* 3. *D. Armeria*, flor. aggregatis fasciculatis, squamis calycinis lanceolatis villosis tubum aequantibus L. *Fl. dan. t. 230.*

In nemorosis sterilibus; fl. Iul. Aug. (Stigmata erecta patula.)

* 4. *D. prolifer*, flor. aggregatis capitatis, squamis calycinis ovatis obtusis muticis tubum superantibus L. *Fl. dan. t. 221.*

In montosis, agris; fl. Iul. Aug. (Squama inferior ovato mucronata, calyce triplo minor, reliquae 2, longitudine calycis; petala obcordata emarginata.)

Flores solitarii.

5. *D. diminutus*, flor. solitariis, squamis calycinis octonis florem superantibus L.

In campis aridis (Nassov. Tubing. Gies. Dantisc.) Fl. Iun. Iul. (Priori praeter florem solitarium intra calycem occultatum valde similis.)

* 6. *D. deltoides*, flor. solitariis, squamis calycinis lanceolatis binis; coroll. crenatis L. *Fl. dan. t. 577.*

In campis, pascuis; fl. Iun. Iul. (Stigmata flexuosa.)

7. *D. plumarius*, flor. solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis; coroll. multifidis fauce pubescentibus L.

In montosis, nemorosis (Siles. Bohem. Austr. Bavar. Carn. Pom. Tubing. etc.) Fl. Iul. Aug.

8. *D. superbus*, flor. paniculatis, squamis calycinis brevibus acuminatis; coroll. multifido - capillaribus; caule erecto L. *Fl. dan. t. 578.*

In pratis humidis, sylvis (Siles. Bav. Hass. Palat. Austr. Francon. Saxon. Megap. etc.) Fl. Iul. Aug.

Caule unifloro.

9. *D. arenarius*, caulibus subunifloris, squamis calycinis ovatis obtusis, petalis multifidis; fol. linearibus L.

In

In montosis, asperis (Carn. Siles. Austr. Saxon. Isenac. Erford. Gies. Francof. ad Viadr. Lips. Helmstad. etc.) Fl. Iul.

10. *D. alpinus*, caule unifloro; coroll. crenatis, squamis calycinis exterioribus tubum aequantibus; fol. linearibus obtusis L. *Iacq. austr.* 1. t. 52.

In montosis, subalpinis (Austr. Siles. Styr. —) Fl. Iun. Iul.

11. *D. virgineus*, caule subunifloro; coroll. crenatis, squamis calycinis brevissimis; fol. subulatis L. *Iacq. austr.* 5. t. 15.

In montosis (Austr. Carn. —) Fl. Iul. Aug.

TRIGYNIA.

214. CUCUBALUS (Taubenkropf) G. pl. 771.

Cal. inflatus 5-dentatus; petala 5, unguiculata absque corona ad faucem; caps. 3-locularis.

* 1. *c. bacciferus*, calycibus campanulatis; petalis distantibus; pericarpis coloratis; ramis divaricatis L. *Mill.* t. 112.

In dumetis, sepibus (Siles. Austr. Carn. Bavar. Palat. Saxon. Lips. Francof. Berolin. Ratisb. etc.) Fl. Iun — Aug. (Fauce denticulis coronata ad Silenem, calyce vero inflato ad Cucubalos inclinat. Bacca exsucca intus sericeo-alba unilocularis, extus atra GAERTN. t. 77.)

* 2. *c. Behen*, calyc. subglobosis glabris reticulato-venosis, caps. 3-locularibus, coroll. subnudis L. *Bull. herb.* t. 321.

In pratis siccis, nemorosis; fl. Iun. Iul.

3. *c. viscosus*, flor. lateralibus undique decumbentibus; caul. indiviso, fol. basi reflexis L.

In montanis (Carn. Siles. KROCK.) Fl. Iun. Iul.

4. *c. catholicus*, petalis bipartitis, flor. paniculatis, stam. longis; fol. lanceolato-ovatis L. *Iacq. hort. t. 59.*

In dumetis, pratis, sylvis (Siles. KROCK.) Fl. Aug.

5. *c. Otites*, flor. dioicis, petal. linearibus indivisis L. *Fl. dan. t. 518.*

In collibus siccis, sylvis, montosis (Siles. Carn. Saxon. Megap. Palat. Francon. Ratisb. Barbi, Berol. Norimb. etc.) Fl. Maj. Iun.

† 6. *c. chloranthus*, scapis subaphyllis, floribus secundis: petalis linearibus bifidis; fol. radicalibus petiolatis oblongis acutis *Wild. t. 5. fig. 9.*

Locis graminosis (Berol. —) Fl. Iun. Iul.

215. *SILENE* (Leimkraut) *G. pl. 772.*

Cal. ventricosus 5 - dentatus, petala unguiculata coronata denticulis; caps. 1 - 3 locularis.

1. *s. quinquevulnera*, petal. integerrimis subrotundis; fruct. erectis alternis L.

Ad sepes, in hortis, pomariis (Siles. Carn. —) Fl. Iun. Iul.

2. *s. cerastoides*, hirsuta, petal. emarginatis, fructific. erectis, calyc. subsessilibus subpilosis L.

(Carn. — Ratisb. HOPPE.) —

* 3. *s. nutans*, petal. 2-fidis, flor. lateralibus secundis cernuis, panicula nutante L. *Fl. dan. t. 242.*

In montosis, nemorosis, pratis aridis; fl. Maj. Iun.

4. *s. conoidea*, calyc. fructus globosis acuminatis, striis triginta; fol. glabris; petalis integris L.

Inter segetes (Siles. Saxon. LEYS.) Fl. Iun. Iul.

5. *s. conica*, calyc. fructus conicis striis triginta; fol. mollibus; petalis 2-fidis L. *Iacq. austr. 3. t. 253.*

In agris, arvis (Austr. Carn. Palat. Francof.—) Fl. Maj. Iun.

6. *s. noctiflora*, calyc. 10-angulatis; dentibus tubum aequantibus; caule dichotomo; petalis 2-fidis L.

In cultis, arvis, sepibus, inter segetes (Siles. Austr. Bavar. Hass. Palat. Saxon. Francof. Lips. Tubing. Fuld.—Ratisb. (F u n c k) etc.) Fl. Iun. Iul.

7. *s. Armeria*, flor. fasciculatis fastigiatis; fol. superioribus cordatis glabris; petalis integris L. *Fl. dan. t. 559.*

In nemorosis (Siles. Bav. Saxon. Ratisb. Barbi, Lips. —) Fl. Maj — Iul.

8. *s. rupestris*, flor. erectis, petalis emarginatis, calyc. teretibus; fol. lanceolatis L. *Fl. dan. t. 4.*

In subalpinis (Styr. Tirol. Bav. Austr.) in montosis (Tubing. GMEL.) Fl. Iul. Aug.

9. *s. acaulis*, acaulis depressa; petal. emarginatis L. *Fl. dan. t. 21.*

In alpinis (Austr. Carn. Tirol.) in montosis (Francof. ad Viadr. BERGEN.) Fl. Iun. Iul.

216. STELLARIA (Meirich) G. pl. 773.

Cal. 5-phyllus; petala 5, bipartita; caps.
1 - locularis polysperma.

* 1. s. *nemorum*, fol. cordatis petiolatis,
panicula pedunculis ramosis L. *Fl. dan.*
t. 271.

In nemorosis, humidis; fl. Iun. Iul. (Caps.
oblonga incurva.)

2. s. *dichotoma*, fol. ovatis sessilibus,
caule dichotomo; flor. solitariis, pedunc.
fructif. reflexis L.

In subalpinis (Siles. Carn.) in montosis (Hol-
sat. Wigg. Lips., in monte Rosstrapp, in nemo-
ribus prope Wolfenbüttel. BAUMG.)

* 3. s. *Holostea*, fol. lanceolatis serrulatis;
petalis 2 - fidis L. *Fl. dan.* t. 698.

Locis umbrosis, nemorosis; fl. Maj. Iun.
(Caps. globosa.)

* 4. s. *arvensis*, fol. linearibus integerri-
mis, flor. paniculatis minoribus: petalis
ultra medium 2 - partitis.

* 5. s. *palustris*, fol. linearibus integerri-
mis; flor. duplo majoribus semibifidis
Ehrh. herb. 35.

Prior in arvis, ad sepes; posterior locis pa-
ludosis, aquosis; fl. Iun. Iul. (Utramque semper
diversam, varietatem *Stellaria gramin.* ha-
buere; memorabilem brevifoliam varietatem de-
scripsit Roth. Tent. 2. p. 488.)

6. s. *Dilleniana*, caule flaccido, fol. li-
nearibus lanceolatis; pedunc. terminalibus

2 - floris, petalis 2 - partitis MOENCH.
Hass. t. 6.

In uliginosis, nemorosis (Hass. —) Fl. Iun.

* 7. s. *Alsine*, caule diffuso ramoso, fol. sessilibus, pedunc. lateralibus; petalis cal. brevioribus angustissimis bipartitis. Fl. lond.

In fossis, aquosis, uliginosis; fl. Maj. Iun.
(*Stellaria dilleniana* LEERS, aquat. POLL.
fontana, WULF. uliginosa, ROTH, CURT. etc.)

† 8. s. *lateriflora*, caule suberecto geniculato ancipiti; pedunc. axillaribus; fol. subpetiolatis Krock. Siles. 2. t. 4.

Locis uliginosis, montosis (Siles. —) Fl. Iun. Iul.

9. s. *crassifolia*, fol. ovato - lanceolatis sessilibus integerrimis crassiusculis glabris; pedunc. solitariis, fol. calycinis ovato - lanceolatis petalis multo brevioribus Ehrh. herb. 85.

In pratis humidis (Brunsvico - Luneb. — Megap. TIM. —) Fl. Iun.

10. s. *bulbosa*, fol. lanceolato - ovatis; caule subdichotomo; pedunc. elongatis unifloris; radice repente bulbifera Wulf.

Locis humidis, umbrosis (Carinth. Iacq. collect. 3. p. 21.) Fl. Apr. Maj.

217. ARENARIA (Sandkraut) G. pl. 774.

Cal. 5 - phyllus; petala 5, integra; caps. 1 - locularis, 3 - 6 valvis.

1. A. *peploides*, fol. ovatis acutis carnosiss L. Fl. dan. t. 624.

Ad littora marina (Holsat. Boruss. Megap. Pom. Gryph. Dantisc. Helmst. etc.) Fl. Iun. Iul.
(*Honkenya Peplodes*, EHRH.)

* 2. *A. trinervia*, fol. ovatis acutis petiolatis nervosis L. *Fl. lond.*

In nemorosis, umbrosis; fl. Iun. Iul.

* 3. *A. serpyllifolia*, fol. subovatis acutis sessilibus; cor. calyce brevioribus L. *Fl. lond.*

In arvis cultis, glareosis; fl. Maj — Aug.

4. *A. montana*, fol. lineari - lanceolatis scabris, caulibus sterilibus longissimis procumbentibus L.

In montosis (Siles. KROCK.) Fl. aestate.

5. *A. rubra*, caulibus prostratis, fol. oppositis filiformibus internodiis duplo brevioribus; calyc. capsulis aequalibus ROTH.

In campis, pascuis, viis arenosis; fl. Iun. Iul.

6. *A. marina*, caulibus prostratis, fol. oppositis linearibus carnosis longitudine internodiorum; calyc. capsula dimidio brevioribus ROTH. *Fl. dan. t. 740.*

In littoribus marinis, arenosis; fl. Maj. Iun.

† 7. *A. media*, fol. linearibus carnosis, stipulis membranaceis, caulibus pubescentibus L.

In agris, pascuis (Siles. Hass. Palat. etc.) —

8. *A. bavarica*, fol. semicylindricis carnosis obtusis; petal. lanceolatis; pedunc. terminalibus subbinatis L.

In Bavaria (SCHRANK) —

9. *A. saxatilis*, fol. subulatis, caul. paniculatis; calyc. foliolis ovatis obtusis L.

In montosis, subalpinis (Siles. Austr. Bay. Carn. —) Fl. Iun. Iul.

10. *A. cespitosa*, Ehrh. herb. 55.

In Hercynia. —

* 11. *A. verna*, fol. subulatis, caul. paniculatis; calyc. acuminatis striatis L. Vaill. t. 2. fig. 3. Dicks. plant. exsicc. 1.

In montosis (Norimb. PANZER.)

12. *A. tenuifolia*, fol. subulatis, caule paniculato; caps. erectis; petalis calyce brevioribus lanceolatis L. Vaill. t. 3. fig. 1.

In ruderatis, rupibus; fl. Iun — Aug.

13. *A. fasciculata*, fol. subulatis, caule erecto stricto, flor. fasciculatis, petalis brevissimis L. Jacq. austr. 2. t. 182.

In collibus arenosis (Austr. Carn. — Ratisb. HOPPE, herb. c. 1. 37.) Fl. Iun.

PENTAGYNIA.

218. SEDUM (Sedum) G. pl. 789.

Cal. 5. fidus; petala 5; squamae nectariferae 5 ad basin germinis; caps. 5, discretae leguminosae introrsum dehiscentes.

Planifolia.

* 1. *S. Telephium*, fol. planiusculis serratis corymbo folioso, caule erecto L. Fl. lond.

In montosis, umbrosis; fl. Aug. Sept. (Var. alba, purpurea.)

2. *s. maximum*, fol. planiusculis oppositis subdentatis, corymbis axillaribus KROCK.

In montosis, subalpinis; fl. aestate. (A priori vix specie diversum.)

3. *s. Anacampseros*, fol. cuneiformibus integerrimis, caul. decumbentibus, flor. corymbosis L.

Locis saxosis (Helmst. CAPPEL.) Fl. Iun.

4. *s. stellatum*, fol. planiusculis angulatis, flor. lateralibus sessilibus solitariis L.

In montosis (Tubing. GMEL.) —

5. *s. Cepaea*, fol. planis caule ramoso, flor. paniculatis L.

In montosis (Tubing. Hal. Saxon. Stuttgart. —) Fl. Iun.

Teretifolia,

*6. *s. reflexum*, fol. subulatis sparsis basi solutis: inferioribus recurvatis L.

In montosis, apricis; fl. Iun. Iul.

†7. *s. saxatile*, fol. sparsis semiteretibus obtusis basi solutis, canle ramoso decumbente WIGG. Fl. dan. t. 59.

8. *s. rupestre*, fol. subulatis quinquefariis confertis basi solutis, flor. cymosis L.

In montosis, siccis (cum priori cui valde adfinis.) Fl. Iun. Iul.

*9. *s. album*, fol. oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa L. Fl. lond.

In muris, rupibus; fl. Iul. Aug.

10. *s. atratum*, caule erecto, flor. corymbosis fastigiatis L. *Iacq. austr. t. 8.*

In montosis, exstructis (Siles. Austr. —) Fl. Iun. Iul.

* 11. *s. acre*, fol. subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida L. *Fl. lond.*

In campis, muris, pratis; fl. Iun. Iul.

* 12. *s. sexangulare*, fol. subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis sexfarium imbricatis L. *Fl. lond.*

Locis siccis, apricis; fl. Iun. Iul.

* 13. *s. villosum*, caule erecto, fol. planiusculis pedunculisque subpilosis L. *Fl. dan. t. 24.*

In pratis, paludosis (Siles. Bav. Hass. Nass. Palat. etc.) Fl. Iul. Aug.

219. OXALIS (Sauerklee) G. pl. 794.

Cal. 5-partitus; petala 5, unguibus connexa; caps. angulis pentagona.

* 1. *O. Acetosella*, scapis unifloris, fol. ternatis: foliolis obcordatis pilosis L. *Fl. lond.*

In nemorosis, umbrosis; fl. Apr — Iun. (Semina in singulo loculamento 2, obovata striata planiuscula, vestita membranula eodem tempore cum semine prosiliente discedente.)

* 2. *O. corniculata*, caule decumbente herbaceo, pedunc. umbelliferis L. *Fl. dan. t. 873.*

Locis cultis herbaceis; fl. Iun — Aug.

220. AGROSTEMA (Raden) G. pl. 795.

Cal. 1 - phyllus coriaceus, 5 dentatus; pet. 5, unguiculata, limbo patente obtuso; caps. 1 - locularis 5 - valvis; receptaculo libero gradatim longiore.

* 1. A. *Githago*, hirsuta; calyc. corollam aequantibus, petalis integris nudis L. *Fl. lond.*

Inter segetes; fl. Iun. Iul.

2. A. *coronaria*, tomentosa, fol. ovato-lanceolatis; petalis emarginatis coronatis serratis L.

In pomariis, ruderatis (prope Lips. BAUMG.) Fl. aestate.

3. A. *Flos Iovis*, tomentosa, petalis emarginatis L.

In sylvis montosis (Palat. POLL.) Fl. Iul.

221. LYCHNIS (Lichtnelke) G. pl. 796.

Cal. 1 - phyllus oblongus membranaceus 5 - dentatus, petala 5, unguiculata coronata, limbo subbifido; caps. subovata 1 - 5 - locularis.

* 1. L. *Flos Cuculi*, petalis 4 - fidis, fructu subrotundo L. *Fl. lond.*

In pratis; fl. Iun. Iul. (Petal. lacinae inferiores breviores divaricatae, ad faucem denticuli bifidi.)

2. L. *quadridentata*, petal. 4 - dentatis; caul. dichotomo; fol. glabris recurvis L. *Iacq. austr. 2. t. 120.*

In nemorosis, montosis (Bay. Austr. Carn. Saxon. —) Fl. Iul. Aug.

3. L.

*3. *L. Viscaria*, petalis subintegris L.

In agris montosis, nemorosis; fl. Iun. Iul.

*4. *L. dioica*, flor. dioicis L. *Fl. lond.*

In arvis, nemorosis, humidis; fl. Maj — Iun.
(Var. sylvestris, arvensis, hermaphrodita.)

222. CERASTIUM (Hornkraut) *G. pl.* 797.

Cal. 5 - phyllus; pet. 5, bifida, longitudine fere calycis; caps. 1 - locularis, apice dehiscens: 10 - dentata.

Capsulis oblongis.

*C. 1. *vulgatum*, fol. ovatis; petalis calyci aequalibus; caul. diffusis L. *Vaill. t.* 30. *fig. 1. Fl. lond.*

In agris, cultis; fl. Maj. Iun. (Caps. semitec-
ta; petala calyce longiora $\frac{1}{3}$ bifida.)

*2. *C. viscosum*, erectum villosa - visco-
sum L. *Vaill. t.* 30. *fig. 3. Fl. lond.*

In pratis, pascuis, arvis; fl. Maj — Aug. (Ca-
lyc. foliol. albo - marginata, petala calyce bre-
viora.)

3. *C. semidecandrum*, flor. pentandris,
petalis emarginatis L. *Vaill. t.* 30. *fig. 2. Fl. lond.*

In campis, pascuis; fl. Maj. Iun. (Planta hi-
suta virescens; stam. 5 antherifera, 5 sterilia.)

4. *C. pentandrum*, flor. pentandris, pe-
talis integris L. *Krock. Siles. 2. t.* 7.

In pascuis, ad vias (Siles. —) Fl. Mart — Maj.
(Planta minor priori virescens; stam. 5; petala
calyce minora.)

*5. *C. arvense*, fol. lineari-lanceolatis ob-
tusis glabris; cor. calyce majoribus L. *Vaill.*
t. 30. *fig. 4. Fl. lond.*

In

In arvis, campis; fl. Apr. Maj. (Petal. calyce duplo longiora.)

+ 6. *c. dichotomum*, fol. lanceolatis, caule dichotomo ramosissimo; caps. erectis L.

Inter segetes (Siles. Gött. —) Fl. Iun. Iul. (Cal. corolla quadruplo longior.)

Capsulis subrotundis.

+ 7. *c. repens*, fol. lanceolatis, pedunc. ramosis; caps. subrotundis L.

Locis sylvosis (Garn. Ger. —) Fl. Iun.

+ 8. *c. suffruticosum*, caule perenni procumbente, fol. lineari-lanceolatis subhirsutis L.

Ad muros (Tubing. Gmel.) —

* 9. *c. aquaticum*, fol. cordatis sessilibus; flor. solitariis, fructibus pendulis L. Fl. lond.

In aquosis, nemorosis, ad fossas; fl. Iun — Aug. (Petalis ad basin 2-fidis; caps. 5-fariam dehiscens: valvulis bifidis.)

223. SPERGULA (Spark) G. pl. 798.

Cal. 5-phyllus; petala 5, indivisa; caps. ovata 1-locularis 5-valvis; sem. margine emarginato cinctis.

* 1. *s. arvensis*, fol. verticillatis, flor. decandris L. Fl. lond.

In agris, arvis; fl. Maj — Aug.

* 2. *s. pentandra*, fol. verticillatis, flor. pentandris L. Ehrh. herb. 76.

In arenosis, siccis; fl. Apr. Maj.

3. s. *nodosa*, fol. oppositis subulatis laevibus, caulibus simplicibus L. *Fl. lond.*

In pratis, pascuis; fl. Iul. Aug.

4. s. *saginoides*, fol. oppositis linearibus laevibus, pedunculis solitariis longissimis, caule repente L. *Ehrh. herb. 7. Fl. lond.*

In montosis, campis, arenosis (Bav. Oldenb. Hannov. —) Fl. Iun. Iul. (Folia pilis glanduliferis per lentem obsita; filamenta saepius 5.)

Classis XI.

D O D E C A N D R I A

M O N O G Y N I A.

224. ASARUM (Haselwurz) G. *pl.* 801.

Cal. superus semi 3-4-fidus: denticulis incurvis; cor. 0; caps. infera coriacea subsexlocularis evalvis: dissepimentis ad axem solutis.

* *A. europaeum*, fol. reniformibus obtusis binis L. *Bull. herb. t.* 69.

In nemorosis, montosis; fl. Mart. April.

225. PORTULACA (Portulak) G. *pl.* 824.

Cal. 2-fidus; cor. 5-petala; caps. 1-locularis circumscissa.

* *P. oleracea*, fol. cuneiformibus; flor. sessilibus L.

Ad muros, in glareosis, cultis; fl. Iul. Aug.

226. *LYTHRUM* (Weidrich) *G. pl.* 825.

Cal. 6-12-dentatus: denticulis alternis; petala 6, calyci inserta; caps. oblonga 1-2-locularis.

* 1. *L. Salicaria*, fol. oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris *L. Fl. lond.*

Ad ripas, fossas; fl. Iul. Aug. (Var. caule hexaedro fol. 3, et octaedro fol. 4 cincto; spica interrupta spiraliter adscendens; stam. 6, calyce longioribus, 6, calyce altius insertis.)

* 2. *L. Hyssopifolia*, fol. linearibus alternis, flor. hexandris *L. Rupp. Ien. t. 6.*

Locis humidis, inundatis (Siles. Austr. Carn. Hass. Hannov. Lusat. inf. Palat. Saxon. Lips. Iem. Berol. Barbi; Francof. etc.) Fl. Iul. Aug.

3. *L. virgatum*, fol. oppositis lanceolatis, panic. virgata, flor. dodecandris ternis *L. Jacq. austr. t. 7.*

Locis humidis (Siles. Austr. —) Fl. Iul.

4. *L. Thymifolia*, fol. alternis linearibus; flor. tetrapetalis *L.*

In pratis udis (Siles. KROCK. Hal. Saxon. WILDEN.) Fl. Aug. (Staturam minorem si excipias, *L. Hyssopifol.* valde affinis.)

DIGYNIA.

227. *AGRIMONIA* (Odermennig) *G. pl.* 830.

Cal. 5-fidus superus altero obvallatus; petala 5; (receptaculum (calyx) induratum, caps. (bilocularis?) 2, 1-sperme MED.)

* 1. *A. Eupatoria*, fol. caulinis pinnatis; impari petiolato; fructibus hispidis L. *Fl. lond.*

In nemorosis, ad sepes, vias; fl. Iul — Sept. (Calyculus basin calycis cingit ex foliolis binis, trifidis: media lacinia majore; setae superioris sursum hamatae; filamenta 20-30, antherae antea stigmatibus incumbentes, anthesi peracta patentes.)

2. *A. Agrimonoides*, fol. caulinis ternatis; flor. suboctandris; fructibus glabris WULF.

In montosis, sylvis (Carinth. Carniol. —) Fl. Maj.

TRIGYNIA.

228. RESEDA (Wau) *G. pl.* 831.

Cal. 4 - 6 - partitus; cor. 4 - 6 - petala fissae; caps. 1 - locularis apice pervia; receptacula parietalia.

* 1. *R. Luteola*, fol. lanceolatis integris basi utrinque unidentatis; calycibus 4 - fidis L. *Fl. dan. t.* 864.

Ad vias, in agris; fl. Maj. Iun. (Petala 3: supremum 6 - fidum, lateralibus 5 - fidis; infima duo simplicia integra; stam. 30; caps. 3 - sulcata, 3 - carinata, transversim undulata.)

2. *R. alba*, fol. pinnatis; flor. tetragynis, calycibus 6 - partitis L.

In ruderalis (Tubing. GMEL.) in collinis (prope Lips. BAUMG.) Fl. Iun — Aug.

3. *R. lutea*, fol. omnibus 3 - fidis, inferioribus pinnatis L. *Iacq. austr. 4. t.* 353.

Ad margines viarum, in ruderalis, montosis; fl. Maj. Iun.

229. EUPHORBIA (Wolfsmilch) G. pl. 832.

Cal. 1 - phyllus ventricosus 4 - 5 - dentatus; petala 4 - 5, calyci alterna, imposita; caps. 3 - cocca.

Dichotomae.

† 1. E. *Chamaesyce*, dichotoma, fol. crenulatis subrotundis glabris; flor. solitariis axillaribus; caul. procumbentibus L.

In hortis sponte (Tubing. GMEL.) —

2. E. *Peplis*, dichotoma, fol. integerrimis semicordatis, flor. solitariis axillaribus; caulibus procumbentibus L.

Ad littora (Siles. Carn. —) Fl. Aug.

Umbella trifida.

* 3. E. *Peplus*, umbella trifida: dichotoma, involucellis ovatis, fol. integerrimis obovatis petiolatis L. *Bull. herb. t. 79.*

In cultis oleraceis; fl. Aug. Sept. (Petala bicornia; caps. tricarinata undulato - crenulata; sem. hinc angulata bisulcata, inde convexa reticulata.)

* 4. E. *exigua*, umbella trifida: dichotoma, involucellis lanceolatis, fol. linearibus L. *Fl. lond.*

Inter segetes, var. fol. retusis in pratis, agris; fl. Jul. Aug. (Flores ex minimis; petala bicornia peltata, calyx acute 4 - dentatus; caps. glabra, semina obsolete reticulata. Var. *exigua acuta.*)

5. E. *falcata*, umbella trifida: dichotoma, involucellis subcordatis mucronatis, fol.

fol. lanceolatis obtusiusculis L. *Iacq. austr.* 2. t. 121.

In agris, inter segetes (Siles. Austr. Palat. —) Fl. Sept.

Umbella quadrifida.

6. E. *Lathyris*, umbella quadrifida: dichotoma, fol. oppositis integerrimis L. *Bull. herb.* t. 103.

In cultis oleraceis (Siles. Carn. Nassov. Berol. Lips. Danisc. Isenac. Ratisb. etc.) Fl. Iun. Iul. (Calyx 5-dentatus: denticulis apice bifidis, petala bicornia: cornibus apice fungosis; caps. ex maximis, laevis, elastice dissiliens; semina obovata.)

Umbella quinquefida.

7. E. *dulois*, umbella quinquefida: bifida, involucellis subovatis, fol. lanceolatis obtusis integerrimis L.

In sylvaticis, montosis (Siles. Austr. Carn. Bav. Saxon. Nass. etc.) Fl. Maj. Iun. (Caps. glandulis duplici serie imbricatis eleganter coronata.)

8. E. *Paralias*, umbella subquinquefida: bifida, involucellis cordato-reniformibus, fol. sursum imbricatis L. *Iacq. hort.* 2. t. 188.

In sabulosis, prope ripas (Siles. Austr. Carn. Tubing. —) Fl. Maj. Iun.

9. E. *segetalis*, umbella 5-fida: dichotoma, involucellis cordatis acutis, fol. lineari-lanceolatis: superioribus latioribus L. *Iacq. austr.* 5. t. 450.

Inter segetes, locis sabulosis, umbrosis (Siles. Austr. Berol. — Blanckenburg HEINZE.) Fl. Maj. Iun.

* 10. *E. helioscopia*, umbella 5 - fida: trifida, dichotoma, involucellis obovatis, fol. cuneiformibus serratis L. *Fl. lond.*

In cultis oleraceis; fl. Iun — Aug. (Petala subrotunda; caps. glabra; sem. obovata subhirsuta.)

11. *E. verrucosa*, umbella 5 - fida: subtrifida: bifida, involucell. ovatis, fol. lanceolatis serratis villosis; caps. verrucosis L.

In sylvis montosis (Siles. Carn. Bavar. Turing. —) Fl. Iun. Iul.

+ 12. *E. pilosa*, umbella 5 - fida, trifida: bifida, involucell. ovatis; petalis integris; fol. lanceolatis subpilosius apice serrulatis L. *Hoppe, ect.* 49.

In montosis (Siles. Bavar. Ratisb. —) Fl. Maj. Iun.

* 13. *E. platyphyllos*, umbella 5 - fida: trifida: dichotoma, involucellis carina pilosis, fol. serratis lanceolatis; caps. verrucosis L. *Jacq. austr.* 4. t. 376.

In agris, cultis; fl. Iul. Aug.

14. *E. sylvatica*, umbella 5 - fida: bifida, involucellis perfoliatis subcordatis, fol. lanceolatis integerrimis L. *Bull. herb.* t. 95.

In sylvaticis, umbrosis (Bav. Carn. Austr. Siles. Hercyn. Palat. etc.) Fl. Iul. Aug.

Umbella multifida.

* 15. *E. Esula*, umbella multifida: bifida, involucellis subcordatis; petalis subbicor-nibus; ramis sterilibus; fol. uniformibus L.

In agris, ad vias; fl. Maj. Iun.

16. *E. gerardiana*, umbella multifida dichotoma, involucellis subrotundis, petalis integerrimis: ramis nullis, fol. uniformibus L. *Iacq. austr.* 5. t. 456.

Ad lacum salsum (prope Rültsdorf in Mansfeld. Wildenow, Hoppe.) —

* 17. *E. Cyparissias*, umbella multifida: dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus, fol. setaceis: caulinis lanceolatis L. *Bull. herb.* t. 97.

In collinis, locis siccis; fl. Maj — Iul.

18. *E. palustris*, umbella multifida: subtrifida: bifida, involucellis ovatis, fol. lanceolatis, ramis sterilibus L. *Bull. herb.* t. 87.

Locis humidis, palustribus (Siles. Bav. Austr. Palat. Saxon. Hass. Brem. etc.) Fl. Maj. Iun.

19. *E. hyberna*, umbella 6-fida: dichotoma, involucell. ovalibus, fol. integerrimis, ramis nullis; caps. verrucosis L.

In montanis (Siles. KROCK.) Fl. Iun.

20. *E. amygdaloides*, umbella multifida: dichotoma, involucell. perfoliatis orbiculatis, fol. obtusis L.

In nemorosis, montosis (Siles. Austr. Saxon. Thuring. Fuld. —) Fl. Maj. Iun.

21. *E. Cajogala*, radice perenni; caule herbaceo, fol. alternis lineari-lanceolatis acutis mucronatis trinerviis; umbella multifida, involucri foliol. lato-lanceolatis, umbellul. dichotomis, involucellis diphyllis: foliolis lato-cordiformibus; petalis integris, fructu glabro EHRH.

In pascuis (Carn? Siles? Palat? Hannov. —)

22. *E. Characias*, umbella multifida: bifida, involucellis perfoliatis emarginatis, fol. integerrimis, caule frutescente L.

In montosis collinis (Siles. Lauenb. Danise. —) Fl. aestate.

Umbella nulla.

23. *E. degener*, fol. alternis obtusis, punctis croceis notatis. Hoppe, eet. 560. (*E. sterilis*.)

In pascuis, locis sabulosis; viget Iun — Aug. (Morbosa et monstrosa varietas *E. Cypariss*?)

DODECAGYNIA.

230. SEMPERVIVUM (Hauswurz) *G. pl.* 837.

Cal. 12 - partitus; petala 12; caps. 12, leguminosae, introrsum dehiscentes.

* 1. *s. tectorum*, fol. ciliatis, propaginibus patentibus L. *Fl. lond.*

In muris tectis, collinis; fl. Iul — Sept. (Petala lanceolata serrulata, carina hirsuta; filamentum ad basin cujusvis petali; germi singulo basi adnascitur squama nectarifera, oblique assurgens gibba rhomboidea saepe germinis figura, crassiuscula, apice acuta pedunculata.)

2. *s. globiferum*, fol. ciliatis, propaginibus globosis L. *Iacq. austr.* 5. t. 40.

In muris tectis, montosis (Austr. Nass. Francof. ad Viadr. Ien. —) Fl. cum priori.

3. *s. hirtum*, fol. caule petalorumque apicibus hirtis L. *Iacq. austr.* 1. t. 12.

In montosis (Siles. Austr. —) Fl. Iul. Aug.

4. §.

4. *s. montanum*, fol. integerrimis, propaginibus patulis L. *Iacq. austr.* 5. t. 41.
In montosis (Siles. Austr. —) Fl. Iul. Aug.

Classis XII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

231. PHILADELPHUS (Pfeifenstrauch)

G. pl. 840.

Cal. 4 - 5 - partitus; cor. 4 - 5 - petala;
caps. 4 - 5 - locularis, semiinfera.

P. coronarius, fol. subdentatis L.

In sepibus, dumetis, hinc inde: fl. Maj. Iun.
(Petala apice emarginata. Semina arillata: arillo membranaceo spongioso oblongo ad umbilicum fimbria lacera terminato, in parte opposita in caudam acuminatam desinente GAERTN. t. 35. fig. 2.)

232. PRUNUS (Pflaumen, Kirschenbaum)

G. pl. 849.

Cal. 5 - fidus, inferus; petala 5; drupae
nux suturis prominulis.

* 1. *P. Padus*, flor. racemosis, fol. deciduis basi subtus (supra) biglandulosis L.
Kern. t. 195.

In sepibus, dumetis. nemorosis; fl. Maj. Iun.

2. *P. Mahaleb*, flor. corymbosis terminalibus, fol. ovatis L. *Iacq. austr.* 3. t. 227.

In sylvis montosis (Siles. Austr. Carn. Palat. —) Fl. Maj.

*3. *P. Cerasus*, umbellis subpedunculatis, fol. ovato - lanceolatis glabris conduplicatis L.

In sepibus; fl. Maj. Iun.

4. *P. Chamaecerasus*, Jacq. coll. 1. 133. ic. rar.

In montosis, nemorosis (Austr. Palat. Saxon. etc.) Fl. Maj.

5. *P. austera*, Ehrh. frut. 63.

*6. *P. avium*, umbellis sessilibus, fol. ovato - lanceolatis, subtus pubescentibus conduplicatis L.

In sylvis, nemorosis; fl. Maj.

7. *P. domestica*, pedunc. subsolitariis, fol. lanceolato - ovatis convolutis, ramis muticis L.

In sepibus, pomariis; fl. Apr. Maj.

8. *P. insiticia*, pedunc. geminis, fol. ovatis subtus villosus convolutis, ramis spinescentibus L.

In sepibus et dumetis; fl. Apr. Maj.

*9. *P. spinosa*, pedunc. solitariis, fol. lanceolatis glabris, ramis spinosis L. *Fl. lond.*

In sepibus, dumetis; fl. Apr. Maj.

DIGYNIA.

233. CRATAEGUS (Hagedorn) G. pl. 854.

Cal. 5 - fidus superus, petala 5; drupa uperne aperta, ossiculis 2 - 1.

3. c.

1. *C. Aria*, fol. ovatis incisiss serratis, subtus tomentosis L. *Fl. dan.* t. 302.

In sylvis montosis (Siles. Bav. Tirol. Palat. Austr. Carn. Thuring. Hass. Nass. Hannov. etc.) Fl. Maj. Iun. (*Pyrus Aria*, Ehrh. frut. 84.)

* 2. *C. torminalis*, fol. cordatis septangulis: lobis infimis divaricatis L. *Iacq. austr.* 5. t. 443.

In nemorosis, fl. Maj. (*Pyrus torminalis*, Ehrh. frut. 94.)

* 3. *C. Oxyacantha*, fol. obtusis subtrifidis serratis L. *Fl. dan.* t. 634.

In sepibus, dumetis; fl. Maj. Iun. (Petala crenulata; nuclei 2, hinc convexi carinati, inde subangulati, apice ciliis coronati.)

4. *C. monogyna*, fol. subtrifidis acutis, flor. monogynis L. *Iacq. austr.* 3. t. 292. fig. 1.

In sepibus, dumetis, hinc inde; fl. cum priori. (Nux 1.)

TRIGYNIA.

234. *SORBUS* (Speierling) G. pl. 855.

Cal. 5 - fidus; petala 5; antrum pomum superne apertum, 3. 5 - locale.

* 1. *S. aucuparia*, fol. pinnatis utrinque glabris L.

In nemorosis, ad pagos; fl. Maj. Iun.

† 2. *S. hybrida*, fol. semipinnatis, subtus tomentosis L. *Linn. dec.* t. 6.

In nemorosis (Thuring.) Fl. cum priori.

3. *S. domestica*, fol. pinnatis, subtus villosis L. *Iacq. austr.* 5. t. 447.

In montosis (Siles. Austr. Bav. Tubing. Fuld. Francof. Erford. —) Fl. Maj.

PENTAGYNIA.

235. MESPILUS (Mispeln) G. pl. 857.

Cal. 5 - fidus superus; petala 5; drupa superne aperta, ossiculis 3 - 5 pluribus.

1. *M. germanica*, inermis, fol. lanceolatis subtus tomentosis, flor. solitariis sessilibus L.

In nemorosis (Siles. Austr. Hass. Palat. Saxon. etc.) Fl. Maj. (Spontanea planta semper spinosa, culta inermis ROTH.)

2. *M. Amelanchier*, inermis, fol. ovalibus serratis, subtus hirsutis L. *Iacq. austr.* 3. t. 300.

In montosis, nemorosis (Austr. Carn. Palat. Bav. Hercyn. Francof. ad Moen. —) Fl. Maj. (Antrum carnosum decemloculare MED. *Pyrus Amelanch.* EHRH. frut. 65.)

3. *M. Chamae Mespilus*, inermis, fol. ovalibus acute serratis glabris, flor. corymboso-capitatis L. *Iacq. austr.* 3. t. 231.

In montosis, subalpinis (Austr. Carn. Bav. —) Fl. Jun. (Antrum Pomum biloculare MED. *Pyrus Chamae Mesp.* EHRH.)

4. *M. Cotoneaster*, inermis, fol. ovatis integerrimis, subtus tomentosis L. *Fl. dan.* t. 112.

In montosis (Austr. Carn. Bav. Siles. Hass. Nassov. Palat. Saxon. etc.) Fl. Apr. Maj. (Sylvestris natali loco stylis 3, ossiculis 3, culta variat stylis 5, ossiculis 5.)

236. PYRUS (Birnbäum) G. pl. 858.

Cal. 5 - fidus superus; petala 5; antrum pomum 5 - locale.

* 1. *P. communis*, fol. serratis laevibus, flor. corymbosis L.

In sylvis, sepibus; fl. April. Maj. (Loculamentorum anguli obtusi. *P. sylvestris*, fol. oblongo-ovatis laevibus subdentatis; flor. umbellatis; fructu breviter pedunculato EHRH. arb. 64.)

2. *P. Pollueria*, fol. serratis, subtus tomentosus, flor. corymbosis L.

Variis Germaniae locis; fl. Apr. Maj.

* 3. *P. Malus*, fol. serratis, umbellis sessilibus L.

In sepibus, sylvis; fl. Maj. Iun. (Loculamentorum anguli acuti. *P. Malus sylvestris*, fol. acuminatis subtus hirsutis, pedunc. umbelliferis subsessilibus EHRH. arb. 47.)

4. *P. Cydonia*, fol. integerrimis, flor. solitariis L. *Iacq. austr.* 4. t. 342.

Ad sepes (Siles. Bav. Austr. etc.) quasi sponte; fl. Maj. Iun.

237. SPIRAEA (Spierstaude) *G. pl.* 268.

Cal. 5-fidus; petala 5; caps. plures 1-loculares bivalves; semina suturae internae affixae.

* 1. *S. salicifolia*, fol. lanceolatis obtusis serratis nudis, flor. duplicato-racemosis L.

In sylvis montosis, ad sepes; (Carinth. Siles. Bav. Hass. Tubing. Berol. Altorf. —) Fl. Iul.

* 2. *S. Aruncus*, fol. supradecompositis, spicis paniculatis, flor. dioicis L.

In nemorosis, montosis (Siles. Bav. Bohem. Hass. Palat. Austr. Carn. Saxon. etc.) Fl. Iul.

* 3. *S.*

* 3. s. *Filipendula*, fol. interrupte pinnatis: foliolis lineari-lanceolatis interrupte serratis glaberrimis, flor. cymosis L. *Fl. dan.* t. 635.

In pratis, pascuis; fl. Iun. Iul.

* 4. s. *Ulmaria*, fol. interrupte pinnatis: foliol. ovatis biserratis subtus canis, flor. cymosis L. *Fl. lond.*

In pratis uliginosis; fl. Iun. Iul.

POLYGYNIA.

238. ROSA (Rose) G. pl. 863.

Cal. 5 - fidus globosus, collo coarctatus; petala 5; antrum duplicatum per pericarpia intus nidulantia, 1 - locale superne apertum.

* 1. R. *Eglanteria*, germinibus globosis pedunculisque glabris; caule aculeis sparsis rectis, petiolis scabris, foliolis acutis L.

In sepibus et dumetis (Siles? Hass. Saxon. Bav. Thuring. Barbi, Gött. Tubing. -) Fl. Iun. Iul.

* 2. R. *rubiginosa*, germin. globosis petiolisque aculeatis: aculeis recurvis, fol. subtus rubiginosis L. *Jacq. austr.* 1. t. 50.

In sepibus, dumetis (Siles. Austr. Hass. Hol. sat. Palat. Saxon. etc.) Fl. Iun. Iul.

3. R. *cinnamomea*, germin. globosis pedunculisque glabris, caule aculeis stipularibus, petiolis subinermibus L.

In sepibus (Siles. Bav. Saxon. Nassov. Francon. -) Fl. Iun. (R. *collincola*, EHRH. fruct. 25.)

4. R.

4. *R. arvensis*, germin. globosis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis, flor. cymosis L. *Fl. dan. t. 398.*

In sepibus (Siles. Brem. Erford. Barbi, —) Fl. Iun. (An eadem cum *R. sylvestri*? —)

5. *R. pimpinellifolia*, germin. globosis pedunculisque glabris, caule aculeis sparsis rectis, petiol. scabris, foliol. obtusis L.

In collinis (Siles. Palat? —) Fl. Iun. Iul.

* 6. *R. spinosissima*, germinibus globosis glabris, pedunc. hispidis, caule petiolisque aculeatissimis L.

In dumetis, sepibus (Siles. Austr. Saxon. Hass. Nassov. etc.) Fl. Iun. Iul. (Ex observatione EHRHARTI a priori non diversa.)

* 7. *R. villosa*, germin. globosis pedunculisque hispidis, caule aculeis sparsis, petiolis aculeatis, fol. tomentosis L. *Ehrh. frut. 45.*

In sylvis, dumetis; fl. Iun. Iul.

8. *R. sempervirens*, germin. globosis, pedunculisque hispidis, caule petiolisque aculeatis, flor. subumbellatis L.

In sepibus (Nassov. Lips. Tubing. Siles? —) Fl. Iun. Iul.

† 9. *R. foecundissima*, germin. globosis, pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis: aculeis axillaribus geminis, foliol. ovato-oblongis subtus villosis ROTH.

In sepibus (Bav. Hannov. Oldenb. —) Fl. Iun. Iul.

10. *R.*

10. *R. gallica*, germin. ovatis, pedunculisque hispidis, caule petiolisque hispidis - aculeatis L.

In montosis (Siles. Austr. Bav. Palat. Ratisb. etc.) Fl. Maj. Iun. (Difficilius eruitur an hanc vel pumilam IACQ. auctores intellexerint.)

11. *R. alpina*, germin. ovatis glabris, pedunc. petiolisque hispidis, caule inermi L. *Iacq. austr.* 3. t. 279.

In montosis, subalpinis (Siles. Austr. Carn. Bav. Thuring. —) Fl. Inn. Iul.

* 12. *R. canina*, germin. ovatis, pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis L. *Ehrh. frut.* 55. *Fl. lond.*

In dumetis, sepibus; fl. Iun. Iul.

† 13. *R. sylvestris*, germinibus subglobosis, pedunculisque glabris, calyc. semipinnatis, caule aculeis stipularibus, foliol. ovatis acutis subtus cum petiolo villosulis SCHRANK.

In montosis, agris (Bav. Siles. Palat. etc.) Fl. Iul.

14. *R. alba*, germin. ovatis glabris, pedunc. hispidis, caule petiolisque aculeatis L.

In sepibus, dumetis; fl. Iun. Iul.

15. *R. serpens*, *Ehrh. frut.* 35.

In montibus Siebenbergen. —

239. RUBUS (Brombeer) G. *pl.* 864.

Cal. 5 - fidus; petala 5; drupae congregatae in capitulum convexum, 1 - loculares.

Fru-

Fruticosi.

* 1. *R. idaeus*, fol. quinato - pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis L. *Fl. dan. t. 788.*

In nemorosis, montosis; fl. Maj. Iun. (Var. caule inermi, fructu albido.)

* 2. *R. caesius*, fol. ternatis subnudis: lateralibus bilobis, caule aculeato tereti L. *Krock. 2. t. 8. Bull. t. 381.*

In nemorosis, dumetis; fl. Iun. Iul.

* 3. *R. fruticosus*, fol. quinato - digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis L. *Schmid. ic. t. 2.*

In nemorosis, dumetis; fl. Maj. Iun.

Herbacei.

* 4. *R. saxatilis*, fol. ternatis nudis, flagellis reptantibus herbaceis L. *Fl. dan. t. 134.*

In nemorosis, montosis (Siles. Bav. Austr. Carn. Hass. Nassov. Holsat. Saxon. etc.) Fl. Maj. Iul.

* 5. *R. Chamaemorus*, fol. simplicibus lobatis, caule inermi unifloro L. *Lightf. 1. t. 13.*

Locis altioribus, montosis, uliginosis (Siles? Hass. RUPP. Tirol. —) Fl. Iun.

240. FRAGARIA (Erdbeer) G. pl. 865.

Cal. 10 - fidus: laciniis exterioribus angustioribus: petala 5; receptaculum baccans pulposum, basi truncatum, deciduum; semina per superficiem sparsa.

M

* 1. F.

* 1. *F. vesca*, flagellis reptantibus L.
In nemorosis, pascuis; fl. Apr. Maj. (Var. sylvestris; pratensis.)

2. *F. sterilis*, caule decumbente, ramis floriferis laxis L. *Fl. lond.*

In montosis, nemorosis; fl. Iul. (Comarum fragarioides, ROTH.)

241. *POTENTILLA* (Fingerkraut) G. *pl.* 866.

Cal. 10 - fidus; laciniis alternis minoribus reflexis; petala 5; semina nuda, receptaculo parvo exsucco affixa.

Fol. pinnatis.

* 1. *P. Anserina*, fol. pinnatis serratis, caule repente, pedunculis unifloris L. *Fl. lond.*

Ad vias, in pascuis siccis, argillosis (fol. albis sericeis.) Fl. Maj — Iul. (Var. minor.)

2. *P. rupestris*, fol. pinnatis ternatisque, caule erecto, flagellis nullis L. *Iacq. austr.* 2. *t.* 114.

In montosis, rupestribus (Siles. Austr. Carn. Nass. Saxon. Palat. etc.) Fl. Maj. Iun. (in Bohem. rupestribus SCHUHR, in litt.)

3. *P. bifurca*, fol. pinnatis subaequalibus: foliolis oblongis sub-bifidis: extimis confluentibus L.

Locis sabulosis (Siles. KROCK.) Fl. Iun. Iul.

4. *P. supina*, fol. pinnatis, caule dichotomo decumbente L. *Iacq. austr.* 5. *t.* 406.

Locis humidis, sabulosis (Siles. Bav. Austr. Palat. Saxon. Lips. Fuld. Barbi, Erford. Berol. Francof. — Fl. Iun. Iul.

Fol.

Fol. digitatis.

5. *P. recta*, fol. septenatis lanceolatis serratis, utrinque sub-pilosis, caule erecto L. *Iacq. austr. 4. t. 383.*

Locis montosis, ruderatis (Siles. Bav. Austr. Carn. Nass. Tubing. Lips. —) Fl. Iun. Iul.

* 6. *P. argentea*, fol. quinatis cuneiformibus incisissimis, subtus tomentosis, caule erecto L. *Fl. dan. t. 865.*

Ad vias, in ruderatis, agrorum marginibus; fl. Maj. Iun.

7. *P. hirta*, fol. septenatis quinatisque, cuneiformibus incisissimis pilosis, caule erecto hirsuto L.

In montosis, arenosis, humidis (Siles. —) Fl. Iun. Iul.

8. *P. opaca*, fol. radicalibus quinatis cuneiformibus serratis, caulinis sub-oppositis, ramis filiformibus decumbentibus L. *Iacq. ic. rar.*

In montanis, pascuis sabulosis, siccis (Austr. Palat. Siles. Saxon. Bav. Hass. —) Fl. Iul.

* 9. *P. verna*, fol. radicalibus quinatis acutis serratis retusis, caulinis ternatis, caule declinato L.

In pascuis siccis; fl. Apr — Sept.

10. *P. aurea*, fol. radicalibus quinatis serratis acuminatis, caulinis ternatis, caule declinato L. *Fl. dan. t. 114.*

In alpinis (Austr. Siles. Carn. —) in agris (Helmst. CAPPEL.) Fl. Apr. Maj.

11. *P. alba*, fol. quinatis apice connatis serratis, caul. filiformibus procum-

bentibus: receptaculis hirsutis L. *Iacq. austr. 2. t. 115.*

In montosis, sylvaticis (Siles. Austr. Carn. Bav. Hercyn. Thuring. Elbinger. Lips. etc.) Fl. Apr. Maj.

12. *P. clusiana*, fol. quinatis apice conniventi-serratis, caul. multifloris decumbentibus, petalis subrotundis, recept. hirsutis L. *Iacq. austr. 2. t. 116.*

In montosis (Austr. Bav. —) Fl. Aug.

* 13. *P. reptans*, fol. quinatis, caule repente, pedunc. unifloris L. *Fl. lond.*

In agris argillosis; ad vias; fl. Iun. Iul.

Fol. ternatis.

14. *P. norvegica*, fol. ternatis, caule dichotomo, pedunc. axillaribus L. *Fl. dan. t. 171.*

In agris (Boruss. — Siles. KROCK.) Fl. Iun. Iul.

242. **TORMENTILLA** (Tormentille *G. pl.* 866.

Cal. 8 - fidus: laciniis externis minoribus, petala 4, obcordata; semina 8, subrotunda, receptaculo parvo affixa.

* 1. *T. erecta*, caule erectiusculo, fol. sessilibus L. *Fl. dan. t. 598.*

In pascuis, nemorosis; fl. Iun. Iul.

2. *T. reptans*, caule repente, fol. petiolatis L.

In sylvaticis, montosis, pratis (Siles. Holsat. Berol. Tubing. Erford. Francof. ad Viadr. Ger. Ien. —) Fl. Iun. Iul.

243. CEUM (Benediktenkraut) *G. pl.* 867.

Cal. 10 - fidus: laciniis exterioribus minimis; petala 5; semina arista geniculata.

* 1. *C. urbanum*, flor. erectis, fructibus globosis villosis: aristis uncinatis nudis; fol. lyratis L. *Fl. dan. t.* 672. *Fl. lond.*

In umbrosis, ad sepes; fl. Maj. Iun. (Calyx et corolla patentes; receptaculum ovatum subpedunculatum.)

2. *C. intermedium*, *Ehrh. herb.* 106.

Hannoverae —

* 3. *C. rivale*, flor. nutantibus, fructu oblongo: aristis plumosis tortis L. *Fl. dan. t.* 722.

In pratis, nemorosis, humidis; fl. Maj — Iul. (Calyx et petala erectiuscula; petala obcordata; receptaculum pedunculatum oblongum.)

244. DRYAS (Dryas) *G. pl.* 868.

Cal. 6 - 10 - fidus aequalis; petala 5 - 8; recept. depressum; semina stylis longissimis lanigeris instructa.

D. octopetala, octopetala; fol. simplicibus L. *Fl. dan. t.* 31.

In alpinis (Austr. Bav. Carn. etc.) in montosis (Hass. MOENCH.) *Fl. Inl.* (Loco *D. pentap.* Bohem. haud indigenae — Potent. rupestrem esse ponendam monuit in litt. cl. SCHKUHR.)

245. COMARUM (Comarum) *G. pl.* 869.

Cal. 10 - fidus: laciniis alternis inferioribus coloratis; petala 5; receptaculum baccans carnosum maximum persistens.

- * *C. palustre*, L. *Fl. dan.* t. 686.
In pratis, uliginosis; fl. Iun. Iul. (Numerus
laciniarum calycis et petalorum variat.)

Classis XIII.

POLYANDRIA

MONOGYNIA.

246. *CAPPARIS* (Capern) *G. pl.* 876.

Cal. 4 - phyllus coriaceus; petala 4; stamina longa; bacca corticosa, 1 - locularis pedunculata.

C. spinosa, pedunc. unifloris solitariis, stipulis spinosis, fol. annuis; caps. ovalibus L.

In ruderatis (Carn. Carinth. —) Fl. Maj.

247. *ACTAEA* (Christophskraut) *G. pl.* 877.

Cal. 4 - phyllus; cor. 4 - phylla; bacca 1 - locularis; sem. semiorbiculata, gemino ordine incumbentia.

* *A. spicata*, racemo ovato, fructibus baccatis L. *Fl. dan.* t. 498.

In nemorosis, umbrosis; fl. Maj. Iun.

248. *CHELIDONIUM* (Schelkraut) *G. pl.* 880.

Cal. 2 - phyllus; petala 4; siliqua cylindracea; receptaculum lineare inter valvas; suturae instar circumambientis fenestrale, seminibus hilo auctis repletum.

* 1. C.

* 1. *C. majus*, pedunculis umbellatis L.
Bull. herb. t. 61.

In ruderatis, ad sepes; fl. Maj — Iul. (Var. *laciniata*, fol. quernis Fl. dan. 676.)

* 2. *C. Glaucium*, pedunc. unifloris, fol. amplexicaulibus sinuatis, caule grabro L.
Fl. dan. t. 585.

In arenosis (Carn. Austr. Siles? Holsat. Erford. —) Fl. Iun. Iul. (Receptaculum loculentosum pericarpium mentiens MED.)

* 3. *C. corniculatum*, pedunc. unifloris, fol. sessilibus pinnatifidis, caule hispido L.

In pomariis (Siles. Bohem. Austr. —) Fl. Iun. Iul.

249. PAPAVER (Mohn) *G. pl. 881.*

Cal. 2 - phyllus deciduus; cor. 4 - petala; stigma peltatum radiatum crenatum; caps. 1 - semi-multilocularis, sub stigmatis corona foraminibus dehiscens.

* 1. *P. hybridum*, caps. subglobosis torosis hispidis, caule folioso multifloro L.

In agris, inter segetes (Siles. Saxon. Megap. Erford. Barbi, Lips. —) Fl. Iun. Iul.

* 2. *P. Argemone*, caps. clavatis hispidis, caule folioso multifloro L. *Fl. dan. t. 867.*

In agris, arenosis, inter segetes; fl. Iun. Iul. (Petala oblonga subcuneiformia, apice subtilissime serrulata; filamenta sub antheris latiora; caps. 5 - angularis pilis raris flexuosis albidis obsita, semi 5 - locularis; stigma acutiusculum 5 - radiatum.)

* 3. *P. Rhoeas*, caps. glabris globosis, caule piloso multifloro, fol. pinnatifidis incis-
 sis L. *Fl. lond.*

In agris, inter segetes; fl. Iun. Iul. (Caulis pilis patulis obsessus; calyx clausus ovatus obtusus; stigma 10 - 15 - radiatum.)

* 4. *P. dubium*, caps. oblongis glabris, caule multifloro setis adpressis, fol. pinnatifidis incisis L. *Fl. lond.*

In agris, inter segetes; fl. Iun. Iul. (Calyx clausus ovato-oblongus; caps. semi-10-locularis, totidemque radiis stigmatibus.)

5. *P. somniferum*, calyc. capsulisque glabris, fol. amplexicaulibus incisis L. *Bull. herb. t. 57.*

In cultis oleraceis, hinc inde; fl. Iun. Iul.

250. NYMPHAEA (Seerose) *G. pl. 886.*

Cal. 4-5-phyllus; cor. polypetala; germen ovatum magnum; stigma peltatum orbiculatum; fructus multilocularis, polyspermus.

* 1. *N. lutea*, fol. cordatis integerrimis; calyce 5-phyлло majore L. *Fl. dan. t. 603.*

In aquis stagnantibus; fl. Iun. Iul.

* 2. *N. alba*, fol. cordatis integerrimis; calyce 4-fido L. *Fl. dan. t. 602.*

In aquis stagnantibus; fl. cum priori.

251. TILIA (Linde) *G. pl. 894.*

Cal. 5-partitus; cor. 5-petala; antrum globosum corticosum, 4-5-loculare, basi in valvas saepe dehiscens.

* 1. *T. grandifolia*, fol. cordatis acuminatis serratis subhirsutis; fructu 4-loculari. *Ehrh. arb. 8.*

In sylvis, ad pagos; fl. Iun. Iul.

2. *T. parvifolia*, fol. cordatis acuminatis inaequaliter serratis; fructu 5 - loculari. *Ehrh. arb.* 36.

In sylvis, ad pagos; fl. cum priori.

252. *CISTUS* (Cistrose) *G. pl.* 915.

Cal. 5 - phyllus: foliolis 2 minoribus; petala 5 caduca; caps. 1 - 10 - locularis, calyce tecta.

1. *c. Fumana*, suffruticosus exstipulatus procumbens, fol. alternis linearibus margine scabris, pedunculis unifloris *L. Jacq. austr.* 3. t. 252.

In montanis (Siles. Austr. Carn. —) Fl. Jun. Jul. (Caps. 3 - valvis: sepimento valvularum simplici MED.)

2. *c. oelandicus*, suffruticosus exstipulatus procumbens, fol. oppositis oblongis utrinque glabris, petiolis ciliatis; petalis emarginatis *L. Jacq. austr.* 4. t. 399.

In montosis (Siles. Austr. Carn. — Hal. Sax. ROTH.) Fl. Jun. Jul.

3. *c. serpyllifolius*, suffruticosus stipulatus, fol. oblongis; calyc. laevibus *L.*

In montanis, subalpinis (Siles. Austr. Stir. —) Fl. Aug.

* 4. *c. Helianthemum*, suffruticosus procumbens, stipul. lanceolatis, fol. oblongis revolutis subpilosius *L. Fl. dan.* t. 101.

In apricis, collinis, pascuis; fl. Jun. Jul. (Caps. duplicatae: valvulis capsularum duplicatis, sepimento valvularum simplici MED. GAERTN. t. 76. fig. 11.)

DIGYNIA.

253. *PAEONIA* (*Paeonia*) *G. pl.* 920.

Cal. 5 - phyllus, cor. penta - l. pluripetala rosacea; caps. leguminosae, polyspermae.

P. officinalis, foliolis oblongis L. *Bull. herb.* t. 101.

In pratis, nemorosis (Siles? Carinth. Bav? —) *Fl.* Iul. Aug.

TRIGYNIA.

254. *DELPHINIUM* (*Rittersporn*) *G. pl.* 927.

Cal. 0; cor. 5 - 6 - petala; nect. 2 - fidum calcaratum; caps. leguminosae receptaculo communi affixae subternae, introrsum dehiscentes.

Unicapsulares.

* 1. *D. Consolida*, nectariis monophyllis, caule subdiviso L. *Fl. dan.* t. 683.

In agris, arvis; inter segetes; fl. Iun. Iul.

2. *D. Ajacis*, nectariis monophyllis, caule simplici L.

In ruderatis (Siles. Nass. Lips. —) *Fl.* Iun. Iul.

Tricapsulares.

3. *D. elatum*, nectariis diphyllis: label-
lis bifidis apice barbatis; fol. incisis, caule
erecto L. *Mill. ic.* 250.

In montosis (Siles. Austr. Carinth. —) *Fl.*
Iun. Iul.

255. ACONITUM (Sturmhut) G. pl. 928.

Cal. 0; petala 5; supremo galeato; nect. 2, pedunculata recurva; caps. legumino-sae, receptaculo communi affixae 3-5, in-trorsum dehiscentes.

Coroll. caeruleis.

1. A. *Napellus*, fol. laciniis linearibus superne latioribus linea exaratis L. KOELLE, *tab.*

In subalpinis, montosis (Austr. Carinth. Bav? Saxon? Hercyn? Pom? etc.) Iun-Aug. (Sequen-tes (2-4) valde affines species accuratius extri-caveræ rev. a WULFEN et cel. KOELLE.)

2. A. *Tauricum*, caule subsimplici, ra-cemo florum brevi compacto, galea humi-li breviter rostrata antrorsum repando-subfornicata; fol. nitentibus 5-partitis, segmentis oblongis latiusculis laciniatis; laciniis remote inciso-dentatis WULF.

In apricis, subalpinis (Taureri Malnizensis etc.) Fl. Iun - Sept.

3. A. *neomontanum*, (caule elongato, spica racemoso-ramosa, galea humili bre-viter rostrata; fol. palmato-5-partitis, seg-mentis profunde incisis latioribus) KOELLE, *Jacq. austr. t. 381.*

In montosis, subalpinis (Carniol. Carinth. —) Fl. cum priori, cui valde affinis.

4. A. *cernuum*, (caule elongato, spica ter-minali nutante, fol. digitato-5-partitis, segmentis divaricatis) KOELLE.

In montosis, rupestribus; fl. cum priori.

*5. *A. Cammarum*, flor. subpentagynis; (galea maxima) foliorum laciniis cuneiformibus incisus acutis L. *Iacq. austr.* 5. t. 424.

In nemorosis, montosis (Austr. Bohem. Siles. Stir. Carn. Francon. etc.) Fl. Iul. Aug.

6. *A. variegatum*, flor. pentagynis, fol. laciniis semipartitis, superne latioribus L.

In montosis, subalpinis (Siles. Carn. —) Fl. Iul. Aug. (Caule humiliori a prioribus praecipue differt.)

Cor. flavis.

*7. *A. Lycoctonum*, fol. palmatis multifidis villiosis L. *Iacq. austr.* 4. t. 380.

In nemorosis, montosis; fl. Iun. Iul.

PENTAGYNIA.

256. *AQVILEGIA* (Aglei) *G. pl.* 934.

Cal. 0; petala 5; nectaria corniculata 5, inter petala; caps. leguminosae receptaculo communi affixae 5, introrsum dehiscentes.

* *A. vulgaris*, nectariis incurvis L. *Fl. dan.* t. 695.

In nemoribus, collibus, ad sepes; fl. Iun. Iul. (Var. flore albo; nectariis nullis.)

257. *NIGELLA* (Nigelle) *G. pl.* 935.

(Cal. 0; petala 5; nectaria 8 bilabiata 3-fida, intra corollam; caps. 5-loculares orbibus pluribus superne apertae.

1. *N. damascena*, flor. involucro folioso cinctis L. *Curt. bot. Mag.* t. 22.

Inter

Inter segetes, in agris (Siles. Austr. Saxon. Erford. Berol. Lips. —) Fl. Iun. Iul.

2. *N. sativa*, pistillis quinis, capsulis mucronatis subrotundis; fol. subpilosis L.

In agris, cultis (Siles. Saxon. Lips. Ger. Erford. Francof. ad Viadr. —) Fl. aestate.

* 3. *N. arvensis*, pistillis quinis, petalis integris, capsulis turbinatis L.

Inter segetes, in pratis, cultis; fl. Iul. Aug.

POLYGYNIA.

258. ANEMONE (Anemone) G. pl. 948.

Cal. 0; flores saepe involucrati; cor. 5-11 - petala; caps. plures mucronatae aut caudatae.

Hepaticae, flore subcalyculato.

* 1. *A. Hepatica*, fol. trilobis integerrimis L. Curt. bot. Mag. t. 10.

In sylvis, nemoribus, montosis; fl. Apr. Maj. (Involucrum 3 - phyllum paulo a flore remotum, persistens, capsulas demum obvalat.)

Pulsatillae, pedunc. involucrato, semin. caudatis.

2. *A. patens*, pedunc. involucrato, fol. digitatis multifidis L.

In ericetis (Siles. Bav. Gedan. Francof. ad Viadr. —) Fl. Maj. Apr.

* 3. *A. vernalis*, pedunculo involucrato, fol. pinnatis, flore erecto L. Fl. dan. t. 29.

In

In ericetis, sylvaticis, montanis (Siles. Bav. Palat. Ged. Radisb. Berol.—) Fl. Mart—Maj.

*4. *A. Bulsatilla*, pedunc. involucrato, petalis rectis; fol. bipinnatis L. *Fl. dan. t. 153.*

In apricis, aridis, montosis; fl. Maj.

5. *A. pratensis*, pedunc. involucrato, petalis apice reflexis; fol. bipinnatis L. *Fl. dan. t. 611. Krock. 2. t. 15.*

In montosis aridis, pratis (Siles. Austr. Bav. Megap. Saxon. Luneb. Lips. etc.) Fl. Mart—Maj. (Corolla minore mutante.)

6. *A. alpina*, fol. caulinis ternis connatis supradecompositis multifidis; semin. hirsutis caudatis L. *Iacq. austr. t. 85. Krock. 2. t. 16. 17.*

In subalpinis (Austr. Siles. Carn. Stir. Bav. Hercyn.—) locis depressis (Bohem. RICHTER.) Fl. Iul. Aug.

Anemonoideae, semin. ecaudatis.

*7. *A. sylvestris*, pedunc. nudo; semin. subrotundis hirsutis muticis L. *Bull. herb. t. 59.*

In nemorosis, montosis (Siles. Austr. Hercyn. Palat. Bav. Saxon. Lips. etc.) Fl. Maj. Iun.

8. *A. nemorosa*, semin. acutis; foliol. incisis, caule unifloro L. *Fl. lond.*

In nemorosis, dumetis; fl. Apr. Maj.

9. *A. ranunculoides*, semin. acutis; foliol. incisis; petalis subrotundis; caule sub-bifloro L. *Fl. dan. t. 140.*

In pratis, nemorosis, montosis; fl. Apr. Maj.

10. *A.*

10. *A. narcissiflora*, flor. umbellatis; sem. depresso - ovalibus nudis L. *Iacq. austr.* 2. t. 159. *Krock.* 2. t. 19.

In montosis, subalpinis (Siles. Austr. Bav. —) Fl. Iun. Iul.

259. CLEMATIS (Waldrebe) *G. pl.* 950.

Cal. 0; petala 4 - 6; pericarpia caudata.

Scandentes.

* 1. *c. Vitalba*, fol. pinnatis: foliol. cordatis scandentibus L. *Bull. herb.* t. 89.

In sepibus, dumetis; fl. Iul. Aug. (Filamenta apicem versus sensim latiora; recept. globosum.)

2. *c. Flammula*, fol. inferioribus pinnatis laciniatis, summis simplicibus integerrimis lanceolatis L.

In sylvis, sepibus (Ien. Helmst. Tubing. Ger. —) Fl. Iul. Aug.

Erectae.

3. *c. erecta*, fol. pinnatis: foliol. ovato-lanceolatis integerrimis, caule erecto; flor. pentapetalis tetrapetalisque L. *Iacq. austr.* 3. t. 291.

In montanis, ad sepes (Siles. Carn. Austr. Bavar. Saxon. Erford. Ratisb. Lips. Barbi —) Fl. Iun. Iul.

4. *c. integrifolia*, fol. simplicibus ovato-lanceolatis, flor. cernuis L. *Iacq. austr.* 4. t. 363. *Curt. bot. Mag.* t. 65.

Ad sepes hortorum (Siles. Carn. Austr. —) Fl. Iul. Aug.

260. THALICTRUM (Wiesenraude) *G. pl.*
951.

Cal. 0; cor. 4 - petala; caps. plures sulcatae seminiformes, 1 - spermae.

* 1. *T. minus*, fol. (3 - 4.) 6 - partitis, floribus cernuis L. *Fl. dan. t.* 752.

In pascuis, pratis elatioribus (Siles. Austr. Bav. Holsat. Carn. Nass. Palat. Saxon. etc.) *Fl.* Iun. Iul.

2. *T. angustifolium*, foliol. lanceolato-linearibus integerrimis L.

In pratis, locis paludosis (Siles. Austr. Carn. Palat. Saxon. Bav. Helmst. Erford. Lips. —) *Fl.* Iul. Aug.

* 3. *T. flavum*, caule folioso sulcato, panic. multiplici erecta L. *Fl. dan. t.* 939.

In pratis; fl. Iul. Aug. (Var. fol. angustioribus, panicula ramosiore.)

* 4. *T. aquilegifolium*, fruct. pendulis triangularibus rectis; caule tereti L. *Iacq. austr. 4. t.* 318.

In pratis montosis (Siles. Austr. Carn. Bav. Saxon. Tubing. Ger. — Ratisb. DUVAL.) *Fl.* Iun.

261. ADONIS (Adonis) *G. pl.* 952.

Cal. 5 - phyllus; petala 5 - 15; pericarpia plurima angulata, 1 - sperma.

* 1. *A. aestivalis*, flor. 5 - petalis; fructibus ovatis L. *Kerner, oek. Pfl. t.* 55.

In agris, inter segetes (Siles. Bav. Palat. Saxon. Nass. Tubing. Fuld. Lips. Gött. Barbi, —) *Fl.* Maj. Iun.

2. *A. autumnalis*, flor. 8 - petalis, fructibus subcylindricis L. *Fl. lond.*

In agris, inter segetes; fl. Iul — Sept. (Var. *citrina*, Kerner, t. 54.)

* 3. *A. vernalis*, flor. 12 - petalo, fructu ovato L. *Iacq. austr. t. 44.*

In collinis, inter segetes (Siles. Austr. Boruss. Bohem. Carn. Saxon. Palat. Erford. Helmst. —) Fl. Apr. Maj.

262. RANUNCULUS (Hahnenfuss) *G. pl.*
953.

Cal. 5 - phyllus deciduus: petala 5: unque nectarifero; sem. plurima integumento coriaceo vestita.

Foliis simplicibus.

* 1. *R. Flammula*, fol. ovato - lanceolatis petiolatis, caule declinato L. *Fl. dan. t. 572.*

In pascuis, pratis humidis; fl. Maj — Aug. (Var. fol. dentatis.)

2. *R. reptans*, fol. linearibus, caule repente L. *Fl. lond.*

Ad ripas lacuum, locis humidis (Siles. Boruss. Holsat. Oldenb. Brem. —) Fl. Iun. Iul.

* 3. *R. Lingua*, fol. lanceolatis, caule erecto L. *Fl. dan. t. 754.*

Locis aquosis, in fossis; fl. Iun. Iul.

4. *R. gramineus*, fol. lanceolato - linearibus indivisis, caule erecto laevissimo paucifloro L. *Bull. herb. t. 123.*

In pascuis humidis, montanis (Siles. Krock.) Fl. Iul.

* 5. R. *Ficaria*, fol. cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro L. *Bull. herb. t.* 43.

Locis umbrosis; fl. Mart — Maj. (Cal. 3 - phyllus; petala 8 - 9, oblonga; nectarium squamula margine subtrifida. *Ficaria ranunculoides* ROTH.)

† 6. R. *Thora*, fol. reniformibus subtrilobis crenatis: caulino sessili; flor. lanceolatis, caule sub - bifloro L. *Iacq. austr.* 5. t. 442.

In alpinis (Austr. Siles. Carn. —) in cultis (Pom. Gryph. —) Fl. April.

Fol. dissectis et divisis.

* 7. R. *auricomus*, fol. radicalibus reniformibus crenatis incisis, caulinis digitatis linearibus, caule multifloro L. *Fl. dan.* t. 665.

In pomariis, pratis; fl. Apr. Maj. (Flores vernaes apetalis, adultiores 3 - 5, instructi petalis: squamula nectarifera inferne angustata, superius truncata.

8. R. *cassubicus*, fol. radicalibus subrotundo - cordatis crenatis, caulinis digitatis dentatis, caule multifloro L.

In umbrosis, sylvis (Siles. Boruss. Ged. —) Fl. Maj. (Var. prioris HAGEN, *ranunc. p.* 19.)

* 9. R. *sceleratus*, fol. inferioribus palmatis: summis digitatis; fruct. oblongis L. *Fl. dan. t.* 570. *Fl. lond.*

In paludosis, fossis; fl. Iun. Iul.

10. R. *Philonotis*, radice fasciculata, herba pilosa, caule erecto ramoso, fol. ternatis,

natis, foliol. trilobis: lobis crenato - incis-
sis apicibus puncto albo terminatis; pe-
dunc. sulcatis; calyce reflexo; fructu glo-
boso: sem. compressis acuminatis EHRH.
herb. 116. *Fl. lond.*

In pratis humidis (Siles. Boruss. Austr. Han-
nov. —) Fl. Iun. Iul. (Ran. Sardous, CRANZ.
HAGEN. R. hirsutus, radice fibrosa annua,
caule hirsuto; calyc. papilloso. hispidis acumi-
natis, demum reflexis CURT.)

* 11. R. *aconitifolius*, fol. omnibus quina-
tis lanceolatis inciso - serratis L.

In sylvaticis montosis, subalpinis (Siles. Austr.
Carn. Bav. Palat. Hercyn. etc.) Fl. Iun — Aug.

12. R. *platanifolius*, fol. palmatis laevi-
bus incisiss, caule erecto, bracteis lineari-
bus L. *Fl. dan. t.* 111.

In sylvis (Hass. Bav. Bohem. Ger.) —

13. R. *illyricus*, fol. ternatis integerri-
mis lanceolatis L. *Iacq. austr. 2. t.* 222.

In montanis (Siles. Austr. Barbi —) Fl. Iun.
Iul.

14. R. *nivalis*, calyc. hirsuto; caule uni-
floro, fol. radicalibus palmatis: caulinis
multipartitis sessilibus L. *Iacq. austr. 2. t.*
325. 326.

In alpibus (Austr. Carn. —) in montosis (Bav.
Tubing. —) Fl. Iun.

15. R. *bulbosus*, calyc. retroflexis, pe-
dunc. sulcatis, caule erecto multifloro, fol.
compositis L. *Bull. herb. t.* 22.

In pratis, pascuis; fl. Iun. Iul. (Squam. nec-
tarii plana obcordata.)

* 16. *R. repens*, calyc. patulis, pedunc. sulcatis, stolonibus repentibus, fol. compositis L. *Fl. lond.*

In cultis, agris; fl. Maj. Iun. (Squam. nect. angustior, altero latere excavata leniter, altera convexa.)

17. *R. polyanthemos*, calyc. patulis, pedunc. sulcatis, caule erecto, fol. multipartitis L.

In montosis, pratis; fl. Maj. Iun.

* 18. *R. acris*, calyc. patulis, pedunc. teretibus, fol. tripartito-multifidis: summis linearibus L. *Fl. lond.*

In pratis, pascuis; fl. Maj. Iun.

19. *R. lanuginosus*, calyc. patulis, pedunc. teretibus, caule petiolisque hirsutis, fol. trifidis lobatis crenatis holosericeis L. *Fl. dan. t. 397.*

In sylvis, nemorosis, montosis; fl. Iun-Aug.

† 20. *R. chaerophyllus*, calyc. retroflexis, pedunc. sulcatis, caule erecto unifloro, fol. compositis linearibus multifidis L.

In montosis (Tubing. GMEL.) —

* 21. *R. arvensis*, semin. aculeatis, fol. superioribus decompositis linearibus L. *Fl. dan. t. 219.*

In cultis, agris; fl. Iun. (Squam. nect. obcordata emarginata; sem. 6-8, aculeata, in orbem posita.)

22. *R. muricatus*, sem. aculeatis, fol. simplicibus lobatis obtusis glabris, caule diffuso L.

Locis uliginosis, in fossis (Bav. SCHRANK —)
Fl. Maj. (Sem. plura ad duodecim ovato lan-
ceolata rostrata compressa, margine calloso du-
ro albicante glabro cincta, in medio disco sub-
ferrugineo aculeolis brevibus horizontaliter pa-
tentibus utrinque echinata GAERTN. t. 74. fig. 4.)

23. *R. falcatus*, fol. filiformi - ramosis,
scapo nudo unifloro; sem. falcatis L. *Iacq.*
austr. t. 48.

Inter segetes (Austr. Francof. ad Viadr. —)
Fl. aestate.

*24. *R. hederaceus*, fol. subrotundis tri-
lobis integerrimis, caule repente L. *Fl.*
lond.

Locis aquosis, inundatis (Bav. Nass. Palat.
Holsat. Brem. Oldenb. etc.) Fl. Maj — Iul.

*25. *R. heterophyllus*, fol. submersis ca-
pillaceis, emersis reniformi - palmatis
LEYS.

In aquis, paludosis, fossis, piscinis; fl. Iun.
Iul.

*26. *R. aquatilis*, fol. omnibus capilla-
ceis: laciniis divergentibus LEYS.

In paludosis, fossis; fl. Iun. Iul. (Var. fol.
circumscriptione rotundis: *Ran. divarica-*
tus SCHRANK.)

*27. *R. fluviatilis*, fol. omnibus capilla-
ceis: laciniis parallelis longissimis LEYS.
Fl. dan. t. 376.

In fluviiis minus profundis; fl. Iul. Aug. (*Ran.*
peucedanifolius, SCHRANK.)

263. *TROLLIUS* (Trollblume) *G. pl.* 954.

Cal. 0; cor. polypetala; nectaria linearia numero petalorum; caps. siliquosae plurimae, introrsum dehiscentes 4 - spermae.

1. *T. europaeus*, cor. conniventibus, nectariis longitudine staminum *L. Fl. dan. t.* 133.

In pratis subhumidis (Siles. Bav. Austr. Carn. Saxon. Megap. Nass. Hercyn. Lips. etc.) *Fl.* Maj — Iul.

† 2. *T. asiaticus*, cor. patula, nectariis stamine longioribus *L.*

In subalpinis (Siles. SCHWENKE. KROCK.) *Fl.* Iul.

264. *ISOPYRUM* (Doltokke) *G. pl.* 955.

Cal. 0; cor. 5 - petala; nectaria tubulata 3 - fida; caps. plures leguminosae, longitudinaliter apertae.

1. *thalictroides*, stipulis ovatis; petalis obtusis *L. Jacq. austr. 2. t.* 105.

Locis umbrosis (Austr. Carn. Siles. —) *Fl.* Apr. Maj.

265. *HELLEBORUS* (Nieswurz) *G. pl.* 956.

Cal. 5 - phyllus, interdum coloratus; cor. 0; nectaria tubulosa bilabiata; caps. leguminosae rostratae polyspermae.

† 1. *H. hyemalis*, flore folio insidente *L. Jacq. austr. 3. t.* 202. *Curt. bot. Mag. t.* 3.

In hortis, alpinis (Siles. Austr. —) *Fl.* Ian. Febr.

2. *H. niger*, scapo subbifloro subnudo, fol. pedatis L. Schmid. icon. t. 6. Curt. bot. Mag. t. 8.

In umbrosis, hortis (Siles. Bav. Austr. Carn. Fuld. —) Fl. Dec — Mart. (Caps. 5, ovales, ad basin coalitae MED.)

3. *H. viridis*, caule bifido, ramis foliosis bifloris, fol. digitatis L. Jacq. austr. 2. t. 106.

Locis umbrosis, graminosis, montosis (Siles. Bav. Austr. Carn. Nass. Isenac. —) Fl. Maj. Iun.

4. *H. foetidus*, caule multifloro folioso, fol. pedatis L. Bull. herb. t. 71.

In montosis, nemorosis (Palat. Nass. Tubing. Fuld. Francof. ad Viadr. —) Fl. Apr. Maj.

266. *CALTHA* (Dotterblume) G. pl. 957.

Cal. 0; petala 5; nectaria 0; caps. plures leguminosae stellatim patentibus, polyspermae.

* *C. palustris*, L. Fl. lond.

In pratis humidis, uliginosis; fl. Maj. Iun.

Classis XIV.

DIDYNAMIA

GYMNOSPERMIA.

267. *AJUGA* (Günsel) G. pl. 959.

Cor. labium superius minimum emarginatum; stamina longiora.

* 1. *A. pyramidalis*, tetragono-pyramidalis villosa, fol. radicalibus maximis L. Bull. herb. t. 361.

In sylvaticis, nemorosis, siccis (Siles. Bavar. Saxon. Nassov. Megap. Lips. Gött. Fuld. Berol. Tubing. Helmstad. etc.) Fl. Maj — Iul.

* 2. *A. alpina*, caule simplici, fol. caulinis radicalia aequantibus L.

In montosis siccis (Siles. Nassov. Tubing. —) Fl. Maj. Iun.

* 3. *A. genevensis*, fol. tomentosis lineatis; calyc. hirsutis L.

In collinis, nemorosis (Siles. Bav. Palat. Saxon. Nassov. Hannov. Gött. Francof. Barbi —) Fl. Maj. Iun.

* 4. *A. reptans*, glabra, stolonibus reptantibus L. *Bull. t.* 345.

In pratis, pascuis, dumetis; fl. Apr — Iun. (Var. flor. albis, rubellis.)

268. TEUCRIUM (Gamander) *G. pl.* 960.

Cal. basi gibbus; cor. labium superius (o) ultra basin 2 - partitum, divaricatum ubi stamina.

* 1. *T. Botrys*, fol. multifidis, verticillis dimidiatis SCHREB.

In arvis, collinis; fl. Iul. Aug.

* 2. *T. Chamaepitys*, fol. trifidis linearibus integerrimis, flor. sessilibus lateralibus solitariis, caule diffuso L. *Fl. dan. t.* 735.

In vineis, montanis, arenosis) fl. Iul. Aug. (Cal. labium superius 3 - fidum: intermedio dente minore. *Ajuga Chamaepitys* SCHREB.)

* 3. *T.*

*3. *T. Scorodonia*, fol. cordatis serratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto L. *Bull. t.* 301.

In montosis, sylvaticis, arenosis; fl. Iul. Aug. (Cal. lacinia suprema latissima, ex rotunda basi in apicem producta. Var. racemis et floribus minoribus.)

*4. *T. Scordium*, fol. oblongis sessilibus dentato - serratis, flor. geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuso L. *Bull. t.* 205.

In paludosis, humidis (Siles. Carn. Bav. Palat. Saxon. Hannov. Megap. Francof. Gött. Berol. Ratisb. Helmstad. etc.) Fl. Iul. Aug.

5. *T. Chamaedrys*, fol. cuneiformi - ovatis incisiss crenatis petiolatis, flor. ternis, caul. procumbentibus subpilosus L.

In montosis, vineis (Siles. Bavar. Carn. Bohem. Palat. Saxon. Nassov. Dantisc. Helmstad. Ratisb. Fuld. Nordhus. etc.) Fl. Iun — Aug. (Var. magnitudine.)

6. *T. montanum*, corymbo terminali, fol. lanceolatis integerrimis, subtus tomentosis L. *Hoppe, ect.* 58.

In montosis, apricis (Siles. Austr. Carn. Bavar. Saxon. Ratisb. Nordhus. Tubing. — Norimb. PANZER.) Fl. Maj — Iul. (Var. fol. angustioribus, latioribus.)

7. *T. supinum*, corymbo terminali, fol. linearibus, margine revolutis L. *Jacq. austr.* 5. *t.* 417.

In montosis (Austr. Bavar. —) Fl. Aug. Sept.

269. SATUREJA (Saturei) *G. pl.* 961.

Coroll. lacinae subaequales; stam. distantia.

† s. *hortensis*, pedunc. bifloris *L.*

Locis cultis et incultis (Siles. Nassov. —) *Fl.* Jul. Aug.

270. HYSSOPUS (Ysop) *G. pl.* 963.

Cor. labium superius emarginatum, inferioris labii lacinia intermedia crenata obcordata; stam. distantia recta.

H. officinalis, spicis secundis, fol. lanceolatis *L. Bull. t.* 322.

In subalpinis (Austriae) ruderatis, muris (Saxon. Helmstad. Barbi — Schwalenberg. *EHRH.*) *Fl.* Jul. (Var. flore albo, rubro, caeruleo.)

271. NEPETA (Katzenmünze) *G. pl.* 964.

Cor. labium inferius lacinia intermedia crenata, faux margine reflexo; stam. approximata.

* 1. *N. Cataria*, flor. spicatis: verticillis subpedicellatis, fol. petiolatis cordatis dentato-serratis *L. Bull. t.* 287.

In ruderatis, ad sepes; fl. Iun — Aug.

† 2. *N. pannonica*, flor. paniculatis, fol. cordatis petiolatis obsolete crenatis *L. Jacq. austr. t.* 24.

In montosis (Austr. Siles. *KROCK.*) *Fl.* Iun. Jul.

† 3. *N. nuda*, flor. racemis verticillatis nudis, fol. cordato-oblongis sessilibus serratis L. *Iacq. austr.* 2. t. 129.

In montosis, ad sepes (Austr. Siles. KNOCK.) Fl. Iun. Iul.

272. *SIDERITIS* (Gliederkraut). *G. pl.* 966.

Stamina intra tubum corollae; stigma infertus brevius, vaginans superius.

s. montana, herbacea ebracteata; calycibus corolla majoribus spinosis: labio superiore trifido L. *Iacq. austr.* 5. t. 454.

In montosis, nemorosis (Siles. Austr. Bavar. Monach. Hal. Saxon. —) Fl. Iun — Sept.

273. *MENTHA* (Münze) *G. pl.* 967.

Cor. 4-fida subaequalis; filam. erecta distantia.

* 1. *M. sylvestris*, spicis ovato-oblongis, fol. oblongis serratis tomentosis sessilibus; stam. corolla longioribus L. *Fl. dan.* t. 484.

Ad fossas, ripas, locis humidis; fl. Iul. Aug.

2. *M. gratissima*, spicis cylindricis, fol. ovalibus acuminatis subtus hirsuto-tomentosis serratis sessilibus; stam. corollam aequantibus ROTH.)

Ad littora maris (Holsat. Oldenb. Brem.) ad fossas, locis humidis (Pyrmont. Calenb. Dri-burg. EHRH.) Fl. Iun. Iul.

3. *M. viridis*, spicis oblongis, fol. lanceolatis nudis serratis sessilibus; stam. corolla longioribus L.

In sylvaticis, locis humidis (Siles. Austr. Saxon. Nassov. Barbi, Lips. Nordhus. Hannoviae —) Fl. Iul. Aug.

*4. *M. rotundifolia*, spicis oblongis, fol. subrotundis rugosis crenatis sessilibus L.

Ad fossas, aquas (Siles. Bavar. Palat. Saxon. Lips. Dantisc. —) Fl. Iul. Aug.

5. *M. crispa*, floribus capitatis, fol. cordatis dentatis undulatis sessilibus; stam. corollam aequantibus L.

Ad aquas (Hercyn. prope Rübeland, Andreasberg, EHRH. Nordhus. GESEN.) Fl. Iun. (Stam. corolla longiora.)

6. *M. hirsuta*, flor. capitatis, fol. ovatis serratis subsessilibus pubescentibus; stam. corolla longioribus L.

Ad ripas fluviorum, locis humidis (Siles. Nassov. Hannov. —) Fl. Aug. Sept.

*7. *M. aquatica*, flor. capitatis, fol. ovatis serratis petiolatis; stam. corolla longioribus L. Fl. dan. t. 673.

Locis aquosis; fl. Iul. Aug. (Var. stam. corolla brevioribus.)

8. *M. sativa*, flor. verticillatis, fol. ovatis acutiusculis serratis; stam. corolla longioribus Fl. dan. t. 794.

In pratis subhumidis (Saxon. Bavar. Brem. Lips. Ratisb. Tubing. —) Fl. Iul — Sept.

9. *M. gentilis*, flor. verticillatis, fol. ovatis acutis serratis; stam. corolla brevioribus L. Fl. dan. t. 736.

In fossis, locis paludosis (Siles. Bavar. Austr. Nassov. Holsat. Saxon. Lips. Francof. Nordhus. Barbi, Ratisb. —) Fl. Aug. Sept.

* 10. *M. arvensis*, flor. verticillatis, fol. ovatis acutis serratis; stam. corollam aequantibus L. *Fl. dan.* t. 512.

In agris, inter segetes; fl. Jul. Aug.

† 11. *M. verticillata*, flor. verticillatis, fol. ovato-lanceolatis serratis hirsutis, stam. corolla longioribus, caule erecto REICH.

Ad fossas (Austr. Siles. Bavar. Francof. Isenac. —) Fl. Jul — Sept.

12. *M. Pulegium*, flor. verticillatis, fol. ovatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus; stam. corolla longioribus L.

Locis humidis (Austr. Carn. Siles. Saxon. Oldenb. Brem. Francof. Ratisb. Lips. Helmstad. Barbi etc.) Fl. Iun — Aug.

† 13. *M. exigua*, flor. verticillatis, fol. lanceolato-ovatis glabris acutis integerimis L. *Smith, plant. ic.* t. 38.

Locis inundatis (Siles. KROCK.) Fl. aestate.

274. GLECHOMA (Gundelrebe) *G. pl.* 970.

Antherarum singulum par connivens in formam crucis.

G. hederacea, fol. reniformibus crenatis L. *Bull.* t. 241.

In pomariis, dumetis vulgaris; fl. Apr — Iun. (Var. magnitudine, Vaill. t. 6. fig. 4. 6.)

275. LAMIUM (Bienensaug) *G. pl.* 971.

Coroll. labium superius integrum fornicatum, inferius brevius reflexum, fauce utrinque dente reflexo notata.

1. *L. orvala*, fol. cordatis inaequaliter arguteque serratis; coroll. fauce inflata; caul. coloratis L. *Mich. t.* 17.

In sylvis, dumetis montosis (Carn. Siles. KROCK.) Fl. aestate.

2. *L. laevigatum*, fol. cordatis rugosis, caule laevi; cal. glabris longitudine tubi corollae L.

Ad sepes, in nemorosis (Siles. Austr. Palat. Holsat. Berol. —) Fl. Maj. Iun.

+ 3. *L. garganicum*, fol. cordatis pubescentibus; corollis fauce inflata, tubo recto dente utrinque gemino L.

In montosis, ad castrum Willschnitz (Siles. KROCK.) Fl. aestate.

* 4. *L. maculatum*, fol. cordatis acuminatis, verticillis 10 - floris L.

Ad sepes, in pomariis (Siles. Bavar. Nassov. Oldenb. Hannov. Lips. Francof. Gött. Barbi, etc.) Fl. Maj — Iul.

* 5. *L. album*, fol. cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis 20 - floris L. *Bull. t.* 213. *Fl. lond.*

* 6. *L. purpureum*, fol. cordatis obtusis petiolatis L. *Fl. dan. t.* 532.

Locis cultis, incultis, ad sepes; fl. Maj — Aug.

* 7. *L. Galeobdolon*, fol. cordatis dentatis petiolatis, verticillis 6 - floris, involuero 4 - phyllo. *Fl. lond.* (*Galeobd. Galeopsis.*)

In nemorosis, umbrosis; fl. Iul. Aug. (*Galeopsis Galeobdolon* L. *Pollichia Galeobdolon* SCHRANK. WILD. ROTH. BAUMG.)

* 8. *L.*

* 8. *L. amplexicaule*, fol. floralibus sessilibus amplexicaulibus obtusis L. *Fl. dan.* t. 752. *Fl. lond.*

In agris, ruderatis; fl. Maj. Iun. (Pollich. amplexic. Var. coroll. minoribus rarius explicatis.)

276. *GALEOPSIS* (Hohlzahn) *G. pl.* 972.

Coroll. labium superius subcrenatum fornicatum, lab. inferius trifidum, faux utrinque dente obtusiusculo concavo aucta.

* 1. *G. Ladanum*, internodiis caulinis aequalibus, verticillis omnibus remotis; calyc. dentibus aristatis divergentibus longioribus.

In agris, arvis; fl. Iul. Aug.

2. *G. grandiflora*, verticillis omnibus remotis; calyc. tubulosis hirsutissimis, dentibus lanceolato-acuminatis multo brevioribus rectis ROTH.

In agris, inter segetes; fl. Iul — Oct.

* 3. *G. Tetrahit*, internodiis caulinis superne incrassatis, verticillis summis subcontiguis; calyc. subpungentibus (setaceis longissimis) L. *Fl. dan.* t. 929.

In arvis, agris; fl. Iun — Sept.

4. *G. cannabina*, verticillis summis subcontiguis; calyc. tubulosis: dentibus paulo brevioribus linearibus inaequalibus: tribus majoribus ROTH.

In agris, inter segetes; fl. Iul — Sept.

277. *BETONICA* (Betonie) *G. pl.* 973.

Cal. aristatus; coroll. labium superius adscendens planiusculum, tubus cylindricus incurvus.

* 1. *B. officinalis*, spica interrupta; corollae labii lacinia intermedia emarginata *L. Bull. t.* 41.

In sylvaticis, nemorosis, pratis; fl. Iun—Aug.

2. *B. alopecuros*, spica basi foliosa; coroll. galea bifida *L. Jacq. austr. t.* 78.

In montosis elatioribus (Siles. Austr. Carn.—) Fl. Iul. Aug.

278. *STACHYS* (Stachys) *G. pl.* 974.

Coroll. labium superius fornicatum, labium inferius lateribus reflexum: lacinia intermedia majore emarginata; stam. decorata versus latera reflexa.

* 1. *s. sylvatica*, verticillis sexfloris, fol. cordatis petiolatis *L. Fl. lond.*

In nemorosis, umbrosis; fl. Iun — Aug.

* 2. *s. palustris*, verticillis subsexfloris, fol. lineari-lanceolatis semiamplexicaulibus sessilibus *L. Fl. lond.*

3. *s. alpina*, verticillis multifloris, foliorum serraturis apice cartilagineis; corollis labio plano *L.*

In montosis (Siles. Carn. Bav. Nassov. Tubing. Gött. —) Fl. Iul. Aug.

* 4. *s. germanica*, verticillis multifloris, foliorum serraturis imbricatis, caule lanato *L. Jacq. austr. 4. t.* 310.

In montosis, saxosis; fl. Iul. Aug.

* 5. *s.*

* 5. *s. recta*, verticillis subspicatis, fol. cordato-ellipticis, crenatis scabris, caulibus adscendentibus L. *Iacq. austr.* 4. t. 359.

In montosis, saxosis (Siles. Bav. Austr. Palat. Saxon. Megap. Lips. Hannov. Ratisb. Berol. etc.) Fl. Maj - Aug.

6. *s. annua*, verticillis sexfloris, fol. ovato-lanceolatis trinerviis laevibus petiolatis, caule erecto L. *Iacq. austr.* 4. t. 360.

In agris, arvis; fl. Jun. Jul.

7. *s. arvensis*, verticillis sexfloris, fol. obtusis nudiusculis; corollis longitudine calycis; caule debili L. *Fl. dan.* t. 587.

279. *BALLOTA* (Ballote) *G. pl.* 975.

Cal. hypocrateriformis, 5-dentatus, rostriatus; coroll. labium superius crenatum concavum.

* 1. *B. nigra*, fol. cordatis indivisis serratis; calyc. acuminatis L. *Bull.* t. 397.

In ruderatis, ad pagos; fl. Jun - Aug.

2. *B. alba*, fol. cordatis indivisis serratis; calyc. subtruncatis L.

In ruderatis, ad pagos (Siles. Berol. Barbi —) Fl. Jul. Aug.

280. *MARRUBIUM* (Andorn) *G. pl.* 976.

Cal. hypocrateriformis rigidus, 10-striatus; coroll. labium superius bifidum lineare rectum.

Calyc. 5 - dentatis.

1. *M. peregrinum*, fol. ovato-lanceolatis serratis; calyc. denticulatis setaceis L. *Iacq. austr.* 2. t. 160.

In ruderatis, montanis (Siles. Austr. —) Fl. aestate.

2. *M. creticum*, caule patulo ramosissimo, fol. lanceolatis utrinque attenuatis, versus apicem serratis venis exaratis; calyc. dentibus linearibus tomentosus ROTH.

In ruderatis (prope Rulsdorf, Erdeborn in Mansfeldia ROTH.) —

3. *M. supinum*, dentibus calycinis setaceis rectis villosis L.

In montosis (Carn. — ad Erdeborn in Mansfeldia ROTH; ad Rosleben LEYS.) Fl. Iul. Aug.

Calyc. 10 - dentatis.

*4. *M. vulgare*, dentibus calycinis setaceis uncinatis L. *Bull.* t. 165.

In ruderatis, ad vias, sepes; fl. Iul. Aug.

281. LEONURUS (Wolfstrapp) *G. pl.* 977.

Cal. 5 - gonus; coroll. labium superius concavum integrum; antherae punctis nitidis adpersae.

*1. *L. Cardiaca*, fol. caulinis lanceolatis trilobis L. *Bull.* t. 278.

In ruderatis, ad sepes; fl. Iul. Aug.

* 2. *L. Marrubiastrum*, fol. ovatis lanceo-
latisque serratis, calyc. sessilibus spinosis
L. Jacq. austr. 5. t. 405.

In ruderatis, ad sepes (Siles. Austr. Carn. Sa-
xon. Hannov. Barbi, Lips. —) Fl. Iul. Aug.

282. CLINOPODIUM (Weichborste) *G.*
pl. 980.

Involucrum multisetum verticillo sub-
jectum.

* *c. vulgare*, capitulis subrotundis hispi-
dis, bracteis setaceis *L. Fl. dan. t. 930.*

In nemorosis, ad sepes; fl. Iul. Aug.

283. ORICANUM (Dosten) *G. pl. 981.*

Strobilus tetragonus spicatus, calyces col-
ligens.

* *o. vulgare*, spicis subrotundis panicula-
tis conglomeratis, bracteis calyce longiori-
bus ovatis *L. Bull. t. 193.*

In nemorosis, montosis, ad sepes; fl. Iul. Aug.

284. THYMUS (Thimian) *G. pl. 982.*

Calycis bilabiati faux villis clausa.

* 1. *t. Serpyllum*, flor. capitatis, caulibus
repentibus, fol. planis obtusis basi ciliatis
L. Fl. lond.

In aridis apricis, nemorosis, collinis: fl. Iun.
— Sept. (Var. vulgaris, ciliata, major latifolia,
citrina, erecta, hirsuta; staminibus corolla vel
longioribus vel brevioribus.)

* 2. *t. Acinos*, flor. verticillatis, pedun-
culis unifloris, caulibus erectis subramo-
sis, fol. acutis serratis *L. Bull. t. 318.*

In collibus siccis, glareosis; fl. Iul. Aug.

3. *T. alpinus*, verticillis 6 - floris, fol. obtusiusculis concavis subserratis L. *Iacq. austr.* 1. t. 97.

In alpinis, etiam montosis (Siles. Austr. Ba-
var. Carn. —) Fl. Iun. Iul.

285. MELISSA (Melisse) *G. pl.* 983.

Cal. aridus supra planiusculus: labio superiore subfastigiato; coroll. labium superius subfornicatum, 2 - fidum, lab. inf. lobo medio cordato.

† 1. *M. officinalis*, racemis axillaribus verticillatis, pedicellis simplicibus L.

In sylvaticis, montosis (Siles. Carn. prope Altona, Francof. —) Fl. Iul. Aug.

2. *M. grandiflora*, pedunc. axillaribus dichotomis longitudine florum L.

In sylvis montanis, rupestribus (Carn. Carinth. WULF.) Fl. Iul. Aug.

3. *M. Calamintha*, pedunc. axillaribus dichotomis longitudine foliorum L.

In montosis (Siles. Austr. Carn. — Fuld. LIEB-LEIN.) Fl. Iul. Aug.

4. *M. Nepeta*, pedunc. axillaribus dichotomis folio longioribus, caule adscendente hirsuto L. *Hoppe, ect.* 397.

In montosis, in aggeribus glareosis (Siles. Austr. — Ratisbon. HOPPE. Stuttgart. KERNER.) Fl. Iul. Aug.

286. DRACOCEPHALUM (Drachenkopf)

G. pl. 984.

Cor. faux inflata: lab. superius concavum.

† D.

† *D. Ruyschiana*, flor. spicatis, fol. bracteisque lanceolatis indivisis muticis L. *Fl. dan.* t. 121.

Prope Halam Saxon. (LEYS.) Fl. Iun.

287. MELITTIS (Immenblatt) G. pl. 985.

Cal. tubo corollae amplior; coroll. labium superius planum, labium inferius crenatum; antherae cruciatae.

M. Melissophyllum, L. *Iacq. austr.* t. 26.

In montosis, sylvaticis (Siles. Austr. Carn. Bavar. Helmstad. Danisc. Ien. Nordhus. — Woltenb. Ratisb. HORPE.) Fl. Iun. Iul.

288. SCUTELLARIA (Helmkraut) G. pl. 989.

Calyx ore integro, post florescentiam clauso operculato.

* 1. *s. galericulata*, fol. cordato-lanceolatis crenatis, flor. axillaribus L. *Bull.* t. 275.

Ad fossas, rivulos, locis humidis, nemorosis; fl. Iul. Aug.

2. *s. hastifolia*, fol. integerrimis: inferioribus hastatis, superioribus sagittatis L.

In pascuis, aquosis, paludosis (Siles. Carn. Austr. Brem. Saxon. Barbi, Lips. —) Fl. Iul. Aug.

3. *s. minor*, fol. cordato-ovatis, subintegerrimis, flor. axillaribus L. *Fl. lond.*

In paludosis, nemorosis (Duc. Brem. Oldenb. prope Francof. —) Fl. Iul. Aug.

289. PRUNELLA (Brunelle) *G. pl.* 990.

Filamenta biforca; altero apice antheri-
fera; stigma 2 - fidum.

* 1. *P. vulgaris*, fol. omnibus ovato - ob-
longis serratis petiolatis L. *Fl. lond.*

In pratis, pascuis; fl. Iul. Aug.

* 2. *P. grandiflora*, fol. omnibus ovato -
oblongis subserratis petiolatis, calyc. labio
sup. profunde trifido. *Iacq. austr.* 4. t. 377.

In collibus, rupestribus, pratis montanis; fl.
Iul. Aug.

3. *P. laciniata*, fol. ovato - oblongis pe-
tiolatis, supremis 4 lanceolatis dentatis L.
Iacq. austr. 4. t. 378.

In pratis, pomariis, hinc inde; fl. Iun. Iul.
(Var. colore albo, ut priores.)

ANGIOSPERMIA.

290. BARTSIA (Bartsie) *G. pl.* 996.

Cal. 2 - lobus emarginatus coloratus; co-
roll. minus ipso calyce colorata: labio su-
periore longiore; caps. 2 - locularis.

B. alpina, fol. oppositis cordatis obtusa
serratis L. *Fl. dan.* t. 43.

In subalpinis, montosis, etiam depressis uli-
ginosis (Carn. Austr. Siles. Bavar. Monach. —)
Fl. Maj — Aug.

291. RHINANTHUS (Hahnenkamm) *G.*
pl. 997.

Cal. 4 - fidus ventricosus; cor. lab. supe-
rius compressum; caps. 2 - locularis com-
pressa obtusa.

*1. R. *Crista Galli*, coroll. labio superiore compresso brevior (calyc. glabris) L. *Bull. t. 125.*

In pratis humidis, inter segetes; fl. Maj - Iul. (R. minor, Ehrh. herb. 46. R. major, Ehrh. herb. 56, corollis et bracteis calyce majoribus. Fl. lond.

2. R. *Alectorolophus*, coroll. labio superiore compresso brevior, calycibus villosis POLL.

In pratis humidioribus; fl. cum priori.

292. EUPHRASIA (Augentrost) G. pl. 998.

Cal. cylindricus; antherae apice spinosae; caps. ovato-oblonga, 2-locularis.

*1. E. *officinalis*, fol. ovatis lineatis argute dentatis L. *Bull. t. 233.*

In pratis, pascuis; fl. Iul. Aug. (Var. major.)

*2. E. *Odontites*, fol. linearibus omnibus serratis L. *Fl. dan. 655.*

In pascuis, pratis humidis, inter segetes; fl. Iul. Aug. (Anther. altero lobo in priori spinoso, in hac omnibus lobis spinula terminalis, basi s. latiori parte setis barbata.)

3. E. *rubra*, fol. cordato-ovatis, acute serratis; calyce obtuse dentato, caule magis ramoso BAUMG.

In locis siccioribus, elatioribus; fl. Iul. Aug. (Accedit ad priorem.)

4. E. *lutea*, fol. linearibus serratis: superioribus integerrimis L. *Iacq. austr. 4. t. 398.*

In montosis asperis (Austr. Carn. Siles. Bay. Palat. Saxon. Francof. Lips. Ratisb. Wolfenb. —) Fl. Iul. Aug.

293. MELAMPYRUM (Kuhweizen) *G. pl.*

999.

Coroll. personata: labio superiore compresso, margine replicato; caps. obliqua, 2-locularis compressa; sem. 2, vel solitaria, basi aucta.

* 1. *M. cristatum*, spicis 4 - angularibus, bracteis cordatis compactis denticulatis imbricatis L.

In pratis siccis, ad margines sylvarum; fl. Jun - Aug.

* 2. *M. arvense*, spicis conicis laxis, bracteis dentato - setaceis coloratis L. *Hoppe*, *ect.* 105.

In agris, inter segetes; fl. Jun. Jul.

* 3. *M. nemorosum*, flor. secundis lateralibus, bracteis dentatis: summis coloratis sterilibus, calyc. lanatis L. *Fl. dan.* 305.

In nemorosis (Siles. Carn. Bav. Holsat. Saxon. Megap. Hannov. Lips. Helmstad. Fuld. Ratisb. etc.) fl. Jul. Aug.

4. *M. pratense*, flor. secundis lateralibus, foliol. conjugationibus remotis, coroll. clausis L.

In pratis, nemorosis; fl. Maj - Aug.

* 5. *M. sylvaticum*, flor. secundis lateralibus, folior. conjugationibus remotis, corollis hiantibus L. *Fl. dan.* t. 145.

In sylvaticis, montosis (Siles. Carn. Bav. Nassov. Hercyn. Megap. Berol. Lips. Tubing. —) fl. Jun. Jul.

294. LATHRAEA (Schuppenwurz) G.
pl. 1000.

Coroll. personata, glandula depressa receptaculo floris ad angulum alterum germinis inserta; caps. 1-locularis calyce patente vestita.

*L. *Squamaria*, caule simplicissimo, corollis pendulis: labio inferiore trifido L.

In nemorosis, montosis (Siles. Austr. Carn. Bav. Holsat. Saxon. Nassov. Berol. Lips. Ratisb. Helmstad. —) Fl. Apr. Maj.

295. PEDICULARIS (Läusekraut) G. pl.
1003.

Coroll. personata: labio superiore compresso; caps. 2-locularis mucronata obliqua; sem. hilo receptaculo affixa.

*1. P. *palustris*, caule ramoso; calyc. cristatis calloso punctatis, coroll. labio obliquo L.

In pratis paludosis; fl. Maj — Iul. (Cal. 2-lab. biatus cristatus, coroll. lab. sup. margo utrinque denticulis rostrata.

*2. P. *sylvatica*, caule ramoso; calyc. oblongis angulatis laevibus, coroll. labio cordato L.

In pratis paludosis, sylvaticis; fl. Maj. Iun. (Calyc. lacinia superior minima, coroll. ut in priori labio inferiori obliquo EHRH.)

3. *P. rostrata*, caule declinato subramoso; coroll. galea rostrato-acuminatis, calyc. cristatis subhirsutis L. *Iacq. austr.* 3. t. 205.

In montosis, subalpinis (Siles. Austr. Carn. Bav. Tubing. —) Fl. Iul.

4. *P. Sceptrum Carolinum*, caule simplici, flor. terno-verticillatis, coroll. clausis, calyc. cristatis, caps. regularibus L. *Fl. dan.* t. 26.

In sylvaticis (Bohem. Boruss.) in pratis paludosis (Megap. TIMM.) Fl. Aug.

296. ANTIRRHINUM (Löwenmaul) *G.*
pl. 1007.

Cal. 5-phyllus; coroll. personata, basi gibba aut calcarata; caps. 2-locularis.

1. *A. Cymbalaria*, fol. cordatis 5-lobis alternis, caulibus procumbentibus L. *Bull.* t. 305. *Fl. lond.*

Ad muros (Carn. Bavar. Palat. Francof. Gött. Lips. Tubing. Fuld. — Ratisb. HOPPE.) Fl. Maj. Iun.

* 2. *A. Elatine*, fol. hastatis alternis, caulibus procumbentibus L. *Fl. dan.* t. 426.

In agris, arvis; fl. Iul. Aug. (Stigma crassiusculum obliquum, stylum versus angustatum; caps. subrotunda a summitate utrinque lamellam deponens, relictæ mediæ basi; sem. obovata scabra. Siliqua brevissima impropria MED.)

* 3. *A. spurium*, fol. ovatis alternis, caulibus procumbentibus L. *Fl. lond.*

In agris, arvis, vineis (Siles. Austr. Bav. Carn. Hannov. Palat. Saxon. Lips. etc.) Fl. Aug. Sept. (Var. monstrosa *Pcloriae* similis, Linn. *amoen.* 6. t. 3.)

* 4. *A.*

*4. *A. arvense*, fol. sublinearibus, inferioribus quaternis; calyc. piloso - viscidis, flor. spicatis, caule erecto L.

In agris, arvis (Siles. Palat. Nassov. Saxon. Hannov. Lips. Barbi, etc.) Fl. Iun - Sept.

*5. *A. minus*, fol. plerisque alternis lanceolatis obtusis, caule ramosissimo diffuso L. *Fl. dan. t. 502.*

In cultis ruderatis, agris; fl. Aug. Sept. (Calyx. laciniae 3 superiores sursum reflexae, infer. breviores; sem. ovata sulcata scabra.)

*6. *A. Linaria*, fol. lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, flor. imbricatis L. *Bull. t. 261.*

In ruderatis, versuris, dumetis; fl. Iul. Aug. (Multiplicato numero partium excepto calyce; calcaribus 5, mutatis aliis: palato, labiis, tubo, oritur monstrosa varietas *Peloria*, hinc inde in Germania observata.)

*7. *A. majus*, corollis ecaudatis, flor. spicatis, calyc. rotundatis L. *Bull. t. 277.*

In muris, inter segetes (Siles. Carn. Austr. Bav. Saxon. Ratisb. Lips. Hannov. —) Fl. Iul. Aug. (Sem. subglobosa foveolis scrobiculata GAERTN.)

*8. *A. Orontium*, coroll. ecaudatis, flor. subspicatis, calyc. corolla longioribus L.

In agris, inter segetes; fl. Iul. Aug.

297. SCROPHULARIA (Braunwurz) G.

pl. 1014.

Coroll. resupinata: tubo subgloboso, lab. inf. intus squamula accessoria aucto, labii sup.

sup. lacinia intermedia ad tubum reflexa ;
caps. 2 - locularis.

* 1. *s. nodosa*, fol. cordatis trinervatis,
caule obtusangulo L.

Ad sepes, locis humidis, umbrosis; fl. Iun.
Iul. (Radix fibrosa bulbis intermixtis.)

* 2. *s. aquatica*, fol. cordatis obtusis pe-
tiolatis decurrentibus, caule membranis
angulato, racemis terminalibus L. *Fl. dan.*
t. 507. Fl. lond.

Ad aquas, fossas; fl. Iun. Iul.

3. *s. vernalis*, fol. cordatis, caulinis
ternis, pedunc. axillaribus solitariis bifidis
L. *Fl. dan. t. 411.*

In aquosis, ad sepes (Holsat. Bav. Austr. Nas-
sov. Berol. Lips. Helmstad. —) Fl. Maj.

298. DIGITALIS (Fingerhut) *G. pl. 1017.*

Cal. 5 - partitus; cor. campanulata deor-
sum ventricosa, basi arcta, 4 - fida: laci-
nia superiori emarginata; caps. ovata, 2 -
locularis.

1. *D. purpurea*, fol. calycinis ovatis acu-
tis, coroll. obtusis: labio superiore inte-
gro L. *Bull. t. 21.*

In sylvaticis montosis (Siles. Bav. Palat. Nas-
sov. Hercyn. Saxon. Francof. Tubing. Fuld. —
Wetzlar. MARTIUS.) Fl. Iun. Iul.

† 2. *D. lutea*, calyc. foliosis lanceolatis,
coroll. acutis: labio superiore bifido L.
Iacq. hort. 2. t. 105.

In montosis sylvaticis (Siles. Carn. Bav. —
Fuld. LIEBLEIN.) Fl. Iul. Aug.

* 3. *D.*

* 3. *D. ambigua*, calyc. foliolis lanceolatis, coroll. galea emarginata, fol. subtus pubescentibus L. *Jacq. austr. t. 57.*

In nemorosis montosis (Siles. Bav. Austr. Saxon. Hercyn. Nassov. Barbi, Berol. Francof. Gött. Ratisb. Helmstad. — Stuttgart. KERNER.) Fl. Jul. Aug.

299. LINDERNIA (Lindernie) *G. pl. 1031.*

Cal. 5 - partitus; cor. ringens labio superiore brevissimo; stam. 2 inferiora dente terminali antheraque sublaterali; caps. ovalis, 1 - locularis, 2 - valvis.

L. pyxidaria, fol. ovalibus integerrimis, sessilibus, pedunculis solitariis L.

Locis paludosis, inundatis (Siles. KROCK. Ratisb. FUNK, HOPPE, Wittenb. SCHK.) Fl. Sept. Oct.

300. LINNAEA (Linnaea) *G. pl. 1037.*

Cal. duplex: fructus 2 - phyllus, floris 5 - partitus superus; cor. campanulata; bacca sicca, trilocularis.

L. borealis, L. *Fl. dan. t. 3.*

In sylvis antiquis, montosis (Siles. KROCK. prope Berol. WILDEN.) Fl. Jun.

301. LIMOSELLA (Sumpfkraut) *G. pl. 1039.*

Cal. 5 - fidus; cor. 5 - fida; stam. per paria approximata; caps. 1 - locularis, inferne septo divisa.

* 1. *L. aquatica*, fol. lanceolatis L. *Fl. dan. t. 69.*

Locis inundatis, sabulosis; fl. Iul — Oct.

2. *L. diandra*, fol. sublinearibus L. *Krock. 2. t. 27.*

Locis inundatis (Siles. KROCK.) Fl. Autumno.

302. OROBANCHE (Erdenwürger) G. *pl. 1045.*

Cal. 2 - fidus; cor. ringens, glandula sub basi germinis; caps. 1 - locularis, 2 - valvis.

† 1. *O. laevis*, caule simplicissimo laevi; *stam. exsertis* L.

In siccis montosis (Siles. Austr? Saxon. Barbi, Francof. —) Fl. Iul.

* 2. *O. major*, caule simplicissimo pubescente; *stam. subexsertis* L. *Bull. t. 359.*

In nemorosis, montosis, in pratis, pascuis, parasitica; fl. Maj — Iul.

3. *O. ramosa*, caule ramoso; coroll. 5 - fidis L. *Bull. t. 399.*

In agris siccis (Bav. Palat. Thuring. Saxon. Helmstad. —) Fl. Iun — Aug.

Classis XV.

TETRADYNAMIA

SILICULOSA.

303. MYAGRUM (Leindotter) G. *pl. 109.*

Silicula stylo rigido conico terminata, 2 - valvis: loculis quibusdam saepe vacuis.

1. *M. perenne*, silic. biarticulatis 1-spermis; fol. extrorsum sinuatis denticulatis L. *Iacq. austr.* 5. t. 414.

In agris, ad vias (Austr. Carn. Siles. Saxon. Thuring. Barbi, Eisleben, Ien. —) Fl. Iun. Iul.

† 2. *M. rugosum*, siliculis sulcatis pilosis rugosis; fol. oblongis obtusis dentatis L.

Circa Ienam, Langensalzam, Sulzam (ROTH.) —

† 3. *M. perfoliatum*, siliculis obcordatis subsessilibus; fol. amplexicaulibus L.

Inter segetes (Nassov. Stuttgart. KERNER.) —

* 4. *M. sativum*, siliculis obovatis pedunculatis polyspermis L. *Hoppe*, *ect.* 342.

In agris, inter Linum; fl. Iun. Iul. (*Moenchia sativa*, ROTH.)

* 5. *M. paniculatum*, siliculis lentiformibus orbiculatis, punctato-rugosis L. *Fl. dan.* t. 204. *Kerner*, t. 281.

Inter segetes; fl. Iun. Iul.

304. BUNIAS (Zackenschote) *G. pl.* 1070.

Silicula decidua tetraëdra, angulis inaequalibus acuminatis muricata.

B. *Cakile*, siliculis ovatis laevibus ancipitibus L.

In maritimis (Carn. Holsat. Oldenb. Megap. —) Fl. Iul. (*Cakile maritima*, ROTH.)

305. CRAMBE (Meerkohl) *G. pl.* 1071.

Filamenta 6: 2 longitudine calycis, 4 longiora, apice bifurca.

c. maritima, fol. cauleque glabris L. *Fl. dan. t.* 316.

In maritimis (Holsat. Pom. —) Fl. Iun. (Bacca sicca globosa LINN. Caps. decidua, 1-locularis ROTH. Pericarp. simplex MED.)

306. ISATIS (Waid) G. *pl.* 1072.

Silicula oblonga lanceolata compressa, 1-locularis, 1-sperma, decidua, 2-valvis: valvulis navicularibus.

1. *tinctoria*, fol. radicalibus crenatis, caul. sagittatis; silic. oblongis L.

In montosis, ad vias (Austr. Palat. Siles. prope Ien. Tubing. Hannoviam, Ratisb. —) Fl. Iun.

307. SUBULARIA (Wasserpfriemen) G. *pl.* 1075.

Silicula integra ovata: valvis ovatis integris concavis dissepimento contrariis; styl. silicula brevior.

s. *aquatica*, L. *Fl. dan. t.* 53.

In inundatis (Holsat. —) Fl. Iul.

308. DRABA (Hungerblümchen) G. *pl.* 1076.

Silicula ovali-oblonga stylo fere destituta, polysperma: valvis planiusculis dissepimento parallelis.

* 1. *D. aizoides*, scapo nudo simplici, fol. ensiformibus carinatis ciliatis L. *Jacq. austr. 2. t.* 192.

In montosis altioribus (Siles. Bav? Austr. Carn. Ratisb. — Stuttgard. KERNER.) Fl. Apr — Iun. (*Moenchia aizoides*, ROTH.)

* 2. *D.*

* 2. *D. verna*, scapis nudis, fol. subserratis L. *Fl. lond.*

In agris, arvis copiose; fl. Mart — Jun.

3. *D. muralis*, caule ramoso, fol. ovatis sessilibus dentatis L. *Ehrh. herb.* 8.

In ruderatis, montosis (Siles. Palat. Saxon. —) *Fl. Inl.*

4. *D. hirta*, scapo unifolio, fol. subhirsutis; siliculis obliquis pedicellatis L. *Fl. dan. t.* 142.

In subalpinis (Austr.) agris montanis (Siles. KROCK.) *Fl. Maj.* Jun.

5. *D. incana*, fol. caulinis numerosis incanis: silic. oblongis obliquis subsessilibus L. *Fl. dan. t.* 130.

In agris et montosis (prope Tubing. GMEL.)

309. LEPIDIUM (Kresse) *G. pl.* 1077.

Silicula emarginata cordata compressa: valvulis argute carinatis dissepimento contrariis: loculis 1 - spermis.

† 1. *L. procumbens*, fol. sinuato - pinnatifidis, extremo majore, scapo nudo, caulibus prostratis racemiferis L.

Siles. (KROCK.) —

2. *L. alpinum*, fol. pinnatis integerrimis; scapo subradicato; silic. lanceolatis mucronatis L. *Iacq. austr.* 2. *t.* 127.

In alpinis, subalpinis (Austr. Carn. Tirol. etc.) locis montosis, depressis (Siles. Bavar. —) *Fl.* Apr — Aug.

3. *L. petraeum*, fol. pinnatis integerrimis; petalis emarginatis calyce minoribus *L. Jacq. austr. 2. t. 131.*

In montosis, lapidosis (Siles. Austr. — prope Steigerthal EHRH.) Fl. Maj. Iun.

4. *L. sativum*, fol. tetradynamis; fol. oblongis multifidis *L.*

In cultis, ruderatis, ad sepes (Siles. Berol. Barbi, Lips. Nassov. — Wolfenb. HOPPE.) Fl. Maj. Iun.

5. *L. latifolium*, fol. ovato - lanceolatis integris serratis *L. Fl. dan. t. 557.*

In montosis, collinis (Siles. Holsat. Tubing. — Ratisb. HOPPE, Hannoveriae GAERTN.) Fl. Iun. Iul.

6. *L. graminifolium*, fol. linearibus: superioribus integerrimis, caule paniculato virgato, floribus hexandris *L.*

Circa pagos (Siles. KROCK.) Fl. aestate.

* 7. *L. ruderale*, floribus diandris apetalis, fol. radicalibus dentato - pinnatis: ramiferis linearibus integerrimis *L. Fl. dan. t. 184.*

In ruderatis, muris, ad vias, et littora maris (Siles. Bav. Carn. Palat. Saxon. Lips. Berol. Ratisb. Fuld. Nordh. Gött. etc.) Fl. Iul. Aug. (Var. flor. petaloideis ROTH.)

8. *L. Iberis*, flor. diandris tetrapetalis, fol. inferioribus lanceolatis serratis: superioribus linearibus integerrimis *L.*

Ad vias, in ruderatis (Siles. Barbi, Brem. Lips. —) Fl. Iun. Iul.

310. THLASPI (Taschenkraut) G. pl. 1078.

Silicula emarginata obcordata: valvulis navicularibus carinatis, alato - marginatis.

1. *T. peregrinum*, silic. suborbiculatis; fol. lanceolatis integerrimis L.

In montosis aridis (Carn.) sylvaticis (Tubing. GMEL.) —

* 2. *T. arvense*, silic. orbiculatis; fol. oblongis dentatis glabris L. *Fl. dan. t. 793.*

In agris, arvis; fl. Maj — Iul. (Silic. obcordata alata; styl. emarginatura multo brevior.)

3. *T. alliaceum*, silic. subovatis ventricosis; fol. oblongis obtusis dentatis glabris L.

In arvis, ruderalis (Siles. Tubing. —) Fl. Maj — Iul.

4. *T. saxatile*, silic. subrotundis; fol. lanceolato - linearibus obtusis carnosus L. *Iacq. austr. 3. t. 236.*

In saxosis (Austr. Siles. Bav. Tubing. —) Fl. aestate.

5. *T. campestre*, silic. subrotundis, fol. sagittatis dentatis incanis L.

In campis, inter segetes; fl. Maj — Iun.

6. *T. montanum*, silic. orbiculatis; fol. glabris: radicalibus subcarnosis obovatis integerrimis; caulinis amplexicaulibus, corollis calyce majoribus L. *Iacq. austr. 3. t. 237.*

In montosis (Austr. Bav. Palat. Saxon. Nass. Lips. Tubing. etc.) Fl. Maj. Iun.

7. *T. praecox*, silic. obcordatis; fol. carnosus glabris glaucis subcrenulatis, in petiolum

tiolum decurrentibus, caulinis sessilibus
semiamplexicaulibus obtuse cordato - sagit-
tatis; petalis calyce longioribus WULF.
Iacq. coll. 2. t. 9.

In sylvestribus montosis (Carinth. Carn. Si-
les? —) Fl. Mart. Apr. (A priori diversum.)

* 8. *t. perfoliatum*, silic. obcordatis; fol.
caulinis cordatis glabris subdentatis; petal-
is longitudine calycis; caule ramoso L.
Iacq. austr. 4. t. 337.

In arvis, agris (Siles. Austr. Bav. Palat. Sa-
xon. Holsat. etc.) Fl. Apr. Maj. (Var. magni-
tudine.)

9. *t. alpestre*, silic. obcordatis; fol. sub-
dentatis; caulinis amplexicaulibus; petalis
longitudine calycis; caule simplici L.

In montosis, in agris (Austr. Siles. Saxon.
Tubing. —) Fl. Iun.

* 10. *t. Bursa pastoris*, silic. obcordatis;
fol. radicalibus pinnatifidis L. *Bull. t. 223.*

In cultis, agris, ruderatis; fl. Apr — Sept.
(Var. magnitudine et foliis; siliculae obcordato-
triangulae dorso obtusae absque margine; Nas-
turt. *Bursa pastoris* ROTH.)

311. COCHLEARIA (Löffelkraut) *G. pl.*

1079.

Silicula subemarginata turgida scabra:
valvulis gibbis obtusis.

1. *c. officinalis*, fol. radicalibus cordato-
subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis
L. *Fl. dan. t. 135.*

Ad

Ad littora maris, locis paludosis (Siles. Bav. Holsat. Oldenb. Hannoviae —) Fl. Iun. (Caps. cordata, non emarginata; sem. 4 in singulo loculo.)

2. *c. danica*, fol. hastato - angulatis; omnibus deltoideis L. *Fl. dan. t. 100.*

Ad littora maris (Holsat. Oldenb. —) Fl. Maj. Iun.

3. *c. anglica*, fol. omnibus ovato - lanceolatis sinuatis HUDS. *Fl. dan. t. 329.*

Ad littora maris (Oldenb. ROTH.) Fl. Maj.

*4. *c. Coronopus*, fol. pinnatifidis, caule depresso L. *Fl. dan. t. 202.*

Locis apricis, nudis (Carn. Palat. Nassov. Saxon. Barbi, Gött. Lips. etc.) Fl. Iun. Iul. (Silic. subcordata echinata; semine 1, in singulo loculamento.)

5. *c. Armoracia*, fol. radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incisis L.

Locis humidis, ad fossas (Siles. Bav. Austr. Nassov. Saxon. Megap. Hannov. Lips. Wolfenb. Barbi, Helmstad. Francof. etc.) Fl. Iun. Iul. (Glandula sub singulo filamento brevior; stigma crassum capitatum; silic. oblonga laevis subundulata; sem. 6.)

6. *c. glastifolia*, fol. caulinis cordato - sagittatis amplexicaulibus L.

In hortis, locis incultis (Siles. KNOCK. Ratisb? —) Fl. Iul. Aug.

7. *c. Draba*, fol. lanceolatis amplexicaulibus dentatis L. *Iacq. austr. 4. t. 315.*

In ruderatis, inter segetes (Austr. Bavar. Brem. prope Erlang. Norimb. ROTH. Lepid. *Draba*.) Fl. Iun.

312. *IBERIS* (Bauernsenf) *G. pl.* 1080.

Coroll. irregularis: petalis 2 exterioribus majoribus; silicula compressa emarginata.

1. *I. rotundifolia*, herbacea; fol. ovatis: caulinis amplexicaulibus laevibus succosis L.

In montosis altioribus (Siles. Carn. Bav. Saxon. —) Fl. Iul.

2. *I. umbellata*, herbacea, fol. lanceolatis acuminatis: inferioribus serratis, superioribus integerrimis L.

Ad sepes, locis incultis (Siles. KROCK. Austr. —) Fl. aestate.

* 3. *I. amara*, herbacea, fol. lanceolatis acutis subdentatis, floribus racemosis L.

In agris, arvis (Carn. Austr. Palat. Saxon. —) Fl. Iul — Sept.

* 4. *I. nudicaulis*, herbacea, fol. sinuatis, caule nudo simplici L. *Fl. dan. t.* 323.

In arenosis; fl. Maj. Iun.

313. *ALYSSUM* (Steinkraut) *G. pl.* 1081.

Filamenta denticulata; silicula compressa subrotunda laeviter marginata, stylo coronata.

* 1. *A. saxatile*, caul. frutescentibus paniculatis, fol. lanceolatis molissimis repandis L.

In montosis (Austr. —) Fl. aestate.

* 2. *A. incanum*, caule erecto, fol. lanceolatis incanis integerrimis, flor. corymbosis, petalis bifidis L.

Ad

Ad vias, muros, in arenosis; fl. Iul. Sept.
(*Moenchia incana* ROTH.)

3. *A. minimum*, caulib. herbaceis diffusis, fol. linearibus tomentosis; silic. compressis L.

Stuttgard. (KERNER) —

*4. *A. calycinum*, caul. herbaceis; stamin. omnibus dentatis, calyc. persistentibus L. *Iacq. austr.* 4. t. 338.

In campis, sabulosis; fl. Maj — Sept.

5. *A. montanum*, caulib. herbaceis diffusis, fol. sublanceolatis punctato-echinatis L. *Iacq. austr.* t. 37.

In montanis, collibus siccis (Siles. Austr. Carn. Saxon. Barbi, Tubing. Stuttgard. Ratisb. —) Fl. Apr — Iun.

6. *A. campestre*, caule herbaceo; stam. (brevioribus) stipatis pari setarum, calyc. deciduis L.

In campis, arenosis (Siles. Bavar? Palat? Saxon. Nassov. Francof. Ien. —) Fl. Maj — Iul.
(*Moenchia campestris* ROTH.)

314. BISCUTELLA (Doppeltschild) *G. pl.*
1084.

Silicula compresso - plana, rotundata supra infraque biloba: lobis subrotundis.

1. *B. coronopifolia*, siliculis glabris; fol. dentatis hirtis L.

In arenosis sterilibus (prope Barbi —) Fl. Maj. Iun.

2. *B.*

2. *B. laevigata*, siliculis glabris; fol. lanceolatis serratis L. *Iacq. austr.* 4. t. 339.

In montosis (Austr. Carn. Bav. Saxon. —) Fl. Iun. Iul.

3. *B. rupestris*, Ehrh. herb. 77.

In monte Mühlberg —

315. LUNARIA (Nondveil) G. pl. 1085.

Silicula integra elliptica maxima, compresso-plana; sem. compressa, marginata.

* 1. *L. rediviva*, fol. alternis L.

In humidis, sylvaticis, rupestribus (Siles. Carn. Bav. Hercyn. Thuring. Nassov. etc.) Fl. Maj. Iun.

* 2. *L. annua*, fol. oppositis L.

In montanis (Siles. Hercyn. prope Rübeland, Tubing. —) Fl. Iun. (Flores inodori. Silie. orbiculato-elliptica SCHRANK.)

SILIQUOSA.

316. DENTARIA (Zahnkraut) G. pl. 1087.

Cal. connivens; stigma emarginatum; siliqua teres elastice dissiliens: valvulis revolutis; dissepimento fungoso.

1. *D. enneaphylla*, fol. ternis ternatis L. *Iacq. austr.* 4. t. 316.

In montosis, umbrosis (Austr. Siles. Bohem. Carn. Bav. —) Apr — Iul.

2. *D. bulbifera*, fol. inferioribus pinnatis, summis simplicibus L.

In montosis, umbrosis, sylvaticis (Siles. Austr. Carn. Bav. Holsat. Mecap. Hannov. Nassov. etc.) Fl. Apr. Maj.

317. CARDAMINE (Schaumkraut) G. pl.
1088.

Cal. subpatulus; stigma integrum capitatum; siliqua longa cylindraceo-compressa elastice dissiliens: valvulis revolutis.

Fol. simplicibus.

1. *c. bellidifolia*, fol. simplicibus ovalibus integerrimis; petiolis longis L. *Fl. dan. t. 20. Jacq. misc. 1. t. 17.*

In montosis, subalpinis (Siles. Carinth. Carn. Bav. etc.) in agris et sylvis (prope Tubing. GMEL.) Fl. Iul. Aug.

2. *c. petraea*, fol. simplicibus oblongis dentatis L. *Fl. dan. t. 386.*

In montosis, petrosis, humidis (Siles. KROCK.) Fl. Iun. Iul.

Fol. ternatis.

3. *c. resedifolia*, fol. inferioribus indivisis, superioribus trilobis pinnatisque L. *Jacq. austr. 5. ap. t. 21.*

In subalpinis (Austr.) in ruderatis (prope Tubing. GMEL.) Fl. Iun. Iul.

*4. *c. impatiens*, fol. pinnatis incisis stipulatis, floribus apetalis L. *Fl. dan. t. 735.*

In sylvaticis humidis; fl. Maj. Iun.

5. *c. parviflora*, fol. pinnatis exstipulatis, foliolis lanceolatis obtusis, floribus corollatis L.

In nemorosis, umbrosis (Siles. Nassov. Barbi —) Fl. Maj. Iun.

6. *c. hirsuta*, fol. pinnatis, flor. tetrandris L. *Fl. lond.*

In sylvaticis, humidis; fl. Iun.

* 7. *c. pratensis*, fol. pinnatis: fol. radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis L. *Fl. lond.*

In pomariis, pratis, pascuis; fl. Maj. Iun.

* 8. *c. amara*, fol. pinnatis, axillis stoloniferis L. *Fl. lond.*

In pratis, udis, nemorosis; fl. Maj. Iun.

318. *SISYMBRIUM* (Rauke) *G. pl.* 1089.

Cal. patens; coroll. patens: unguibus minimis; siliqua teres, dehiscens valvis rectiusculis dissepimento fere aequalibus.

* 1. *s. Nasturtium*, siliq. declinatis; fol. pinnatis: foliolis subcordatis L. *Bull. t.*

302.

Ad scaturigines, fossas; fl. Maj. Iun.

* 2. *s. sylvestre*, siliq. declinatis oblongo-ovatis: foliolis lanceolatis serratis L. *Fl. lond.*

Locis sabulosis, humidis, ad fossas; fl. Iun. Iul.

* 3. *s. amphibium*, siliq. declinatis oblongo-ovatis: foliolis pinnatifidis serratis (petalis calyce majoribus) L.

Ad fossas, in pratis humidis; fl. Iun. Iul. (Sili-
cula parva torulosa. Var. terrestris, fol. pin-
natis: pinnis dentatis; petalis longitudine caly-
cis.)

5. *s. palustre*, siliq. declinatis oblongo-ovatis; fol. pinnatifidis serratis; petalis calyce minoribus LEYS.

Ad fossas, locis paludosis; fl. Maj - Iul. (s.
terrestris, radice annua, fol. pinnatifidis den-
tato-serratis; siliquis foecundis Curtis, *Fl.*
lond.

6. s.

6. *s. tenuifolium*, fol. integerrimis: infimis tripinnatifidis, supremis integris L. *Bull. t.* 335.

Ad vias, sepes, muros (Siles. Palat. —) Fl. Iul. Aug.

† 7. *s. erucastrum*, fol. runcinato-pinnatifidis subhispidis, caule hispido POLL.

In collinis, agris, vineis (Siles. Palat. —) Fl. Maj — Aug.

8. *s. polyceratium*, siliq. axillaribus sessilibus subulatis aggregatis; fol. repando-dentatis L. *Iacq. hort. t.* 79.

In agris (prope Tubing. GMEL.) —

9. *s. bursifolium*, racemo flexuoso, fol. lyratys, caule erecto folioso L.

Ad arcem Tubingensem (GMEL.) —

10. *s. arenosum*, caule subfolioso ramoso, fol. lyratis rectangulo-dentatis hispidis: pilis ramosis L.

In arenosis (Siles. Austr. Carn. Bav. Holsat. Nassov. Dantisc. Barbi, Berol. Ratisb. — Norimb. PANZ.) Fl. Maj. Iun. (*Arabis arenosa*, SCOP. t. 40. WILD. WIGG. ROTH.)

11. *s. valentinum*, caule simplici erecto superne glabro, fol. lanceolatis hispidis, antrorsum dentatis L.

Inter segetes, in agris arenosis (Siles. KROCK.) Fl. Iun.

* 12. *s. Sophia*, petalis calyce minoribus; fol. decomposito-pinnatis L. *Bull. t.* 271.

In ruderalis, ad vias; fl. Maj — Iul.

13. *s. altissimum*, fol. runcinatis haecidis: foliolis sublinearibus integerrimis, pedunculis laxis L.

Ad sepes (Austr. Siles. KROCK.) Fl. Iul. Aug.

14. *s. Irio*, fol. runcinatis dentatis nudis, caule laevi; siliq. erectis L. *Iacq. austr. 4. t. 322. Fl. lond.*

In cultis, ad margines agrorum (Siles. Austr.—prope Francof. Eisleben, Gies. Helmstad. —) Fl. Iul. Aug.

15. *s. Columnae*, fol. runcinatis dentatis et caule villosis subincanis; siliq. erectis L. *Iacq. austr. 4. t. 323.*

In arenosis (Austr.—Norimb. PANZER.) Fl. Iun.

16. *s. Loeselii*, fol. runcinatis acutis hirtis, caule hispido L. *Iacq. austr. 4. t. 324.*

In ruderatis, locis altioribus sylvaticis (Austr. Boruss. Siles. Bohem. Palat. Saxon. Barbi, Dan-tisc. —) Fl. Iun. Aug.

† 17. *s. barbareae*, fol. simplicibus spatulato-ovatis dentatis amplexicaulibus nudis L.

In sylvaticis, montosis (Siles. KROCK.) Fl. Iul. Aug.

† 18. *s. catholicum*, siliq. filiformibus laevibus; fol. pinnatis denticulatis caulinis L.

Ad sepes (Siles. KROCK.) Fl. Iul. Aug.

19. *s. strictissimum*, fol. lanceolatis, dentato-serratis caulinis L. *Iacq. austr. 2. t. 194.*

Ad sepes, fossas (Austr. Stuttgard. Francof. — Lips. BAUMG.) Fl. Iun. Iul.

319. ERYSIMUM (Hederich) G. pl. 1090.

Cal. clausus; siliqua columnaris exacte tetraëdra.

* 1. *E. officinale*, siliq. spicae adpressis; fol. runcinatis L. Bull. t. 259.

In ruderalis, ad vias; fl. Jul. Aug. (Siliq. breves, apicem versus angustiores tetragonae, subhirsutae brevissimae pedunculatae; sem. angulosa minima, dissepimenti suturis alternatim affixa.)

* 2. *E. Barbarea*, fol. lyratis: extimo subretundo L.

Locis humidis; fl. Maj — Jul.

* 3. *E. Alliaria*, fol. cordatis L. Bull. t. 338. Fl. lond.

In pomariis, dumetis, umbrosis; fl. Jun. Jul. (Siliq. exacte tetraëdra; sem. utrinque oblique truncata.)

* 4. *E. repandum*, fol. lanceolatis dentatis, racemis oppositifoliis; siliq. racemosis subsessilibus, corollis minutis L. Jacq. austr. t. 22.

In agris, arvis, montosis (Austr. Siles. Bohem. —) Fl. Jul. Aug.

* 5. *E. cheiranthoides*, fol. lanceolatis integerrimis; siliq. patulis L. Jacq. austr. t. 23.

In agris, arvis; fl. Jun. Jul.

* 6. *E. hieracifolium*, fol. lanceolatis serratis L. Jacq. austr. t. 73.

In arvis, muris (Siles. Austr. Bav. Saxon. Nassov. Palat. Barbi, Gött. Francof. —) Fl. Maj. Jun.

320. CHEIRANTHUS (Levkoie) *G. pl.* 1091.

Germen utrinque denticulo glandulato; siliqua compressa, apice 2-fida; sem. plana.

* 1. *c. Erysimoides*, fol. lanceolatis denticatis nudis, caule erecto simplicissimo; siliq. tetragonis L. *Fl. dan.* t. 229.

In asperis, lapidosis (Siles. Austr. Nassov. Saxon. Berol. Gött. Ratisb. —) Fl. Maj — Sept. (Erys. Cheiranthus, ROTH.)

† 2. *c. Cheiri*, fol. lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoso L. *Bull.* t. 349.

In muris tectis (Siles. Saxon. Francof. —) Fl. Maj. Iun. (Cheiranth. scapigerus, WILD. t. 5. fig. 10, varietas monstrosa. Cheir. Erysimoid.)

321. HESPERIS (Nachtveil) *G. pl.* 1093.

Stigma basi bifurcatum apice connivens; siliqua compresso-plana stricta.

1. *H. tristis*, caule hispido ramoso-patente L. *Iacq. austr.* 2. t. 102.

In arvis, montosis (Siles. Austr. —) Fl. Iun. Iul.

2. *H. matronalis*, caule simplici erecto, fol. ovato-lanceolatis denticulatis; petalis mucrone emarginatis L.

In nemorosis, umbrosis (Siles. Bav. Nassov. Brem. Gött. Barbi. —) Fl. Iul. (Var. petalis non emarginatis.)

3. *H. inodora*, caule simplici ereto, fol. subhastatis dentatis; petalis obtusis L. *Iacq. austr.* 4. t. 347.

In sylvaticis, montosis, ruderatis (Siles. Austr. Bav. Megap. Ien. Tubing. —) Fl. Maj. Iun.

322. *ARABIS* (*Arabis*) G. pl. 1094.

Glandulae nectariferae 4, singulae intra calycis foliola squamae instar reflexae; siliqua linearis apice integra capitata.

1. *A. alpina*, fol. amplexicaulibus dentatis L. *Fl. dan.* t. 62.

In alpinis, montosis (Siles. Austr. Bav. etc.) ad rupes inter saxa (Tubing. GMEL. Stuttgard. KERNER.) Fl. Iul. Aug.

* 2. *A. thaliana*, fol. petiolatis lanceolatis integerrimis L. *Fl. lond.*

In agris, arvis; fl. Apr — Sept.

3. *A. crantziana*, Ehrh. 78.

In montosis (Katzenstein) —

4. *A. Halleri*, fol. caulinis sublyratis: rameis lanceolatis incisis L. *Ehrh. herb.* 18.

In montosis altioribus (Siles. Carn. Bav. Hercyn. Hannov. Brunsvig. Hildes. Wolfenb. Barbi —) Fl. Maj. Iun.

5. *A. Turrita*, fol. amplexicaulibus; siliq. decurvis planis linearibus; calyc. subrugosis L. *Iacq. austr.* t. 11.

In montosis (Austr. Siles. Carn.) agris (Tubing. GMEL.) Fl. Maj. Iun.

323. TURRITIS (Thurmkrant) G. pl. 1095.

Cal. et cor. erecta; siliqua longissima angulata.

* 1. *T. glabra*, fol. radicalibus dentatis hispidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris L. *Fl. dan. t.* 809.

In pascuis siccis, nemorosis; fl. Maj. Iun.

* 2. *T. hirsuta*, fol. omnibus hispidis, caulinis amplexicaulibus L.

In rupibus, pascuis graminosis, collinis; fl. Maj. Iun.

3. *T. alpina*, fol. radicalibus dentatis hispidis, caulinis semiamplexicaulibus L.

In montosis, subalpinis (Siles. Austr. —) Fl. Iun. Iul.

324. BRASSICA (Kohl) G. pl. 1096.

Cal. erectus, glandulae 4, inter stamina et calycem; siliqua longa: valvulis dissepimento brevioribus.

* 1. *B. orientalis*, fol. cordatis amplexicaulibus glabris, radicalibus scabris integerrimis; siliq. tetragonis L. *Iacq. austr. 3. t.* 282.

In agris (Austr. Carn. Nassov. Siles. etc.) Fl. Iun.

2. *B. austriaca*, fol. cordatis amplexicaulibus glabris, omnibus integerrimis; siliq. tetragonis striatis erectis L. *Iacq. austr. 3. t.* 283.

In agris, arvis (Austr. Palat. Saxon. Francof. Tub. etc.) Fl. Iul. (*Erys. austriacum*, ROTH.)

3. *B. campestris*, radice cauleque tenui, fol. caulinis uniformibus cordatis sessilibus L. *Fl. dan.* t. 550.

Inter segetes (Siles. Hannov. Nassov. Barbi, Gött. Wildesh. —) Fl. Maj. Iun.

* 4. *B. alpina*, fol. caulinis cordato-sagittatis amplexicaulibus, radicalibus ovatis; petalis erectis L.

In montosis, sylvaticis (Palat. Nassov. Ien. —) Fl. Maj. (*Erys. alpinum*, ROTH.)

5. *B. Napus*, radice caulescente fusiformi L.

Inter segetes; fl. Maj. Iun.

† 6. *B. Rapa*, radice caulescente orbiculari depressa carnosae L.

Inter segetes sponte (Siles. Berol. Lips. —) Fl. aestate.

7. *B. Erucastrum*, fol. runcinatis, caule hispido; siliq. laevibus L. *Bull.* t. 331.

Ad ripas, in ruderatis montanis, arenosis (Siles. Austr. Carn. Palat. Saxon. Nassov. Lips. Francof. etc.) Fl. Iun. Iul. (*Erys. Erucastrum*, ROTH.)

8. *B. Eruca*, fol. lyratis, caule hirsuto; siliq. glabris L.

Locis montosis, ruderatis (Austr. Siles. —) Fl. Iun. Iul.

325. SINAPIS (Senf) G. pl. 1097.

Cal. patens; cor. ungues recti; glandulae 4 inter stamina et calycem; siliq. rostrata: valvulis dissepimento brevioribus.

* 1. *s. arvensis*, siliq. multangulis toroso-turgidis laevibus rostro ancipiti longioribus L. *Fl. dan.* t. 753.

In agris, inter segetes et rapas copiose; fl. Jun — Sept. (Calycois foliola sub apice seta brevi aristata.)

2. *s. alba*, siliq. hispidis: rostro obliquo longissimo ensiformi L. *Fl. lond.*

(In agris, inter segetes, hinc inde; fl. Jun. Jul.

* 3. *s. nigra*, siliq. glabris racemo adpressis L.

In ruderatis, inter segetes, hinc inde; fl. Jun. Jul.

326. *RAPHANUS* (Rettig) *G. pl.* 1098.

Cal. clausus; glandula 4 inter stamina et calycem; siliqua teres, subarticulata, rostrata.

* *R. Raphanistrum*, siliq. teretibus articulatis laevibus 1 - locularibus L. *Fl. dan.* t. 678.

In agris, inter segetes; fl. Maj — Aug.

Classis XVI.

MONADELPHIA

DECANDRIA.

327. *GERANIUM* (Storcheschnabel) *G. pl.* 1118.

Cal. 5 - partitus; receptaculum commune rostratum; caps. 5, cauda longissima tortili longitudinaliter interne dehiscen-tes.

* 1. *G. cicutarium*, pedunc. multifloris; flor. pentandris, fol. pinnatis incisis obtusis, caule ramoso L. *Fl. lond. Cavan. t. 93. fig. i.*

In agris, arvis, ruderatis; fl. Mart — Oct.

† 2. *G. moschatum*, pedunc. multifloris, flor. pentandris, fol. pinnatis incisis, cotyledonibus pinnatifidis L. *Iacq. hort. t. 55. Cavan. t. 94. fig. i.*

In collinis arenosis (Helmstad. CAPPEL) Fl. Apr.

3. *G. tuberosum*, pedunc. bifloris, fol. multipartitis: laciniis linearibus subdivisis obtusis L. *Cavan. t. 78. fig. i.*

In montosis (Siles. KROCK.) Fl. Iul — Sept.

4. *G. phaeum*, pedunc. solitariis oppositifoliis; calyc. subaristatis; caule erecto; petalis undulatis L. *Cavan. t. 89. fig. 2.*

In montosis (Siles. KROCK) in pratis (Saxon. LEYS.) Fl. Maj. Iun.

5. *G. sylvaticum*, pedunc. bifloris, fol. subpeltatis quinquelobis inciso - serratis, caule erecto; petalis emarginatis L. *Fl. dan. t. 124.*

In sylvaticis, dumetis; fl. Iun. Iul.

* 6. *G. palustre*, pedunc. bifloris longissimis declinatis; petalis integris; fol. quinquelobis incisis L. *Fl. dan. t. 596. Cavan. t. 87. fig. 2.*

In fossis, humidis dumetis; fl. Maj — Aug.

* 7. *G. pratense*, pedunc. bifloris, fol. subpeltatis multipartitis rugosis acutis; petalis integris L. *Fl. lond.*

In pratis humidis; fl. Maj. Iun.

+ 8. *G. argenteum*, pedunc. bifloris; petalis emarginatis; fol. subpeltatis septempartitis trifidis tomentoso - sericeis L. *Cavan. t. 81. fig. 2.*

In montosis (Siles. KROCK.) Fl. Iun. Iul.

9. *G. bohemicum*, caule villosa viscoso, fol. oppositis rugosis glaucis viscosis; filamentis ciliatis CAVAN. t. 81. fig. 2.

Ad sepes, in montosis, sylvaticis (Siles. Bohem. Bav. —) Fl. Iun — Aug.

* 10. *G. robertianum*, pedunc. bifloris; calyc. pilosis 10 - angulatis L. *Bull. t. 201.*

Ad sepes, in umbrosis; fl. Iun — Aug.

11. *G. lucidum*, pedunc. bifloris; calyc. pyramidatis angulatis, elevato - rugosis; fol. quinquelobis rotundatis L. *Fl. dan. t. 218. Cavan. t. 70. fig. 2.*

In montosis, umbrosis (Siles. Palat. Hercyn. Saxon. Francof. Helmstad. —) Fl. Maj. Iun.

12. *G. molle*, pedunc. bifloris, foliisque floralibus alternis; petalis bifidis, calyc. muticis; caule erectiusculo L. *Fl. lond. Vaill. t. 15. fig. 3.*

In ruderatis, ad vias; fl. Iun. Iul.

* 13. *C. columbinum*, pedunc. bifloris folio longioribus, fol. quinquepartito - multifidis;

trifidis; arillis glabris, calyc. aristatis L.
Vaill. t. 15. fig. 4.

Ad sepes, in campis; fl. Iul. Aug.

* 14. *G. dissectum*, pedunc. bifloris, fol.
 quinquepartito - trifidis; petalis emargina-
 tis longitudine calycis, arillis villosis L.

Fl. dan. t. 936. Vaill. t. 15. fig. 2.

In agris, pratis, dumetis; fl. Iun. Iul.

* 15. *G. rotundifolium*, caule prostrato,
 fol. oppositis, inferioribus subrotundis se-
 miquinquepartitis, superioribus subcunea-
 tis; petalis integerrimis, calyce paulo lon-
 gioribus CAVAN. t. 93. fig. 2. *Vaill. t. 15.*
fig. i.

In agris, arvis; fl. Iun - Oct.

16. *G. pusillum*, pedunc. bifloris; petala-
 lis emarginatis; caule depresso, fol. reni-
 formibus palmatis linearibus acutis L. *Ca-*
van. t. 83. fig. 1.

In agris, arvis, dumetis; fl. Iul. Aug. (*G. hu-*
mile, Cavan. t. 83. fig. 2.)

* 17. *G. sanguineum*, pedunc. unifloris,
 fol. quinquepartitis trifidis orbiculatis L.
Cavan. t. 76. fig. 1.

In pratis, sylvaticis; fl. Iun - Aug.

POLYANDRIA.

328. ALTHAEA (Eibisch) *G. pl. 1132.*

Cal. duplex: exterior 6 - 9 - fidus, inte-
 rior semi 5 - fidus.

1. *A. officinalis*, caule erecto tomentoso, fol. cordatis obsolete lobatis tomentosis CAVAN. t. 30. fig. 2.

Ad margines sylvarum, locis humidis (Siles. Austr. Carn. Palat. Saxon. Nassov. etc.) Fl. Jul. Aug.

2. *A. hirsuta*, fol. cordatis piloso-hispidis, supra glabris: radicalibus numerosis subrotundis, caulinis trilobis et quinquelobis, pedunculis solitariis unifloris CAVAN. t. 29. fig. 1.

Ad sepes, agros (Siles. Austr. Carn. Palat. Isenac. prope Bielefeld in Westphal. ASCHHOF.) Fl. Jul. Aug.

329. LAVATERA (Lavatere) G. pl. 1133.

Cal. duplex: exterior monophyllus trifidus brevis, interior semi 5-fidus acutus.

L. thuringiaca, fol. inferioribus cordatis crenatis subrotundo-lobatis, summis hastatis; pedunculis longis solitariis unifloris CAVAN. t. 31. fig. 3.

In nemorosis, montosis, ad fossas, sepes (Siles. Austr. Saxon. Barbi, Lips. Helmstad. —) Fl. Jul. Aug.

330. MALVA (Pappel) G. pl. 1134.

Cal. duplex: exterior 2-3-phyllus acutus, inferior semi 5-fidus major.

* 1. *M. rotundifolia*, caule prostrato, fol. cordato-orbiculatis obsolete quinquelobatis, pedunc.

pedunc. fructiferis declinatis L. Cavan. t. 26. fig. 3.

Ad vias, in ruderatis; fl. Iun — Sept.

* 2. *M. sylvestris*, caule scabro, fol. 5-7-lobatis crenato-dentatis; calyce exteriori submonophyllo CAVAN. t. 26. fig. 2.

Ad vias, sepes, ruderata; fl. Iul. Aug.

† 3. *M. mauritiana*, caule erecto subglabro, fol. cordatis crenatis quinquelobatis; flor. numerosis magnis rubescentibus; stipulis connatis CAVAN. t. 25. fig. 2.

In ruderatis (Siles. Berol. Lips. —) Fl. Iun-Aug.

† 4. *M. crispa*, caule erecto, fol. angulatis crispis, flor. axillaribus glomeratis L. Cavan. t. 23. fig. 1.

Ad sepes, in hortis (Siles. Brem. Oldenb. Nassov. —) Fl. Iul. Aug.

* 5. *M. Alceu*, caule erecto glabro, fol. cordatis: inferioribus subrotundo-peltatis crenatis, reliquis profunde quinquepartitis CAVAN. t. 17. fig. 2.

In montosis, ad sepes, aggeres; fl. Iul. Aug. (Var. fol. trilobis.)

6. *M. moschata*, caule erecto, fol. radicalibus reniformibus incis, caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis L. Cavan. t. 18. fig. 1.

In montosis, ruderatis, dumetis (Siles. Carn. Palat. Nassov. Francof. —) Fl. Iul. Aug. (Odor gravis.)

Classis XVII.

D I A D E L P H I A

H E X A N D R I A.

331. FUMARIA (Erdreich) G. pl. 1154.

Cal. diphyllus: cor. ringens fauce clausa, postice obtusa; filamenta 2, antherae 3 in singulo filamento.

* 1. F. *cava*, radice cava, caule simplici, bracteis florum integris. Fl. dan. t. 605. Krock. 2. t. 35.

In nemorosis, umbrosis, ad sepes; fl. Apr. Maj. (Var. *intermedia*, centro cava.)

* 2. F. *solida*, radice solida bulbosa, caule simplici, bracteis digitatis.

In montosis, pomariis, umbrosis; fl. Mart. Apr.

3. F. *Capnoides*, siliquis tinearibus tetragonis; caulibus diffusis acutangulis L.

In ruderatis montanis, muris (Siles. Carn. Gött. Lips. —) Fl. aestate.

* 4. F. *officinalis*, pericarpis monospermis racemosis, caule diffuso L. Bull. t. 189. Fl. lond.

In cultis, agris vulgaris; fl. Maj. Iun.

5. F. *capreolata*, pericarp. monospermis racemosis; fol. scandentibus subcirrhosis L.

In umbrosis (Siles. Krock.) Fl. aestate.

6. F. *claviculata*, siliquis linearibus; fol. cirrhiferis L. Fl. dan. t. 340.

In nemorosis, sepibus (Brem. Oldenb. —) Fl. Iul.

OCTANDRIA.

332. POLYCALA (Kreuzblume) G. pl.
1155.

Cal. 5 - phyllus: foliolis duobus maximis coloratis; corolla irregularis; caps. obcordata 2 - locularis.

Flores appendice penicilliformi.

* 1. P. *amana*, flor. cristatis racemosis; caul. erectiusculis, fol. radicalibus obovatis majoribus L. Jacq. austr. 5. t. 412.

In pratis, nemorosis, montosis (Siles. Austr. Bav. Carn. Saxon. Gött. Tubing. Ratisb. Nordh. — Norimb. PANZER.) Fl. Maj. — Iul. (Amaritie facilius distinguitur a sequenti.)

* 2. P. *vulgaris*, flor. cristatis racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, fol. lineari - lanceolatis L. Bull. t. 177.

In pratis, pascuis, siccis; fl. Maj. Iun. (Var. ut prior floribus albis rubris.)

3. P. *monspeliaca*, flor. cristatis racemosis, caule erecto, fol. lineari - lanceolatis acutis L.

In collinis, pratis montanis (Siles. Saxon. Tubing. —) Fl. Aug.

Flores imberbes.

* 4. P. *Chamaebuxus*, flor. imberbibus sparsis: carina apice subrotundo; caule

fruticoso, fol. lanceolatis L. Schmid. icon. t. 20.

In sylvaticis tenui gramine vestitis, montanis (Siles. Austr. Carn. Bav. Francon. Francof. Norimb. Ratisb. —) Fl. Apr — Iul.

DECANDRIA.

333. SPARTIUM (Pfriemen) G. pl. 1166.

Cal. 2 - labiatus deorsum productus; stigma longitudinale lateri apicis adnatum, supra villosum; filamenta germini adhaerentia.

* 1. s. *scoparium*, fol. ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis L. Fl. lond.

In campis, collinis; fl. Iun. Iul. (Labinum superius calycis 2 - inferius 3 - dentatum; legumen nigrum compressum marginibus pilosum.)

2. s. *patens*, fol. ternatis, ramis virgatis, flor. lateralibus geminis cernuis L.

In montanis (Siles. KROCK.) Fl. Iul. Aug.

334. GENISTA (Ginster) G. pl. 1167.

Cal. 2 - labiatus 5 - dentatus; vexillum reflexum; stigma involucrium, filamenta e carina emergentia.

Inermes.

* 1. G. *sagittalis*, ramis ancipitibus membranaceis articulatis, fol. ovato - lanceolatis L. Jacq. austr. 3. t. 209.

In sylvaticis, arenosis (Austr. Carn. Bav. Palat. Saxoni. Nassov. etc.) Fl. Iun. Iul. (Spartium sagittale, ROTH.)

* 2. C.

* 2. *G. tinctoria*, fol. lanceolatis glabris, ramis striatis teretibus erectis L.

In sylvis, nemorosis, montosis; fl. Iun — Aug. (Spart. tinctor. ROTH.)

3. *G. pilosa*, fol. lanceolatis obtusis, caule tuberculato decumbente L. Jacq. austr. 3. t. 208.

In collinis arenosis (Siles. Austr. Carn. Palat. Nassov. Lips. etc.) Fl. Iun. Iul. (Spart. pilos. ROTH.)

Spinosae.

4. *G. anglica*, spinis simplicibus, ramis floriferis inermibus, fol. lanceolatis L. Fl. dan. t. 619.

In ericetis, pascuis humidis (Bavar. Holsat. Brem. Oldenb. Hannov. —) Fl. Maj — Iul.

* 5. *G. germanica*, spinis compositis, ramis floriferis inermibus, fol. lanceolatis L. Ehrh. frut. 76.

In sylvis, nemorosis; fl. Iun. Iul.

335. ULEX (Heksaame) G. pl. 1169.

Cal. 2 - phyllus; legumen vix calyce longius.

U. europaeus, fol. villosis acutis, spinis sparsis L. Fl. dan. t. 608.

In campis, pascuis arenosis (Holsat. Brem. Verd. Helmstad. —) Fl. Maj. Iun.

336. ONONIS (Heuhechel) G. pl. 1173.

Cal. 5 - partitus: laciniis linearibus; vexillum striatum; filamenta in cylindrum inte-

integrum connata; legumen turgidum sessile.

* 1. *O. spinosa*, flor. racemosis solitariis, fol. ternatis solitariisque, ramis spinosis L.

In pascuis, agris, collinis; fl. Iul.

* 2. *O. arvensis*, flor. racemosis geminatis, fol. ternatis: superioribus solitariis, ramis inermibus subvillosis L.

In agris, arvis; fl. Iun. Iul.

† 3. *O. hircina*, flor. geminis brevissime pedicellatis, fol. superioribus simplicibus, stipulis serratis, caulibus villosis viscidis L.

In pratis humidis (Siles. KROCK.) Fl. Iul. Aug.

337. ANTHYLLIS (Wollblume) G. pl. 1174.

Cal. ventricosus 5 - dentatus; legumen subrotundum calyce tectum.

* 1. *A. Vulneraria*, herbacea, fol. pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato L.

In pratis, pascuis; fl. Iun - Aug.

338. PISUM (Erbse) G. pl. 1184.

Calycis lacinae 2 superiores breviores; stylus triangularis supra carinatus pubescens.

P. arvense, petiolis tetraphyllis, stipulis crenatis, pedunc. unifloris L.

Inter segetes, hinc inde; fl. Iul. Aug.

339. OROBUS (Erven) G. pl. 1185.

Cal. basi obtusus: laciniis superioribus profundioribus brevioribus; stylus teres supra pubescens.

* 1. *O. vernus*, fol. pinnatis ovatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici L. *Ingh. ic.*

In nemorosis, montosis; fl. Apr. Maj.

* 2. *O. tuberosus*, fol. pinnatis lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici L. *Fl. dan. t. 781.*

In sylvis, pratis; fl. Maj.

3. *O. tenuifolius*, caule inferne ramoso, quadrangulo: superne alato, fol. 2 - 3 - jugis linearibus, stipulis semisagittatis ROTH.

In ericetis, pascuis, nemorosis (Oldenb. — Erlang. ROTH.) Fl. cum priori.

4. *O. niger*, caule ramoso, fol. 6 - jugis ovato - oblongis L.

In nemorosis, montosis; fl. Iun. Iul.

5. *O. sylvaticus*, caule ramoso hirsuto decumbente, fol. subseptemjugis L.

In sylvis et sepibus (Tubing. GMEL.) Fl. Maj. Iun.

340. LATHYRUS (Kichern) G. pl. 1186.

Calycis lacinae superiores 2 breviores; stylus planus, a medietate ad apicem antice villosus.

1. *L. Aphaca*, pedunc. unifloris, cirrhis aphyllis, stipulis sagittato - cordatis L. *Fl. lond.*

In agris, inter segetes (Siles. Carn. Palat. Bav. Barbi, Francof. Tubing. Fuld. —) Fl. Iul. Aug.

2. *L. Nissolia*, pedunc. unifloris, fol. simplicibus, stipulis subulatis L.

In agris, inter segetes (Siles. Carn. Palat. Barbi —) Fl. Iun. Iul.

3. *L. hirsutus*, pedunc. subtrifloris, cirrhis diphyllis, fol. lanceolatis, legumini-bus hirsutis, sem. scabris L.

Inter segetes (Palat. Francof. —) Fl. Iul.

4. *L. tuberosus*, pedunc. multifloris, cirrhis diphyllis, fol. ovalibus internodiis nudis L.

Inter segetes (Siles. Palat. Saxon. Bavar. Hannov. Fuld. Helmstad. Ratisb. Gött. etc.) Fl. Maj. Iun.

5. *L. pratensis*, pedunc. multifloris, cirrhis diphyllis simplicissimis, foliolis lanceolatis L. Fl. lond.

In pratis, ad sepes; fl. Iun. Iul.

6. *L. sylvestris*, pedunc. multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis L. Fl. dan. t. 525.

In nemorosis, montosis; fl. Iun. Iul.

7. *L. latifolius*, pedunc. multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ellipticis, internodiis membranaceis L.

In nemorosis (Siles. Hercyn. Saxon. Nassov. Fuld. Barbi, Tubing. —) Fl. Iun. Iul.

8. *L. heterophyllus*, pedunc. multifloris, cirrhis diphyllis tetraphyllisque, fol. lanceolatis, internodiis membranaceis L.

In sylvaticis, montosis (Siles. Nassov. Bav. Francof. Tubing. Dantisc. —) Fl. Iul. Aug.

9. *L. palustris*, pedunc. multifloris, cir-
rhis polyphyllis, stipulis lanceolatis L. *Fl.*
dan. t. 399.

In pratis et pascuis humidis (Siles. Holsat. Pa-
lat. Bav. Saxon. Hannov. Oldenb. Brem. Barbi,
Berol. Lips. Dantisc, —) Fl. Iun. Iul.

341. *VICIA* (Wicke) *G.* pl. 1187.

Stigma latere inferiore transverse barba-
tum.

Pedunculis elongatis.

1. *V. pistiformis*, pedunc. multifloris, pe-
tiolis polyphyllis, foliolis ovatis: infimis
sessilibus L. *Iacq. austr.* 4. t. 364.

In sylvis montosis (Siles. Austr. Palat. Her-
cyn. Saxon. Nassov. Hannov. Tubing. Lips. —)
Fl. Iul. Aug.

* 2. *V. dumetorum*, pedunc. multifloris,
foliolis reflexis ovatis mucronatis, stipulis
subdentatis L.

In nemorosis, montosis (Siles. Bav. Hercyn.
Saxon. Hannov. Holsat. Lips. Tubing. Helmstad.
Fuld. Barbi, Ratisb. etc.) Fl. Iun. Iul.

3. *V. sylvatica*, pedunc. multifloris, fo-
liol. ovalibus, stipulis denticulatis L. *Fl.*
dan. t. 277.

In sylvis montosis (Siles. Austr. Carn. Bavar.
Hercyn. Nassov. Holsat. Barbi, Tubing. —) Fl.
Iun — Aug.

* 4. *V. cassubica*, pedunc. subsexfloris, fo-
liol. denis ovatis acutis, stipulis integris
L. *Fl. dan.* t. 98.

Locis sabulosis, montosis (Bav. Berol. —) Fl. Iun.

* 5.

5. v. *Cracca*, pedunc. multifloris, flor. imbricatis, foliol. lanceolatis pubescentibus, stipulis integris L. *Fl. lond.*

In sepibus, dumetis; fl. Iun — Aug.

6. v. *tenuifolia*, pedunc. multifloris, flor. imbricatis, foliol. linearibus trinerviis acuminatis, stipulis linearibus integris, caule erecto flexuoso ROTH.

In collinis, campis arenosis (Brem. Saxon. Berol. —)

7. v. *multiflora*, pedunc. multifloris, cirrhis polyphyllis, foliol. ovalibus pubescentibus, stipulis semisagittatis integris, caule piloso LEXS.

In nemorosis, montosis (Siles. Austr. Saxon. Palat. Lips. —) Fl. Iun — Aug.

Floribus axillaribus subsessilibus.

8. v. *sativa*, legum. sessilibus subbinatis erectis, fol. retusis, stip. notatis L. *Fl. dan. t. 522.*

Inter segetes, in agris; fl. Iun. Iul.

9. v. *angustifolia*, legum. sessilibus subbinatis erectis, foliol. imis ovatis retusis, superioribus linearibus integerrimis REICH. *Ehrh. herb. 57.*

Inter segetes, locis arenosis; fl. cum priori (cujus var. nigra dicta.)

10. v. *monantha*, pedunc. unifloris aristatis, foliol. lanceolatis obtusis, stip. bifidis RETZ.

In agris (Berol. WILD.) Fl. Maj. Iun.

11. *v. lathyroides*, legum sessilibus solitariis erectis glabris, foliol. senis: inferioribus obcordatis L. *Fl. dan. t. 58.*

In montosis, apricis sabulosis; fl. Apr. Maj.

12. *v. lutea*, legum. sessilibus reflexis pilosis solitariis pentaspermis, corollae vexillis glabris L.

In agris (Palat. Francof. —) Fl. Iun.

* 13. *v. sepium*, legum. pedicellatis subquaternis erectis, foliol. ovatis integerrimis: exterioribus decrescentibus L. *Fl. dan. t. 609.*

In pratis, pomariis, ad sepes; fl. Maj. Iul.

342. ERVUM (Linse) *G. pl. 1188.*

Calyx 5-partitus longitudine fere corollae: laciniis subaequalibus.

1. *E. Lens*, pedunc. subbifloris, semin. compressis convexis L.

Hinc inde in pratis, inter segetes; fl. Iun. Iul.

* 2. *E. tetraspermum*, pedunc. subbifloris, seminibus globosis quaternis L. *Fl. lond.*

In agris, arvis; fl. Iun. Iul. (Dentes superiores reliquis breviores.)

* 3. *E. hirsutum*, pedunc. multifloris, semin. globosis binis L. *Fl. dan. t. 639.*

Inter segetes, in agris, pratis; fl. Iun. Iul.

4. *E. monanthos*, pedunc. unifloris L.

In agris (Bay. Saxon. Nassov. Lips. Ratisb. etc.) Fl. Iun. Iul. (Corollis, legumine, seminibus prioribus majoribus.)

5. *E. soloniense*, pedunc. subbifloris aristatis, petiolis acuminatis, foliol. obtusis L.

In apricis arenosis, inter segetes (Lips. BAUMG.) quasi sponte; fl. Maj. Iun.

† 6. *E. Ervilia*, germinibus undato-plicatis; fol. impari-pinnatis L.

In agris, inter Lentem (Nassov. Lips. —) quasi sponte; fl. Iun.

343. *CYTISUS* (Geisklee) *G. pl.* 1191.

Calyx bilabiatus; legumen basi attenuatum.

1. *c. Laburnum*, racem. simplicibus pendulis; foliol. ovato-oblongis L. *Iacq. austr.*

4. *t.* 306.

In montosis, dumetis (Austr. Bavar? Carn. prope Saalfeld, Pirna RUPP. — ad arcem Grubenhagen EHRH. — Ratisb. HOPPE.) Fl. Maj. Iun.

* 2. *c. nigricans*, racemis simplicibus erectis, foliol. ovato-oblongis L. *Iacq. austr.*

4. *t.* 387.

In sylvis montosis (Siles. Austr. Bavar. Carn. Bohem. Tubing. Fuld. Ratisb. —) Fl. Iul. Aug.

3. *c. hirsutus*, pedunc. simplicibus lateralibus, calyc. hirsutis trifidis obtusis ventricoso-oblongis L.

In sylvis montosis, pratis (Austr. Carn. Siles. Tubing. —) Fl. Iun.

4. *c. capitatus*, flor. umbellatis terminalibus, ramis erectis, foliol. ovatis L. *Iacq. austr. t.* 33.

In nemorosis montosis, siccis (Siles. Austr. Carn. — Ratisb. HOPPE, herb. cent. 1. 20.) Fl. Iul. Aug.

5. *c. austriacus*, flor. umbellatis terminalibus, caul. erectis, foliol. lanceolatis L. Jacq. austr. t. 21.

Ad vias, in montanis (Siles. Austr. —) Fl. Iun. Iul.

6. *c. supinus*, flor. pedunculatis subbinatis, fol. villosis, caulib. decumbentibus frutescentibus L. Hoppe, ect. t. 46.

In nemorosis, montosis (Siles. Bav. Austr. Carn. — Ratisb. HOPPE, herb. cent. 1. 41.) Fl. Apr. Maj.

344. COLUTEA (Blasenschote) G. pl. 1196.

Cal. 5-fidus; legumen inflatum basi superiore dehiscens.

1. *c. arborescens*, arborea foliol. obcordato-oblongis, stipulis lanceolatis, racemis hirsutis; legum. apice clausis ROTH.

In montosis (Carn. Saxon. Ien. — Ratisb. HOPPE, FUNK.) Fl. Maj. Iun.

2. *c. orientalis*, arborescens, fol. obcordatis rotundis subramosis, stipulis minimis denticularibus, racemis glabris; legum. apice superne hiantibus ROTH.

In vineis (Saxon. ad Hoenstaedt LEYS.) Fl. Maj. Iun.

345. CORONILLA (Peltsche) G. pl. 1198,

Cal. 2-labiatus; vexillum vix alis longius; legumen isthmis interceptum.

1. *c. Emerus*, fruticosa, pedunc. subtrifloris, corollarum unguibus calyce triplo longioribus, caule angulato L.

In montosis (Austr. Carn. Bavar? Suev?)

2. *c. coronata*, fruticosa, foliol. novenis obovatis: internis cauli approximatis, stipula oppositifolia bipartita L. *Iacq. austr.* t. 95.

In montosis (Austr. Bav. Carn. — Tubing. Gmel. Hildes. Steigerthal. Ehrh.)

† 3. *c. minima*, suffruticosa procumbens, foliol. novenis ovatis, stipula oppositifolia emarginata; legum. angulatis nodosis L. *Iacq. austr.* 3. t. 271.

In sylvaticis, montosis (Austr. — Helmstad. Cappel.) Fl. Iul.

* 4. *c. varia*, herbacea, legum. erectis teretibus torosis numerosis, foliol. plurimis glabris L. *Hoppe, act.* 106.

In agris, versuris, ad sepes (Austr. Carn. Siles. Bohem. Bavar. Palat. Saxon. etc.) Fl. Iul. Aug.

346. ORNITHOPUS (Vogelfuss) G. pl. 1199.

Legumen articulatum teres arcuatum.

1. *o. perpusillus*, fol. pinnatis; legum. incurvatis (bractea majoribus) L. *Fl. dan.* t. 730.

In agris, arvis (Siles. Bav. Palat. Holsat. Saxon. etc.) Fl. Iun. Iul.

2. *O. intermedius*, caulibus repentibus longissimis, fol. pinnatis, bractea pinnata, legum. incurvatis majore ROTH.

In locis depressis, argillosis (Brem. Oldenb.)—

347. HIPPOCREPIS (Pferdehuf) *G. pl.* 1200.

Legumen compressum altera sutura pluries emarginatum, curvum.

H. comosa, legum. pedunculatis confertis arcuatis: margine exteriori repandis L. *Ehrh. herb.* 48.

In montosis, siccis, apricis (Austr. Siles. Carn. Bav. Palat. Saxon. Lips. etc.) Fl. Maj — Iul.

348. HEDYSARUM (Hahnenkopf) *G. pl.* 1204.

Cor. carina truncata: ungue bifida; legumen articulis monospermis.

H. Onobrychis, fol. pinnatis; legum. 1-spermis aculeatis, coroll. alis calycem aequantibus, caule elongato L. *Iacq. austr. t.* 38.

In campis, collibus, apricis; fl. Iun. Iul.

349. GALEGA (Geisranthe) *G. pl.* 1206.

Cal. dentibus subulatis subaequalibus; legumen striis obliquis, seminibus interjectis.

† *G. officinalis*, legum. strictis erectis; foliol. lanceolatis striatis nudis L.

Ad versuras (Siles. Megap. Francof. Helmstad. —) Fl. Iun. Iul.

350. *ASTRACALUS* (Tragant) *G. pl.* 1208.

Legumen biloculare, gibbum.

1. *A. pilosus*, caulescens erectus pilosus, flor. spicatis; legum. subulatis pilosis L. *Iacq. austr. t.* 51.

In montosis (Austr. Thuring. Hal. Saxon. —)

2. *A. galegiformis*, caulescens strictus glaber, flor. racemosis pendulis; legum. triquetris utrinque mucronatis L.

In montosis (Bavar. *SCHRANK.*) Fl. Iun. Iul.

3. *A. Onobrychis*, caulescens erectus pubescens, flor. spicatis, vexillis duplo-longioribus; stipulis solitariis L. *Iacq. austr. t.* 38.

Ad vias, in pratis (Austr. Carn. Palat. —) Fl. Maj. Iun.

4. *A. Cicer*, caulescens prostratus; legum. subglobosis inflatis mucronatis pilosis L. *Iacq. austr. 3. t.* 251.

In pratis, ad sepes (Austr. Siles. Bavar. Saxon. Megap. Barbi, Lips. Ien. Ratisb. Helmstad. —) Fl. Iun. Iul.

5. *A. microphyllus*, caulescens erecto-patulus, foliol. ovalibus; calyc. tumidiusculis, legum. subrotundis L.

In sylvis montosis (Hercyn. Thuring.) —

6. *A. glycyphyllos*, caulescens prostratus; legum. subtriquetris arcuatis; foliol. ovalibus pedunculo longioribus L.

In nemorosis, montosis, agris, ad sepes; fl. Iun — Aug.

7. *A. Danicus*, caulescens decumbens hirtus, capitulis longe pedunculatis; legum. brevibus inflatis pilosis RETZ. *Fl. dan.* t. 674. *Ehrh. herb.* 9.

In collibus, versuris, ad margines agrorum (Saxon. Barbi, Ien. — Brunsvig. POTT. prope Steigerthal EHRH.)

8. *A. arenarius*, caulescens ramosus erectus tomentoso. albus, foliol. complicatis, pedunc. subquadrifloris RETZ. 2, 3. t. 3.

In arenosis (Siles. Berol. Lips. —) *Fl. Iun. Iul.*

† 9. *A. campestris*, acaulis, calyc. leguminibusque villosis, foliol. lanceolatis acutis, scapo decumbente L.

In montosis (Bohem. Francof. ad Viadr.) —

10. *A. exscapus*, acaulis exscapus; legum. lanatis, fol. villosis L. *Jacq. plant. rar.*

Thuring. SCHREB. Saxon. LEYS. *Fl. Maj. Iun.*

351. TRIFOLIUM (Klee) *G. pl.* 1211.

Flores subcapitati; legumen vix calyce longius, non dehiscens, deciduum.

Meliloti, legum. nudis polyspermis.

1. *T. M. caerulea*, racemis ovatis, legum. seminudis mucronatis; caule erecto, spicis oblongis L.

In hortis viridariis, montanis (Siles. Bohem. —) *Fl. Iul.*

* 2. *t. m. officinalis*, legum. racemosis nudis dispermis rugosis acutis, caule erecto L. *Bull. t.* 255.

In pratis, pascuis, ad vias, sepes; fl. Iul. Aug.

Lotoidea, legum. tectis, polyspermis.

3. *t. strictum*, capit. globosis, legum. dispermis, calyc. longitudine corollae, foliol. serrulatis, stipulis rhombeis L.

In collibus, rupibus sterilibus (prope Crellwitz ad Hal. Saxon. ROTH.)

* 4. *t. hybridum*, capit. umbellaribus, legum. tetraspermis; caule adscendente L. *Ehrh. phyt.* 26.

In pratis, pascuis; fl. Iul. Aug.

* 5. *t. repens*, capit. umbellaribus, legum. tetraspermis; caule repente L. *Fl. lond.*

In pratis, pascuis, aggeribus; fl. Maj — Aug. (Var. vivipara.)

Lagopoda, calyc. villosis.

* 6. *t. rubens*, spicis villosis longis, corollis monopetalis; caule erecto, fol. serrulatis L. *Iacq. austr.* 4. t. 385.

In nemorosis montanis, ad margines viarum (Siles. Austr. Bav. Palat. Saxon. Thuring. Barbi, Tubing. Hannov. Lips. Helmstad. etc.) Fl. Iun. Iul.

* 7. *t. pratense*, spicis globosis subvillosis cinctis stipulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis L.

In pratis, pascuis; fl. Iun — Aug.

8. *T. alpestre*, spicis subglobosis villosis terminalibus, caule erecto, fol. lanceolatis serrulatis L. *Iacq. austr.* 5. t. 433.

In nemorosis, montosis; fl. aestate.

9. *T. flexuosum*, spicis subglobosis villosis terminalibus, caule adscendente flexuoso ramosissimo, foliol. ovato-lanceolatis serrulatis *Iacq. austr.* 4. t. 386.

In pascuis argillosis, montosis, sylvaticis (Siles. Austr. Bav. Brem. Ratisb. — Norimb. PANZER.) Fl. Iun. Iul.

10. *T. ochroleucum*, spicis villosis, caule erecto pubescente, foliol. infimis obcordatis L. *Iacq. austr.* t. 40.

In sylvaticis, montosis (Siles. Austr. — Norimb. PANZER.) Fl. Iul. Aug.

11. *T. angustifolium*, spicis villosis conico-oblongis, dentibus calycinis setaceis subaequalibus, foliol. linearibus L.

In pascuis siccis (Carn. Nassov.—) Fl. Iul. Aug.

12. *T. arvense*, spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis villosis aequalibus L. *Fl. dan.* 724.

In agris, arvis; fl. Iul. Aug.

13. *T. scabrum*, capitulis sessilibus lateralibus ovatis, calyc. laciniis inaequalibus rigidis recurvis L. *Vaill.* t. 33. fig. 1.

In pascuis aridis, ad vias (Carn. Palat. Saxon. Barbi —) Fl. Iun.

14. *T. striatum*, capit. sessilibus sublateralibus ovatis, calyc. striatis rotundatis L. *Ehrh. herb.* 88.

In pascuis aridis, collinis (Siles. Nasso. Brem. Hannov. Hildes. —) Fl. Iun. Iul.

Vesicaria, calyc. inflatis ventricosus.

15. *T. resupinatum*, spicis subovatis, corollis resupinatis, calyc. inflatis dorso gibbis; caulib. prostratis L.

In humidis, paludosis (Siles. Tubing.) —

16. *T. fragiferum*, spic. subrotundis, calyc. inflatis bidentatis reflexis; caulib. repentibus L. *Fl. lond.*

In pascuis, ad vias; fl. Iul. Aug.

Lupulina, vexillis corollae inflexis.

* 17. *T. montanum*, spicis subimbricatis subtribus, vexillis subulatis emarcescentibus, calyc. nudis, caule erecto L.

In pratis, montanis; fl. Maj — Aug.

* 18. *T. agrarium*, spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calyc. nudis; caule erecto L. *Ehrh. herb.* 29. *Fl. lond.*

In agris, arvis; fl. Iul — Sept. (Hujus loci *Trif. aureum*, POLL.)

* 19. *T. spadiceum*, spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus; calyc. pilosis; caule erecto L. *Ehrh. herb.* 19.

In montosis, siccis; fl. Iun. Iul.

* 20. *T. procumbens*, spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus; caulib. procumbentibus L. *Fl. dan.* 796.

In arvis, pascuis; fl. Iun. Iul.

* 21. *T. filiforme*, spicis subimbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calyc. pedicellatis; caulib. procumbentibus L. *Ehrh. herb.* 49.

In pratis, pascuis, montosis (Siles. Nassov. Holsat. Saxon. Brem. Hannov. Lips. etc.) Fl. Iul. Aug.

352. LOTUS (Schotenklee) *G. pl.* 1212.

Cal. tubulosus; corollae alae sursum longitudinaliter conniventes; legumen striatum cylindricum.

1. *L. maritimus*, legum. solitariis membranaceo-quadrangulis: fol. glabris, bracteis lanceolatis L. *Fl. dan.* 800.

In pratis humidis, turfosis (Siles. — Lips. IAHN, BAUMG.) ad salinas (Hal. Saxon.) Fl. Iun. Iul. (Tetragonolobus maritimus, ROTH.)

2. *L. siliculosus*, legum. solitariis membranaceo-quadrangulis; caul. procumbentibus, fol. subtus pubescentibus L. *Iacq. austr.* 4. t. 361.

In pratis subhumidis (Austr. Palat. Carn. Bav. Saxon. Barbi, Erford. Tubing. Fuld. — in monte Asse EHRH.) Fl. Iun. Iul. (Tetrag. siliq. ROTH.)

† 3. *L. hirsutus*, capitulis subrotundis, caule erecto hirto; legum. ovatis L.

Bavar. (SCHANK.) Fl. aestate.

*4. *L. corniculatus*, capit. depressis, caulib. decumbentibus; legum. cylindricis patentibus L. *Fl. lond.*

In versuris, pratis, campis arenosis; fl. Iun — Aug. (Var. *tennifolia*, *hirsuta*.)

†5. *L. cytisoides*, capit. dimidiatis, caule diffuso ramosissimo, fol. tomentosus L.

In montosis, sterilibus (Tubing. GMEL.) —

6. *L. Dorycnium*, capit. aphyllis, fol. sessilibus quinatis L.

Ad vias, locis incultis (Austr. Bavar. Carn.—) Fl. aestate.

353. TRIGONELLA (Trigonelle) *G. pl.*
1213.

Vexillum et alae subaequales patentes, forma corollae 3 - petalae.

†1. *T. corniculata*, legum. pedunculatis congestis declinatis subfalcatis, pedunculo longo subspinoso, caule erecto L.

In sylvis (Tubing. GMEL.) —

2. *T. Foenum graecum*, legum. sessilibus strictis erectiusculis subfalcatis acuminatis caule erecto L.

In agris, locis incultis (Siles. — Ien. RUPP.) Fl. aestate.

354. MEDICAGO (Schneckenklee) *G. pl.*
1214.

Carina corollae a vexillo deflectens; legumen compressum cochleatum, arcuatum.

* 1. *M. sativa*, pedunc. racemosis, legum. contortis; caule erecto glabro L.

In pratis montosis, hinc inde quasi sponte; fl. Iun. Iul.

* 2. *M. falcata*, pedunc. racemosis, legum. lunatis; caule prostrato L. *Fl. dan. t. 233.*

In agris, pratis, ad vias; fl. Iun. Iul.

* 3. *M. lupulina*, spicis ovalibus, legum. reniformibus monospermis; caulib. procumbentibus L. *Fl. lond.*

In pratis, pascuis; fl. Iun. Iul.

4. *M. ciliaris*, legum. congestis globosis hispidis, stipulis ciliatis L.

In sterilibus (Siles. KROCK.) Fl. Maj. Iun.

5. *M. rigidula*, triphylla, legum. cochleatis spinosis; foliol. inferioribus cuneiformibus retusis, superioribus subrotundis L.

Circa arcem Regenstein (WEB.) —

6. *M. minima*, legum. cochleatis, aculeis uncinatis alternis externe donatis; stipulis integris L.

Inter segetes, locis montosis; fl. Maj. Iun.

7. *M. nigra*, pedunc. paucifloris, legum. cochleatis, hamulis longitudine leguminum L.

In sterilibus, glareosis (Siles. KROCK.) Fl. Maj. Iun.

Classis XVIII.

POLYADELPHIA

POLYANDRIA.

355. HYPERICUM (Hartheu) G. pl.
1224.

Cal. 5-partitus; petala 5; filamenta basi in fasciculos 3-5 connata; caps. 3-5-locularis.

* 1. H. *quadrangulare*, flor. trigynis, caule quadrato herbaceo L. *Fl. lond.*

In pratis humidis, locis montosis; fl. Iul. Aug.

* 2. H. *dubium*, flor. trigynis, caule subquadrato herbaceo, fol. ovatis; calyc. obtusissimis LEERS.

Ad vias, sepes, hinc inde; fl. Iul. Aug.

* 3. H. *perforatum*, flor. trigynis, caule ancipiti, fol. obtusis pellucido-punctatis L. *Fl. lond.*

In pratis, pascuis, versuris; fl. Iul. Aug. (Folia etiam aliarum specierum saepius pellucido, punctata, facilius petalis oblique truncatis crenulatis puncto atro inter crenam notatis distinguitur. Var. foliis cauleque maculatis.)

* 4. H. *humifusum*, flor. trigynis axillari-bus solitariis, caulib. ancipitibus prostratis filiformibus, fol. glabris L. *Fl. lond.*

In pratis, pascuis arenosis, inter segetes (Var. *erecta*, ROTH.) fl. Iul. Aug.

* 5. *H. montanum*, flor. trigynis, calyc. serrato - glandulosis; caule tereti erecto, fol. ovatis glabris L. *Fl. dan. t.* 173.

In montanis, sepibus, nemoribus; fl. Iul. Aug.

* 6. *H. hirsutum*, flor. trigynis, calyc. serrato - glandulosis, caule tereti erecto, fol. ovatis subpubescentibus L. *Fl. dan. t.* 802. *Fl. lond.*

In nemorosis, umbrosis; fl. Iun. Iul.

7. *H. pulchrum*, flor. trigynis, calyc. serrato - glandulosis, caule tereti, fol. amplexicaulibus cordatis glabris L. *Fl. lond.*

In pratis, sylvis elatioribus; fl. Iun — Aug.

8. *H. elodes*, fol. trigynis, caule tereti repente foliisque villosis subrotundis L. *Ehrh. herb.* 10.

Locis humidis, paludosis (Westphal. prope Ibbenbühren, Hannov. EHRH.) Fl. Aug. Sept.

Classis XIX.

S Y N G E N E S I A

POLYGAMIA AEQUALIS.

356. TRACOPOGON (Bocksbart) *G. pl.* 1229.

Cal. simplex: laciniis basi coalitis; recept. nudum; pappus stipitatus plumosus.

* 1. *T. pratense*, calyc. corollae radium aequantibus; fol. integris strictis L. *Bull. t.* 209.

In pratis, pascuis, aggeribus; fl. Maj — Iul.

2. *t. majus*, calyc. corollae radio longioribus, fol. integris strictis, pedunc. superne incrassatis; corollulis ad apicem rotundatis L. *Iacq. austr. t. 29.*

In pascuis (Siles. Austr. Berol. —) Fl. Iul.

3. *t. porrifolium*, calyc. corollae radio longioribus; fol. integris strictis; pedunc. superne incrassatis; corollulis angustissimis truncatis L. *Fl. dan. t. 797.*

In pratis, nemorosis (Siles. Megap. Brem. Saxon. Francof. —) Fl. Iun.

357. SCORZONERA (Skorzonere) G. pl. 1230.

Cal. imbricatus squamis margine scariosis; receptaculum nudum; pappus plumosus.

* 1. *s. humilis*, caule subnudo unifloro, fol. lato - lanceolatis nervosis planis L. *Fl. dan. t. 816.*

In pratis, pascuis, nemorosis; fl. Apr. Maj. (Var. caule ramoso; fol. lanceolatis.)

2. *s. hispanica*, caule ramoso, fol. amplexicaulibus integris serrulatis L.

In montosis, viridariis quasi sponte (Siles. Francof. Lips. —) Fl. Iun. Iul.

3. *s. graminifolia*, fol. lineari - ensiformibus, integris carinatis L.

In montosis, sylvis (Siles. Holsat. Gött. Lips. —) Fl. Maj - Aug.

4. s.

4. *s. purpurea*, fol. lineari-subulatis integris canaliculato-triquetris, pedunc. cylindricis L. *Iacq. austr. t. 35.*

In pratis montanis (Siles. Carn. Austr. Bavar. Saxon. Barbi, Berol. —) Fl. Maj. Iun.

5. *s. angustifolia*, fol. subulatis integris, pedunc. incrassato, caul. basi villosa L.

In collibus, sylvaticis (Austr. Carn. Holsat. Barbi —) Fl. Maj.

6. *s. laciniata*, fol. linearibus dentatis acutis, caule erecto; calyc. squamis patulo-mucronatis L. *Iacq. austr. t. 356.*

In pratis montanis, ad vias (Siles. Austr. Bavar. Holsat. Palat. Saxon. Barbi, Gött. —) Fl. Iun.

7. *s. taraxacifolio*, fol. runcinatis petiolatis, scapo ramoso aphylo L. *Iacq. icon. rar.*

Bohem. (BOUCHARD.) Fl. Iun — Aug. (Scorz. Taraxaci ROTH. videtur Leontod. salinum, POLL. EHRH.)

+8. *s. lanata*, fol. lanceolatis nervosis planis, scapo lanato SCHRANK.

In pratis (Bavar. —) Fl. Maj. Iun.

358. PICRIS (Bitterkraut) G. *pl. 1231.*

Cal. calyculatus; pappus plumosus; semina transversim sulcata; recept. nudum.

P. *Hieracioides*, perianthiis laxis, fol. integris, pedunc. squamatis in calycem L.

In pratis, pomariis, versuris; fl. Iul. Aug (Pappus sessilis.)

359. APARGIA () G. pl. 1232.

Cal. imbricatus squamis incumben-
tibus; recept. nudum s. subvillosum; pappus sessilis plumosus.

* 1. *A. hastilis*, scapo calyceque laevi, fol. lanceolatis dentatis integerrimis glabris *Iacq. austr. 2. t. 164.*

In pratis humidis (Siles. Austr. Carn. Bavar. Bohem. Palat. etc.) Fl. Iun. Iul. (*Leontodon hastile* L.)

2. *A. autumnalis*, caule ramoso, pedunc. squamosis, fol. lanceolatis dentatis integerrimis glabris.

In pratis, pascuis; fl. Aug. Sept. (*Leont. autumnale* L.)

* 3. *A. hispida*, scapo nudo unifloro, fol. dentatis integerrimis hispidis: setis furcatis. *Fl. dan. t. 862.*

In pratis, pascuis, versuris; fl. aestate. (*Leont. hispidum* L. *Fl. lond.*)

* 4. *A. hirta*, calyce subnudo, fol. dentatis hirtis: setis simplicibus.

In pratis, paludosis; fl. Iul. (Caute a priori cui valde similis distinguenda. *Leont. hirtum* L.)

* 5. *A. incana*, fol. integerrimis subdentulatis lanceolatis scabris, scapo unifloro. *Iacq. austr. 3. t. 287.*

In montanis, pratis (Carn. Austr. Bav. Palat. etc.) Fl. Iun. Iul. (*Hierac. incanum* L.)

360. SONCHUS (Gänsedistel) G. pl. 1233.

Cal. imbricatus, basi ventricosus; receptac. nudum; pappus capillaris sessilis.

1. *s. maritimus*, pedunc. nudo, fol. lanceolatis amplexicaulibus indivisis retrorsum argute dentatis L.

Locis humidis (Siles. KROCK. prope Vegesack Duc. Brem. ROTH.) Fl. aestate.

2. *s. palustris*, pedunc. calycibusque hispidis subumbellatis, fol. runcinatis basi aristatis L. *Fl. lond.*

Ad ripas, fossas, locis paludosis; fl. Iul. Aug.

* 3. *s. arvensis*, pedunc. calycibusque hispidis subumbellatis, fol. runcinatis basi cordatis L. *Fl. lond.*

In agris, inter segetes; fl. Iun — Aug.

4. *s. oleraceus*, pedunc. tomentosus, calyc. glabris L. *Fl. lond.*

In agris oleraceis, ad sepes; fl. Iul. Aug. (Var. laevis; aspera: calyc. setis rigidis adspersis, fol. rigidis. Fl. dan. t. 843.)

+ 5. *s. alpinus*, pedunc. squamosis, floribus racemosis, fol. runcinatis L.

In alpinis, subalpinis, etiam nemorosis montosis (Siles. Carn. Bav. — Hercyn. Saxon. —) Fl. Iul. (Ex observatione cel. SMITH. *Sonchus alpinus* in Europaeis alpebus occurrens est *Sonchus canadensis* L.)

361. LACTUCA (Lattich) G. pl. 1234.

Cal. cylindricus imbricatus: squamis margine membranaceis; receptac. nudum; pappus stipitatus capillaris; sem. laevia.

276 SYNCENESIA POLYGAMIA AEQUALIS.

1. *L. quercina*, fol. runcinatis denticulatis acutis, subtus laevibus, caule glabro L.

In nemorosis, montosis (Siles. Saxon. Barbi —) Fl. Iul. Aug.

† 2. *L. sativa*, fol. rotundatis, caulinis cordatis, caule corymboso L.

Hinc inde quasi sponte; fl. aestate.

* 3. *L. Scariola*, fol. verticalibus carina aculeatis L.

In ruderatis, montanis, ad margines agrorum (Siles. Palat. Bavar. Megap. Saxon. Hannov. Gött. Barbi, Berol. Fuld. Ratisb. etc.) Fl. Aug.

4. *L. virosa*, fol. horizontalibus, carina aculeatis dentatis L.

Ad sepes, fossas (Siles. Carn. Saxon. Ratisb. Gött. Isenac. Helmstad. Lips. —) Fl. Iul. Aug.

5. *L. saligna*, fol. hastato-linearibus sessilibus carina aculeatis L. *Rupp*, t. 4.

Ad vias, salinas, agrorum margines (Siles. Austr. Palat. Saxon. Barbi, Lips. Ien. Hannoveriae —) Fl. Iul. Aug.

* 6. *L. perennis*, fol. linearibus dentato-pinnatis: laciniis sursum dentatis L.

In montosis, vineis, nemorosis (Siles. Carn. Bav. Palat. Saxon. Ratisb. Tubing. etc.) Fl. Iun — Aug.

362. CHONDRILLA (Chondrille) G. pl.
1235.

Cal. calyculatus; flosculi multiplici serie; recept. nudum; sem. muricata; pappus stipitatus capillaris.

* G.

* *C. juncea*, fol. radicalibus runcinatis :
caulinis linearibus integris L. *Iacq. austr.*
5. t. 427.

In agris, ad vias; fl. Iul. Aug.

363. *PRENANTHES* (Hasenstrauch) *G. pl.*
1236.

Cal. calyculatus; flosculi simplici serie;
recept. nudum; pappus capillaris substipitatus: sem. cordata.

1. *P. viminea*, foliorum ramentis cauli
adnatis L. *Iacq. austr. t. 9.*

In montosis, sylvaticis (Siles. Austr. —) Fl.
Iun. Iul.

* 2. *P. purpurea*, flosculis quinis, fol.
lanceolatis denticulatis L. *Iacq. austr. 4.*
t. 307.

In umbrosis, montosis (Siles. Bohem. Austr.
Carn. Bav. Palat. Tubing. Fuld. Ratisb. Lips. —)
Fl. Iul. Aug.

* 3. *P. muralis*, flosculis quinis runcinatis
L. *Fl. dan. t. 509. Fl. lond.*

In sylvis, locis ruderatis; fl. Iul. Aug.

364. *LEONTODON* (Löwenzahn) *G. pl.*
1237.

Cal. imbricatus oblongus; squamis exte-
rioribus tandem reflexis; recept. nudum
punctatum; pappus stipitatus capillaris.

* 1. *L. Taraxacum*, calyce squamis infer-
ne reflexis, fol. runcinatis denticulatis lac-
vibus L. *Bull. t. 217.*

In pratis, pascuis, versuris; fl. Apr — Mai.

278 SYNGENESIA POLYGAMIA AEQUALIS.

† 2. *L. salinum*, calyce toto erecto laevi; fol. carnosius oblongis obtusis denticulatis glabris, scapo unifloro POLL.

In pratis (Palat. Siles? Bav.? —) Fl. Maj.

† 3. *L. erectum*, calyce toto erecto marginato; fol. pinnatis acutis denticulatis, scapo unifloro, superne villosa MAYER.

In pratis (Bohem. Siles? Bavar. —) Fl. Iun.

365. *HIERACEUM* (Habichtskraut) *G. pl.*
1238.

Cal. imbricatus ovatus; recept. nudum; pappus capillaris sessilis.

Scapo nudo.

† 1. *H. alpinum*, fol. oblongis integris dentatis, scapo subnudo unifloro; calyce piloso L. *Fl. dan. t.* 27.

In montosis, subalpinis (Siles. Carn. Bav. Austr. — Hercyn. Tubing. —) Fl. Iun. Iul. (*H. alpinum dentatum*, Ehrh. herb. 89, in Bructero.)

* 2. *H. Pilosella*, fol. integris ovatis subtus tomentosis, stolonibus repentibus, scapo unifloro L. *Bull. t.* 279. *Fl. lond.*

In campis, locis siccis; fl. Iun — Aug.

* 3. *H. dubium*, fol. integris ovato-oblongis, stolonibus repentibus, scapo nudo multifloro L.

In pascuis, pratis; fl. Maj — Iul.

* 4. *H. Auricula*, fol. integerrimis lanceolatis, stolonibus repentibus, scapo nudo multifloro L.

In campis, pascuis; fl. Maj - Iul.

5. *H. cymosum*, fol. lanceolatis integris pilosis, scapo subnudo basi piloso, floribus subumbellatis L. *Fl. dan. t. 810.*

In pascuis, arvis montanis; fl. Maj. Iun.

6. *H. incarnatum*, fol. radicalibus obovato-oblongis repando-denticulatis hirsutis, scapo multifloro WULF. *Scop. t. 50.* (*H. montanum.*)

In montosis (Carinth. Carn. —) Fl. Iun. Iul.

* 7. *H. praemorsum*, fol. ovatis subdentatis, scapo nudo ramoso, floribus superioribus primoribus L.

In montosis, sylvaticis (Siles. Bav. Hercyn. Palat. Ratisb. Ien. Tubing. —) Fl. Iun - Aug. (Var. *H. lactucaceum*, SCHRANK.)

Caule folioso.

† 8. *H. porrifolium*, caule ramoso folioso, fol. lanceolato-linearibus subintegerrimis L. *Iacq. austr. 3. t. 286.*

In alpinis (Siles. Austr. Bavar.) montosis (Tubing. GMEL.)

9. *H. saxatile*, caule ramoso glabro, fol. omnibus lineari-lanceolatis acuminatis dentatis, radicalibus pilosis IACQ. *obs. 2. t. 50.*

In saxosis, montosis, sylvaticis (Siles. Austr. —) Fl. Iul. Aug. (Nec adhuc sententiam muto, dum ab *H. porrifolio* specie diversum credo IACQ. coll. 1. p. 159.)

10. *H. chondrilloides*, caule ramoso, fol. caulinis elongato-dentatis glabris, radicalibus lanceolatis integris L. *Iacq. austr.* 5. t. 429.

In montosis, subalpinis (Siles. Austr. Bavar. — Saxon.) Fl. Iul. Aug.

* 11. *H. murorum*, caule ramoso, fol. radicalibus ovatis dentatis, caulino minori L.

In muris, rupibus; fl. Maj — Aug. (Planta polymorpha; var. pilosissima, maculata.)

12. *H. sylvaticum*, caule ramoso folioso, fol. radicalibus ovatis petiolatis, caulinis sessilibus, pedunc. multifloris GOUAN.

In sylvaticis; fl. Iun. Iul. (Prioris varietas, vid. cel. DE LA CHENAL emendat. in nov. act. helvet. vol. 1. p. 270.)

* 13. *H. paludosum*, caule paniculato, fol. amplexicaulibus dentatis glabris; calyc. hispidis L.

In nemorosis paludosis, pratis humidis; fl. Iul.

* 14. *H. sabaudum*, caule erecto multifloro, fol. ovato-lanceolatis dentatis semiamplexicaulibus L. *Fl. dan.* t. 872.

In sylvis, pratis nemorosis; fl. Iul. Aug.

* 15. *H. umbellatum*, fol. linearibus subdentatis sparsis, floribus subumbellatis L. *Fl. dan.* t. 680.

In pascuis siccis; fl. Iul. Aug.

366. CREPIS (Pippau) G. pl. 1239.

Cal. caliculatus squamis deciduis; receptaculum nudum; pappus capillaris.

1. *c. foetida*, fol. runcinato - pinnatis hirtis, petiolis dentatis L.

In ruderalis, ad vias; fl. Maj. Iun.

* 2. *c. tectorum*, fol. lanceolato - runcinatis sessilibus laevibus, inferioribus dentatis L. Fl. lond.

In pratis, pascuis, inter segetes; fl. Iun - Oct.

3. *c. virens*, fol. runcinatis glabris amplexicaulibus; calyc. subtomentosis L.

In agris, pratis (Siles. Bavar. Holsat. Goth. —) Fl. Iun. Iul.

* 4. *c. biennis*, fol. runcinato - pinnatifidis scabris: basi superne dentatis; calyc. muricatis L.

In pomariis, pratis; fl. Iul. Aug.

5. *c. Dioscoridis*, fol. radicalibus runcinatis, caulinis hastatis; calyc. subtomentosis L.

Ad sepes, aggeres, in pascuis (Siles. Bav. Palat. Brem. Lips. Berol. —) Fl. Maj. Iun. (Sem. quam in priori duplo longiora.

367. HYOSERIS (Schweinsalat) G. pl. 1242.

Cal. basi calyculatus squamis brevissimis arctis; recept. nudum; pappus sessilis, paleaceo - aristatus, capillari cinctus; in semin. marginalibus brevissimus.

1. *H. foetida*, scapis unifloris, fol. pinatifidis; semin. nudis L.

In sylvaticis, montosis (Bavar. — Tubing.)
Fl. Iun. (Laps. foetida, SCHRANK.)

† 2. *H. radiata*, scapis unifloris, fol. glabris runcinatis, angulis dentatis: apice laciniatis L.

Tubing. (GMEL.) —

* 3. *H. minima*, caule diviso nudo, pedunc. incrassatis L. *Fl. dan. t. 201.*

In agris, arvis, inter segetes; fl. Iul. Aug.
(Laps. minima, SCHRANK.)

368. HYPOCHAERIS (Ferkelkraut) *G. pl.*
1246.

Cal. imbricatus; receptaculum paleaceum; pappus plumosus.

* 1. *H. maculata*, caul. subnudo: ramo solitario, fol. ovato-oblongis integris dentatis L. *Fl. dan. t. 149.*

In pratis, pascuis montosis; fl. Iun. Iul.

* 2. *H. glabra*, calyc. oblongis imbricatis, caule ramoso nudo, fol. dentato-sinuatis L. *Fl. dan. t. 424. Fl. lond.*

In agris, campis arenosis; fl. Iun. Iul.

* 3. *H. radicata*, fol. runcinatis obtusis scabris, caule ramoso nudo laevi, pedunc. squamosis L. *Fl. dan. t. 150. Fl. lond.*

In pascuis, pratis; fl. Iul.

369. LAPSAMA (Rainkohl) G. pl. 1247.

Cal. calyculatus: squamis tubi octo canaliculatis, baseos sex alternis minimis; receptaculum nudum; pappus nullus.

* L. communis, calyc. fructus angulatis, pedunc. tenuibus ramosissimis L. Fl. lond.

In nemorosis, ad vias, sepes; fl. Maj — Iul. (Calycis squamae rarius exteriora semina amplectuntur.)

370. CICHORIUM (Wegwarte) G. pl. 1251.

Cal. calyculatus; recept. subpaleaceum; sem. coronata pappo subquinquedentato obsolete piloso.

* C. Intybus, flor. geminis sessilibus, fol. runcinatis L. Fl. lond.

Ad vias; fl. Iul. — Sept. (Var. albo et rubro flore.)

371. ARCTIUM (Klette) G. pl. 1253.

Cal. globosus: squamis apice inflexo-hamatis.

* A. Lappa, fol. cordatis inermibus petiolatis L. Fl. lond.

In ruderatis; ad vias; fl. Iul. Aug. (Var. capitulis glabris, tomentos.)

372. CARDUUS (Distel) G. pl. 1254.

Cal. ventricosus, imbricatus squamis spinosis; recept. pilosum; pappus sessilis pilosus.

* 1. *c. nutans*, fol. semidecurrentibus spinosis, floribus cernuis, squamis calycinis superne patentibus L. *Fl. dan.* t. 675.

In ruderatis, ad vias; fl. Iul. Aug.

* 2. *c. acanthoides*, fol. decurrentibus sinuatis, margine spinosis; calyc. pedunculatis solitariis erectis villosis L. *Iacq. austr.* 3. t. 249.

* 3. *c. crispus*, fol. decurrentibus sinuatis, margine spinosis, flor. aggregatis terminalibus: squamis inermibus subaristatis patulis L. *Fl. dan.* t. 621.

In dumetis, sepibus; fl. Iul. Aug.

4. *c. cyanoides*, fol. decurrentibus pinnatifidis linearibus integerrimis inermibus petiolatis, subtus tomentosus L.

In aridis (prope Barbi — Francon. —) Fl. aestate.

* 5. *c. defloratus*, fol. decurrentibus lanceolatis serratis subspinoso-ciliatis nudis, pedunc. longissimis lanuginosis unifloris L. *Iacq. austr.* t. 89.

In nemorosis, montosis (Siles. Carn. Austr. Bav. Saxon. Ien. Tubing. —) Fl. Iun — Sept. (Saepius uniflorus, fol. omnibus semipinnatis, tumque *c. medio* GOUAN. similis LA CHENAL.)

6. *c. marianus*, fol. amplexicaulibus hastato-pinnatifidis spinosis; calyc. aphyllis; spinis canaliculatis duplicato-spinosis L. *Fl. lond.*

In cultis, ruderatis (Siles. Bavar. Carn. Nassov. Brem. Saxon. Megap. etc.) Fl. Iul. Aug.

7. *c. Personata*, fol. decurrentibus ciliato-spinosis, radicalibus pinnatis, caulinis oblongo-ovatis. *Iacq. austr.* 4. t. 348.

In montosis (Siles. Austr. Bav. —) Fl. Iun — Sept. (*Arctium Personata* L. Pappus simplex SCHRANK.)

373. CNICUS (Kratzkrout) *G. pl.* 1255.

Cal. ovatus imbricatus squamis spinosis; recept. planum pilosum (villosum); pappus sessilis plumosus.

* 1. *c. oleraceus*, fol. pinnatifidis carinatis nudis, bracteis concavis integris subcoloratis L. *Fl. dan.* t. 860.

In pratis humidis, ad fossas; fl. Iul. Aug.

2. *c. Erisithales*, fol. amplexicaulibus pinnatifidis aristato-serratis, pedunc. cernuis, calyc. glutinosus L.

In pratis montosis (Siles. Austr. Carn. — Francon? —) Fl. Iul. Aug.

* 3. *c. lanceolatus*, fol. decurrentibus pinnatifidis hispidis: laciniis divaricatis; calyc. ovatis spinosis villosis; caule piloso (L. *Card. lanceolat.*)

In ruderatis, ad vias; fl. Iul. Aug.

* 4. *c. palustris*, fol. decurrentibus dentatis margine spinosis, flor. racemosis erectis, pedunc. inermibus (L. *Card. palustr.*) *Fl. lond.*

In pratis udis, paludosis; fl. Iul. Aug.

5. *c. canus*, fol. decurrentibus lanceolatis eroso-dentatis ciliato-aculeatis, utrinque arachnoideo-subvillosis (L. Card. can.) *Iacq. austr. t. 42.*

In montosis (Siles. Austr. —) Fl. Aug. Sept.

6. *c. tuberosus*, fol. subdecurrentibus petiolatis subpinnatifidis spinosis, caule inermi, flor. solitariis (L. Card. tuberos.)

In pratis humidis, ad fossas (Siles. Bohem. Austr. Palat. Saxon. Barbi, Helmstad. Fuld. etc.) Fl. Jul — Sept.

7. *c. eriophorus*, fol. sessilibus bifariam pinnatifidis: laciniis alternis erectis; calyc. globosis villosis (L. Card. erioph.) *Iacq. austr. 2. t. 171.*

In montosis (Siles. Bav. Austr. Carn. Palat. Saxon. Lips. etc.) Fl. Jul. Aug.

8. *c. serratuloides*, fol. subamplexicaulibus lanceolatis integris: serraturis spinoso-setaceis, pedunc. unifloris (L. Card. serrat.)

In montosis, subalpinis (Siles. Austr. Carn. — Tubing. —) Fl. Jul. Aug.

9. *c. flavescens*, fol. lanceolatis integris inermibus dentatis glabris, flor. aphyllis inermi-spinosis L.

In pratis humidis (Siles. KROCK.) Fl. Jul. Aug.

10. *c. mollis*, fol. pinnatifidis linearibus subtus tomentosis, caule inermi unifloro (L. Card. mollis.) *Iacq. austr. t. 18.*

In pratis, subalpinis (Austr. Carn.) locis arenosis (Palat. —) Fl. Jul. Aug.

* 11. *c. acaulis*, acaulis; calyce glabro
(*L. Card. acaulis.*)

In pascuis, collibus apricis; fl. Iul. Aug.

12. *c. dubius*, caule villosissimo folioso,
pedunc. unifloris, fol. petiolatis pinnatifidi-
dis: pinnis trilobis margine spinosis; ca-
lyc. cylindraceo glabro *WILD. t. 6. fig. 11.*

Ad vias (*Berol. —*) Fl. Iul. Aug.

374. *ONOPORDUM* (*Krebsdistel*) *G. pl.*
1256.

Cal. ventricosus imbricatus: squamis mucronatis; recept. paleaceum: paleis in alveolos coadunatis, semin. brevioribus; pappus capillaris sessilis.

1. *o. Acanthium*, calyc. squarrosus: squamis patentibus; fol. ovato-oblongis sinuatis *L. Fl. lond.*

In ruderatis, ad vias; fl. Iul. Aug.

† 2. *o. illyricum*, calyc. squarrosus: squamis inferioribus uncinatis; fol. lanceolatis pinnatifidis *L.*

Ad muros, vias (*Hal. Saxon. —*) Fl. Iul. Aug.

375. *CARLINA* (*Eberwurz*) *G. pl.* 1258.

Cal. radiatus squamis marginalibus longis coloratis.

1. *c. acaulis*, caule unifloro, flore brevior *L.*

In montosis apricis (*Siles. Carn. Bavar. Saxon. Hercyn. Tubing. Ratisb. Lips. —*) Fl. Aug. Sept.

*2. *c. vulgaris*; caule multifloro corymboso, flor. terminalibus, calyc. radio albo L.

In montosis, asperis, sabulosis; fl. Iul. Aug.

376. *SERRATULA* (Scharte) G. pl. 1264.

Cal. subcylindricus imbricatus squamis lanceolatis acutis.

*1. *s. tinctoria*, fol. lyrato - pinnatifidis: pinna terminali maxima, flosculis conformibus L. *Fl. dan. t. 281.*

In pascuis, pratis; fl. Iul. Aug.

*2. *s. coronata*, fol. lyrato - pinnatifidis: pinna terminali maxima, flosculis radii foemineis longioribus L.

In sylvis, dumetis (Siles. KROCK.) Fl. Iul. Aug.

*3. *s. arvensis*, fol. dentatis spinosis L. *Fl. dan. t. 644.*

In agris, inter segetes; fl. Iul. Aug.

377. *BIDENS* (Zweizahn) G. pl. 1267.

Cal. imbricatus; cor. uniformis; recept. paleaceum; pappus aristis duabus majoribus scabris rectis.

*1. *B. tripartita*: fol. trifidis; calyc. subfoliosis; semin. erectis L. *Fl. lond.*

Locis inundatis, ad fossas; fl. Aug. Sept.

*2. *B. minima*, fol. lanceolatis sessilibus, flor. seminibusque erectis L. *Fl. londt.*

In paludosis, locis humidis (Siles. Bav. Megap. Palat. Holsat. Oldenb. etc.) Fl. Iul. Aug.

*3.

*3. *B. cernua*, fol. lanceolatis amplexicaulibus; flor. cernuis; sem. erectis L. *Fl. lond.*

Locis inundatis; fl. Aug. Sept.

378. *EUPATORIUM* (Alpkraut) *G. pl.* 1272.

Cal. oblongus imbricatus; recept. nudum; styli longissimi ad stamina usque bifidi; pappus capillaris pilosus s. plumosus.

E. cannabinum, fol. digitatis L. *Fl. dan.* t. 745.

Ad ripas, sepes; fl. Iul. Aug.

379. *CHRYSOCOMA* (Goldhaar) *G. pl.* 1275.

Cal. imbricatus; stylus vix Rosculis longior; recept. nudum; pappus capillaris sessilis.

c. *Linosyris*, herbacea, fol. linearibus glabris; calyc. laxis L. *Hoppe, ect.* 559.

In montosis, nemorosis (Siles. Palat. Saxon. Ratisb. Weissenfels, Freyburg, Nauenburg —) Fl. Aug. Sept.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

380. *TANACETUM* (Rheinfarn) *G. pl.* 1280.

Cal. hemisphaericus imbricatus; coroll. radii trifidae; recept. nudum; sem. pappo membranaceo coronata.

* *T. vulgare*, fol. bipinnatis incisis serratis L. *Bull. t.* 157.

Ad sepes, margines agrorum; fl. Iul — Sept.

381. ARTEMISIA (Beifuss) G. *pl.* 1281.

Cal. imbricatus squamis rotundatis conniventibus; coroll. radii nullae; recept. subvillosum; pappus nullus.

* 1. *A. campestris*, fol. multifidis linearibus, caulib. procumbentibus virgatis L. *Ehrh. herb.* 40.

In campis, ad vias; fl. Aug. Sept.

2. *A. maritima*, fol. multipartitis tomentosis, racemis cernuis, flosculis foemineis ternis L.

In maritimis, montosis (Siles. Saxon. Oldenb. Brem. Nordhus. Dantisc. —) Fl. Aug. Sept.

+ 3. *A. rupestris*, fol. pinnatis, caulib. adscendentibus, flor. globosis cernuis; recept. papposo L. *Fl. dan. t.* 801.

In montosis (Siles. Carn. —) Fl. aestate.

4. *A. pontica*, fol. multipartitis subtus tomentosis, flor. subrotundis nutantibus: receptaculo nudo L. *Iacq. austr. t.* 99.

In montosis (Siles. Bohem. Austr. Bav. Palat. Saxon. Lips. —) Fl. Iul. Aug.

* 5. *A. Absinthium*, fol. compositis multifidis, flor. subglobosis pendulis: recept. villosus L. *Hoppe, ect.* 167.

In ruderalis, ad vias; fl. Iul. Aug.

6. *A. vulgaris*, fol. pinnatifidis planis incisis subtus tomentosis, racem. simplicibus recurvatis, flor. radio (sub) 5-floro L. *Bull. t.* 350.

In ruderatis, ad vias; fl. Iul. Aug.

382. GNAPHALIUM (Ruhkraut) *G. pl.*
1282.

Cal. imbricatus squamis marginalibus rotundatis scariosis coloratis; recept. nudum; pappus subpilosus, vel plumosus.

1. *G. Stoechas*, fruticosum, fol. linearibus, corymbo composito, ramis virgatis L.

In aridis, montosis (Siles. Carn. Bav. Bohem. — Helmstad. CAPPEL.) Fl. Iul. Aug.

* 2. *G. arenarium*, herbaceum, fol. lanceolatis, inferioribus obtusis, corymbo composito, caulib. simplicissimis L. *Fl. dan. t.* 641.

In arenosis; fl. aestate.

* 3. *G. luteo - album*, herbaceum, fol. semiamplexicaulibus ensiformibus repandis obtusis utrinque pubescentibus, flor. conglomeratis L. *Ehrh herb.* 118.

Locis arenosis, humidis (Siles. Bavar. Palat. Oldenb. Holsat. Hannov. Barbi, Berol. Norimb. Ratisb. etc.) Fl. Iul — Sept.

* 4. *G. dioicum*, sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici, flor. divisis L. *Bull. t.* 325.

In ericetis, collinis; fl. Iun. Iul.

*5. *G. sylvaticum*, caule herbaceo simplicissimo erecto, flor. sparsis L.

In sylvaticis, nemorosis; fl. Iul — Sept. (Var. flor. sessilibus minoribus: *G. germanicum*, SCHRANK.)

*6. *G. nudum*, caule herbaceo ramoso diffuso, flor. confertis terminalibus nudis.

Locis inundatis; fl. Iul. Aug.

*7. *G. tomentosum*, caule herbaceo ramoso diffuso, flor. confertis terminalibus tomentosus

Locis inundatis, hinc inde cum priori (Sem. pappus tenuis: radiis 6, vel nullis; in priori densus. *G. uligin.* L.)

383. CONYZA (Dürrwurz) *G. pl.* 1286.

Cal. imbricatus: squamis exterioribus patentiusculis; recept. nudum, planum; coroll. radii trifidae; pappus pilosus.

**C. squarrosa*, fol. lanceolatis acutis, caule herbaceo corymboso; calyc. squarrosus L. *Fl. dan. t.* 622.

In collibus, pascuis; fl. Iul. Aug.

384. ERIGERON (Flöhkraut) *G. pl.* 1287.

Cal. oblongus; coroll. radii lineares angustissimae; recept. nudum; pappus pilosus.

*1. *E. canadense*, caule flor. paniculatis hirtis, fol. lanceolatis ciliatis L.

In ruderalis, campis; fl. Iul — Sept.

* 2. *E. acre*, pedunc. alternis unifloris L.
Fl. lond.

In campis, collibus apricis; fl. Iul. Aug.

385. TUSSILAGO (Rosshuf) G. pl. 1289.

Cal. squamae discum aequantes submembranaceae: recept. nudum; pappus capillaris.

* 1. *T. Farfara*, scapo unifloro imbricato, fol. subcordatis angulatis denticulatis L. *Bull. t.* 329.

In agris argillosis; fl. Mart — Maj.

2. *T. alba*, thyrsio fastigiato, flosculis foemineis nudis paucis L. *Fl. dan. t.* 524.

In montosis (Siles. Bav. Hercyn. Barbi —) Fl. Apr. Maj. (Planta polygama, monoico-dioica EHRH.)

* 3. *T. hybrida*, thyrsio oblongo; flosc. foemineis nudis plurimis L.

In pratis humidis; fl. Maj.

4. *T. Petasites*, thyrsio ovato, flosc. foemineis nudis paucis L. *Fl. lond.*

In pratis humidis; fl. cum praecedente Apr. Maj.

5. *T. paradoxa*, thyrsio subovato, flosculis foemineis nudis multis; hermaphroditis ternis, antheris liberis; fol. triangulari-cordatis denticulatis RETZ. 2. t. 3.

Ad fluvium Elbe (Simul cum *T. spuria* quacum conjungit cel. EHRH. — Bav. SCHRANK.) —

386. SENECIO (Kreutzkraut) G. pl. 1290.

Cal. conicus calyculatus, squamis apice sphacelatis: recept. nudum; pappus capillaris.

* 1. *s. vulgaris*, corollis nudis; fol. pinnato-sinuatis amplexicaulibus, flor. sparsis L. *Bull. t.* 197.

In cultis, ruderatis; fl. Apr — Oct.

* 2. *s. viscosus*, coroll. revolutis, fol. pinnatifidis viscidis, squamis calycinis laxis longitudine perianthii L. *Ehrh. herb.* 70.

In collibus, ruderatis; fl. Iul. Aug.

* 3. *s. sylvaticus*, corollis revolutis, fol. pinnatifidis denticulatis, caule corymboso erecto L. *Fl. dan. t.* 869.

In sylvaticis, ruderatis, ad vias; fl. Iul. Aug.

† 4. *s. squalidus*, coroll. radiantibus calyce longioribus integris, fol. pinnatifidis: laciniis linearibus distantibus L.

In pratis (Siles. KROCK.) Fl. Iul. Aug.

* 5. *s. erucifolius*, coroll. radiantibus, fol. pinnatifidis dentatis subhirtis, caule erecto L. *Fl. lond.*

In pratis, pascuis, ad sepes; fl. Iul.

* 6. *s. Iacobaea*, coroll. radiantibus, fol. pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto L. *Fl. dan. t.* 944.

In pratis, pascuis nemorosis; fl. Iul. Aug.

7. *s. aquaticus*, coroll. radiantibus, fol. dentatis, radicalibus ovatis, caulinis pinnatifidis: lacinia extima majore HUDS.

In sylvis, dumetis; fl. Iul. Aug. (s. *Barbareaefolius*, KROCK.)

8. *s. tenuifolius*, coroll. radiantibus, fol. omnibus pinnatis: pinnis linearibus, pedunc. corymbosis, caule erecto L. *Iacq. austr.* 3. t. 278.

In montosis (Austr. — Norimb. PANZER.) Fl. Jul. Aug. (Var. *s. Iacob.*?)

9. *s. abrotanifolius*, coroll. radiantibus, fol. pinnato-multifidis linearibus nudis acutis, pedunc. subbifloris L. *Iacq. austr.* t. 79.

In alpinis (Carinth. Austr. Bav.) montosis (Holsat. Erlang? —) Fl. Aug. Sept.

10. *s. alpinus*, coroll. radiantibus, fol. cordatis lyratis grosse serratis, petiolis auritis L.

In alpinis, montosis (Siles. Austr. Bav. Saxon. etc. Var. *helenitis*, in aquosis Saxon.) Fl. Jun — Aug.

* 11. *s. paludosus*, coroll. radiantibus, fol. ensiformibus acute serratis subtus subvillosis, caule stricto L. *Fl. dan.* t. 385.

In pratis paludosis (Siles. Bav. Palat. Saxon. Hannov. Barbi, Berol. Helmstad. etc.) Fl. Jun. Jul.

* 12. *s. nemorensis*, coroll. radiantibus octonis, fol. lanceolatis biserratis subtus villosis, caule ramoso L. *Iacq. austr.* 2. t. 184.

In nemorosis montosis (Siles. Austr. Bav. Palat. Saxon. Helmstad. Barbi, Gött. etc.) Fl. Jun. Jul.

13. *s. sarracenicus*, coroll. radiantibus, flor. corymbosis, fol. lanceolatis serratis glabriusculis L. *Iacq. austr.* 2. t. 186.

In nemorosis, dumetis; fl. Jul. Aug.

14. s. *Doria*, coroll. radiantibus, flor. corymbosis, fol. subdecurentibus nudis lanceolatis denticulatis, superioribus sensim minoribus L. *Iacq. austr.* 2. t. 185.

In nemorosis montosis (Siles. Austr. Bav. Nass. Helmstad. —) Fl. Iul. Aug.

† 15. s. *Doronicum*, coroll. radiante caule indiviso subunifloro, fol. indivisis serratis: radicalibus ovatis subtus villosis L. *Iacq. austr.* 5. t. 45.

In alpinis (Austr. Tirol. etc.) montosis (Tubing. GMEL.)

387. ASTER (Sternblume) G. pl. 1291.

Cal. imbricatus: squamis inferioribus patulis; recept. nudum; pappus capillaris.

1. A. *Tripolium*, fol. lanceolatis integerrimis carnosis glabris, ramis inaequatis, flor. corymbosis L. *Fl. dan.* t. 615.

Ad ripas fossarum, piscinarum, fluviorum, maritimis locis (Carn. Megap. Brem. Oldenb. Holsat. Saxon. Barbi, Hannov. Lips. Helmstad. Isenac. Gött. etc.) Fl. Iul. Aug. (Var. flor. omnibus tubulosis EHRH.)

2. A. *Amellus*, fol. lanceolatis obtusis scabris trinerviis integris, pedunc. nudiusculis corymbosis, squamis calyc. obtusis L. *Hoppe*, oct. 173.

In montosis, asperis (Siles. Carn. Austr. Bavar. Palat. Saxon. Ratisb. Gött. Ien. Tubing. —) Fl. Aug — Oct.

3. *A. acris*, fol. lanceolato . linearibus strictis integerrimis planis, flor. corymbosis fastigiatis, pedunc. foliosis L.

In montosis apricis (Saxon. Barbi, Lips. —) Fl. Aug.

† 4. *A. annuus*, fol. lanceolatis, inferioribus crenatis, caule corymboso, pedunc. nudis, calyc. hemisphaericis L. *Fl. dan.* t. 486.

In montosis (Siles? Bavar. Wolfenb. — Ratisb. HOPPE. Lips. BAUMG.) Fl. Aug. (Doronic. bellidiflorum, SCHRANK.)

5. *A. salicifolius*, fol. lanceolatis serratis margine scabris, ramis sublinearibus integerrimis, pedunc. alternis subnudis SCHOLL. t. 1.

Ad Albim (prope Barbi —) Fl. Iul. Aug.

388. *SOLIDAGO* (Goldruth) *G. pl.* 1292.

Calycis squamae imbricatae conniventes; coroll. radii circiter 5, remotae; recept. nudum; pappus capillaris.

* 1. *s. Virgaurea*, caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis L. *Fl. dan.* t. 663.

In pratis, nemorosis; fl. Iul — Sept.

2. *s. minuta*, caule simplicissimo, fol. caulinis integerrimis, pedunc. axillaribus unifloris L.

In montosis (Siles. prope Wildesh. in Hercynia ROTH.) Fl. cum praecedente.

389. CINERARIA (Aschenkraut) *G. pl.*
1294.

Cal. simplex polyphyllus aequalis; recept. nudum; pappus capillaris.

1. *c. palustris*, flor. corymbosis, fol. lato-lanceolatis dentato sinuatis, caule villosa L. *Fl. dan. t.* 573.

In paludosis, turfosis (Siles. Megap. Brem. Oldenb. Holsat. Saxon. Hannov. Barbi, Berol. Helmstad. Gött. etc.) Fl. Iul. Aug.

+ 2. *c. integrifolia*, flor. umbellatis, fol. denticulatis lanceolatis, radicalibus spatulatis L.

In sylvaticis montosis, udis (Austr. Siles. Bohem. Saxon. Erford. Ien. Isenac. etc.) Fl. Iul.

+ 3. *c. cordifolia*, panic. pauciflora, fol. caulinis petiolatis cordatis acute serratis glabris, caule angulato L.

In nemorosis, montosis (Siles. Austr. Saxon.—) Fl. Iul. Aug.

390. INULA (Alant) *G. pl.* 1295.

Antherae basi in setas duas desinentes; recept. nudum; pappus capillaris.

1. *I. Helenium*, fol. amplexicaulibus ovatis rugosis subtus tomentosis, calycum squamis ovatis L. *Fl. dan. t.* 728.

In hortis gramineis (Siles. Megap. Hannov. Nassov. Lips. —) Fl. Iul. Aug.

+ 2. *I. odora*, fol. amplexicaulibus dentatis hirsutissimis: radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis, caule paucifloro L.

In montosis (Tubing. GMEL.) —

3. 1. *Oculus Christi*, fol. amplexicaulibus oblongis integris hirsutis, caule piloso corymboso L. *Iacq. austr.* 3. t. 223.

Ad vias (Siles. Austr. Bav. Tubing. —) Fl. Iul. Aug.

*4. 1. *britannica*, fol. amplexicaulibus lanceolatis serratis distinctis, subtus villosis, caule ramoso erecto villosa L. *Fl. dan.* t. 410.

Ad fossas, locis inundatis; fl. Iul. Aug.

*5. 1. *dysenterica*, fol. amplexicaulibus cordato-oblongis, caule villosa paniculato, squamis calyc. setaceis L. *Fl. lond.*

Ad vias, locis inundatis; fl. Iul. Aug.

*6. 1. *Pulicaria*, fol. amplexicaulibus undulatis, caule prostrato, flor. subglobosis radio brevissimo L. *Fl. lond.*

Ad vias, locis inundatis; fl. Iul. Aug.

*7. 1. *salicina*, fol. lanceolatis recurvis serrato-scabris, ramis angulatis, flor. inferioribus altioribus L. *Fl. dan.* t. 786.

In pratis depressis, nemorosis siccis; fl. Iul. Aug.

8. 1. *hirta*, fol. sessilibus lanceolatis recurvis subserrato-scabris, caule teretiusculo subpiloso, flor. inferioribus altioribus L. *Iacq. austr.* 4. t. 358.

In pratis pascuis, nemorosis montosis (Siles. Bav. Austr. Palat. Saxon. Helmstad. Ratisb. Berol. Barbi etc.) Fl. Iul. Aug.

9. 1. *germanica*, fol. sessilibus lanceolatis recurvis scabris, flor. subfasciculatis L. *Iacq. austr.* 2. t. 134.

In nemorosis, montosis (Austr. Misn. Palat. Saxon. Lips. Barbi —) Fl. Iul. Aug.

300 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA.

10. *I. ensifolia*, fol. sessilibus linearibus acuminatis nervosis glabris sparsis, caule subuniifloro L. *Iacq. austr.* 2. t. 162.

In sylvis (Austr. Bav. Tubing.—) Fl. Aug. Sept.

11. *I. montana*, fol. lanceolatis hirsutis integerrimis, caule uniifloro; calyce brevi imbricato L.

In siccis (Austr. Salat. —) Fl. Iul. Aug.

† 12. *I. squarrosa*, fol. sessilibus ovalibus laevibus reticulato - venosis subcrenatis; cal. squarroso L.

In pratis (Siles. KROCK.) Fl. Aug. Sept.

391. ARNICA (Wolverlei) *G. pl.* 1296.

Coroll. radii filamentis 5 absque antheris; recept. nudum; pappus capillaris.

* *A. montana*, fol. ovatis integris: caulinis geminis oppositis L. *Fl. dan.* t. 63.

In montosis, sylvaticis; fl. Iun — Sept.

392. DORONICUM (Gemschurz) *G. pl.* 1297.

Calyc. squamae duplicis ordinis aequales disco longiores; sem. radii nuda pappoque destituta; recept. nudum; pappus disci semin. capillaris.

1. *D. Pardalianches*, fol. cordatis obtusis denticulatis, radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus L. *Iacq. austr.* 4. t. 350.

In montosis, subalpinis (Siles. Austr. Carn. Bav. — Francof. Gies. Isenac. Ratisb. —) Fl. Iul. Aug.

† 2. *D. plantagineum*, fol. ovatis acutis subdentatis, ramis alternis L.

In montosis (Norimb? Tubing. —)

3. *D. Bellidiastrum*, caule nudo simplicissimo unifloro L. *Iacq. austr.* 4. t. 400.

In alpinis, etiam montosis (Siles. Austr. Tirol. Bav. Carn. — prope Tubing. GMEL.) Fl. Maj—Iul. (Arnica *Bellidiastrum* SCHRANK.)

393. *BELLIS* (Mafslieben) *G. pl.* 1300.

Cal. hemisphaericus: foliolis aequalibus; recept. nudum conicum; pappus o; sem. obovata.

* *B. perennis*, scapo nudo L. *Bull. t.* 173.

In pomariis, pratis, pascuis; fl. toto anno.

394. *CHRYSANTHEMUM* (Wucherblume)
G. pl. 1307.

Cal. hemisphaericus, imbricatus squamis margine scariosis, intimis terminatis squama scariosa; recept. convexum nudum; sem. coronata.

† 1. *c. alpinum*, fol. cuneiformibus pinnatifidis: laciniis integris, caulib. unifloris L.

In agris montanis (prope Tubing. GMEL.)

* 2. *c. Leucanthemum*, fol. amplexicaulibus oblongis: superne serratis, inferne dentatis L. *Bull. t.* 211.

In pratis, pascuis, inter segetes; fl. Iun. Iul.

3. *c. montanum*, fol. imis spatulato-lanceolatis serratis, summis linearibus L.

In montosis, collinis (Siles. Tubing.) Fl. Iun. Iul.

4. *c. inodorum*, fol. pinnatis multifidis, caule ramoso diffuso L. *Fl. dan.* t. 896.

In agris, ruderatis; fl. Iul. Aug. (Sem. 4-dentata.)

* 5. *c. corymbosum*, fol. pinnatis incisoseratis, caule multifloro L. *Jacq. austr.* 4. t. 379.

In nemorosis montosis; fl. Iul. Aug. (Sem. pappo membranaceo oblique truncato coronata. *Pyrethrum*, corymb. SCHRANK.)

* 6. *c. segetum*, fol. amplexicaulibus: superne laciniatis, inferne dentato-serratis L. *Fl. lond.*

In agris, cultis, ruderatis; fl. Iun — Aug. (Sem. apice gibberosa.)

7. *c. coronarium*, fol. pinnatis incisis extrorsum latioribus L.

In montanis Siles. sponte (KROOK.) Fl. Iul. Aug.

395. MATRICARIA (Metterich) *G. pl.* 1308.

Cal. hemisphaericus, imbricatus squamis linearibus non scariosis; recept. convexum nudum; sem. nuda.

1. *M. Parthenium*, fol. compositis planis: foliol. ovatis incisis, pedunc. ramosis L. *Bull.* t. 203.

In ruderatis, ad sepes; fl. Iul. Aug.

2. *M. maritima*, recept. hemisph., fol. bipinnatis subcarnosis, supra convexis, subtus carinatis L.

In maritimis (Siles. Holsat. Megap. Visurg. Brem. —) Fl. Iul — Sept.

3. *M. suaveolens*, recept. conicis, radiis deflexis, squamis calyc. margine aequalibus L.

In ruderatis, ad pagos; fl. Iul. Aug.

*4. *M. Chamomilla*, recept. conicis, radiis patentibus, squamis calyc. marginis aequalibus L. *Fl. lond.*

In agris, cultis; fl. Iul. Aug.

396. ANIHEMIS (Anthemis) *G. pl.* 1312.

Cal. hemisphaericus: squamis linearibus subaequalibus; recept. paleaceum convexum s. conicum.

1. *A. alpina*, fol. dentato-pinnatis intergerrimis linearibus, caule villosa unifloro; petalis ovatis; paleis sphacelatis L. *Iacq. austr.* 5. t. 30.

In alpinis (Tirol. Austr.) agris et pratis (prope Tubing. GMEL.)

2. *A. nobilis*, fol. pinnato-compositis linearibus acutis subvillosis L.

In agris, pascuis (Siles. Tubing. —) Fl. Aug. Sept.

*3. *A. arvensis*, recept. conicis, paleis setaceis, sem. coronato-marginatis L.

In agris, arvis; fl. Iun. Iul.

*4. *A. Cotula*, recept. conicis, paleis setaceis, sem. nudis L. *Fl. lond.*

In agris, ruderatis; fl. Iul. Aug.

5. *A. Pyrethrum*, caulib. simplicibus unifloris decumbentibus, fol. pinnato-multifidis L.

In sylvis montosis (Bohem. Thuring. Voigtland. —)

* 6. *A. tinctoria*, fol. bipinnatis serratis
subtus tomentosus, caule corymboso L. *Fl.*
dan. t. 741.

In campis, pratis apricis; fl. Iul. Aug.

397. *ACHILLEA* (Achillenkraut) *G. pl.*
1313.

Cal. ovatus, imbricatus squamis ovatis;
flosculi radii 5 vel plures; recept. palea-
ceum elevatum.

* 1. *A. Ptarmica*, fol. lanceolatis acumi-
natis argute serratis L. *Fl. lond.*

In pratis, pascuis, inter segetes; fl. Iul. Aug.

2. *A. magna*, fol. bipinnatis subpilosus:
laciniis linearibus dentatis: auriculis de-
cussatis L.

Ad sepes (Siles. KROCK.) Fl. Iul. Aug.

* 3. *A. Millefolium*, fol. bipinnatis nu-
dis: laciniis linearibus dentatis, caulib. su-
perne sulcatis L. *Bull. t.* 163.

In pratis, pascuis, versuris; fl. aestate. (Var.
flore purpureo.)

4. *A. nobilis*, fol. bipinnatis: inferiori-
bus nudis planis, superioribus obtusis to-
mentosus, corymbis convexis confertissi-
mis L.

In montosis, agris (Bohem. Saxon. Palat. Bar-
bi, Gött. Tubing. Helmstad. — Blankenb. HOPPE,
Hannoviae GAERTN.) Fl. Iul. Aug.

5. *A. odorata*, fol. bipinnatis ovalibus nu-
diusculis, corymbis fastigiatis confertis L.

In montosis asperis (Siles. Hal. Saxon.) Fl. aestate.

398. BUPHTHALMUM (Rindsauge) G. pl.
1321.

Recept. paleaceum; pappus margo obsoletus; sem. latera, praesentim radii marginata; stigma flosc. hermaphr. simplex s. bifidum.

* 1. *B. salicifolium*, fol. alternis lanceolatis subserratis villosis, calyc. nudis, caule herbaceo L. *Iacq. austr.* 3. t. 370.

In montosis (Siles. Austr. Carn. Ratisb. — No. timb. PANZER) Fl. Iul. Aug.

2. *B. grandiflorum*, fol. alternis lanceolatis subdenticulatis glabris, calyc. nudis, caule herbaceo L.

Prope Monach. (SCHRANK.) Fl. aestate.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

399. COREOPSIS (Coreopsis) G. pl. 1325.

Cal. erectus polyphyllus, basi radiis patentibus cinctus; flosc. circiter 8 in radio; recept. paleaceum; sem. apice setis 2 longioribus coronata.

* c. *Bidens*, fol. lanceolatis serratis oppositis amplexicaulibus L.

Locis humidis; fl. Aug. Sept. (Var. *Bid. cern.* quibusdam.)

400. CENTAUREA (Flockenblume) G. pl.
1321.

Corollulae radii infundibuliformes, longiores irregulares: recept. setosum; pappus plerisque capillaris.

Cal. squamis ciliatis.

* 1. *c. phrygia*, calyc. recurvato-plumosis, fol. indivisis oblongis scabris L. *Fl. dan.* t. 520.

In pratis, nemorosis, montanis (Siles. Austr. Bohem. Carn. Bav. Holsat. Saxon. Barbi, Claus-thal. Ilfeld. Gött. Fuld. Tubing. Lips. etc.) Fl. Iul. Aug.

2. *c. uniflora*, calyce recurvato-plumoso, fol. lanceolatis subdentatis tomentosis L.

In aridis (prope Tubing. GMEL.) in montosis (Fuld. LIEBLEIN.) Fl. Aug.

3. *c. nigra*, calyc. ciliatis: squamula ovata: ciliis capillaribus erectis; fol. ly-rato - angulatis, flor. flosculosis L. *Reich. tab.* 1.

In montosis, sylvaticis (Siles. Palat. Francof. — Lips. BAUMG.) Fl. Iul.

4. *c. montana*, calyc. serratis, fol. lanceolatis decurrentibus, caule simplicissimo L. *Iacq. austr.* 4. t. 371. *Curt. bot. Mag.* t. 77.

In nemorosis, montosis, subalpinis (Siles. Austr. Carn. Bavar. Palat. Saxon. Lips. —) Fl. Iun. Iul.

* 5. *c. Cyanus*, calyc. serratis, fol. linearibus integerrimis: infimis dentatis L. *Bull.* t. 221.

In agris, inter segetes; fl. Iun. Iul. (Var. cor. albis, purp.)

6. *c. paniculata*, calyc. ciliatis: squamis planis, fol. bipinnatis: rameis pinnatifidis line-

linearibus, caule paniculato L. *Iacq. austr.*
4. t. 320.

In agris, collibus, ruderalis (Siles. Austr. Carn. Palat. Saxon. Megap. Berol. Francof. Barbi, Ratisb. etc.) Fl. Iun. Iul.

* 7. c. *Scabiosa*, calyc. ciliatis, fol. pinnatifidis: pinnis lanceolatis L.

In pratis, pascuis, montosis; fl. Iul — Sept.

8. c. *Stoebe*, calyc. ciliatis oblongis, fol. pinnatifidis linearibus integerrimis L.

In collinis, subalpinis (Siles. Bav. Austr. —) Fl. Iul. Aug.

Calyc. squamis scariosis.

* 9. c. *Jacea*, calyc. scariosis laceris, fol. lanceolatis: radicalibus sinuato - dentatis, ramis angulatis L. *Bull. t. 227.*

In arvis, pratis, pascuis; fl. Maj—Iul. (Hujus loci c. *humilis*; *angustifolia*, SCHRANK.)

10. c. *amara*, calyc. scariosis, fol. lanceolatis integerrimis, caul. decumbentibus L.

In pratis montosis (Siles. KROCK.) Fl. Aug. Sept.

11. c. *alba*, calyc. scariosis integris mucronatis, fol. pinnato - dentatis: caulinis linearibus basi dentatis L.

In montosis aridis (Siles. Hal. Saxon. LEYS.) Fl. Iun. Iul.

12. c. *splendens*, calyc. scariosis obtusis, fol. radicalibus bipinnatifidis; caulinis pinnatis: dentibus lanceolatis L.

In montosis aridis (Siles? Hal. Saxon. LEYS.) Fl. Iun. Iul.

Calyc. spinis compositis.

13. *c. Calcitrapa*, calyc. subduplicato - spinosis sessilibus, fol. pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloso L.

In montanis, pascuis, ad vias (Siles. Carn. Palat. Saxon. Hannov. Barbi, Francof. Gött. —) Fl. Iul. Aug.

† 14. *c. solstitialis*, calyc. duplicato - spinosis solitariis, fol. rameis decurrentibus inermibus lanceolatis, radicalibus lyrato - pinnatifidis L.

In campis (prope Barbi —) Fl. Aug. Sept.

15. *c. sicula*, calyc. ciliato - spinosis terminalibus, fol. decurrentibus lyratis inermibus incanis L.

In versuris, ad margines agrorum (Hal. Saxon. LEYS.) Fl. Iul. Aug.

POLYGAMIA NECESSARIA.

401. CALENDULA (Ringelblume) *G. pl.*
1339.

Cal. polyphyllus aequalis; recept. nudum; sem. disci membranacea; pappus o.

1. *c. arvensis*, semin. cymbiformibus muricatis incurvatis; extimis erectis protensis L. *Bull. t.* 239.

Inter segetes (Siles. Bav. Carn. Palat. Saxon. Berol. Worm. —) Fl. Aug. Sept.

2. *c. officinalis*, sem. cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus L.

Hinc inde; fl. Aug. Sept.

402. *FILAGO* (Ruhrkraut) *G. pl.* 1345.

Cal. imbricatus: flosculis foemineis paucis inter squamas, semin. nudis; recept. nudum; pappus capillaris.

† 1. *F. acaulis*, flor. acaulibus sessilibus, fol. floralibus majoribus *L. Krock. 2. t. 41?*

In montosis (Siles. Bohem. *KROCK.*) Fl. ad finem aestatis. (Pappus plumosus *KROCK.*)

* 2. *F. germanica*, panic. dichotoma, flor. rotundatis axillaribus hirsutis, fol. acutis *L. Ehrh. herb. 109.*

In campis siccis, arvis; fl. Iul. Aug.

3. *F. pyramidata*, caule dichotomo, flor. pyramidatis pentagonis axillaribus, flosc. foemineis serratis *L.*

In agris, arvis (Siles. — Holsat. *WIGG.*) Fl. Aug.

* 4. *F. montana*, caule subdichotomo erecto, flor. conicis terminalibus axillaribusque *L. Ehrh. herb. 90.*

In campis, agris montosis; fl. Iul — Sept.

5. *F. gallica*, caule dichotomo, flor. subulatis axillaribus, fol. filiformibus *L.*

In agris montosis (Siles? Palat.—) Fl. Iul. Aug.

* 6. *F. arvensis*, caule paniculato, flor. conicis lateralibus *L.*

In agris, arvis; fl. Iul. Aug.

7. *F. Leontopodium*, caule simplicissimo, capitulo terminali bracteis hirsutissimis radiato *L.*

In alpinis (Austr. Carn. Carinth. Bav.) in pratis (prope Tubing *GMEL.*) Fl. Aug.

POLYGAMIA SEGREGATA.

403. ECHINOPS (Kugeldistel) *G. pl.* 1353.

Cal. propr. 1 - florus; corollae tubulosae hermaphrod.; recept. nudum; pappus obsoletus.

E. sphaerocephalus, capitulis globosis, fol. sinuatis pubescentibus L.

Ad dumeta (Carn. Barbi, Hannov. —) Fl. Iul. Aug.

MONOGAMIA.

404. JASIONE (Jasione) *G. pl.* 1362.

Cal. propr. superus 5 - fidus persistens; cor. 1 - petala profunde 5 - fida; caps. 2 - locularis, apice pervia.

* *J. montana*, L. *Fl. lond.*

In siccis; fl. Iul. Aug.

405. VIOLA (Veilchen) *G. pl.* 1364.

Cal. 5 - phyllus; corolla irregularis 5 - petala, postice cornuta; caps. 1 - locularis, 3 - valvis.

Acaules.

* 1. *v. hirta*, acaulis, fol. petiolisque hirsutis, bracteis infra medium pedunculi CURTIS, *Fl. lond.*

In umbrosis; fl. Mart. Apr.

* 2. *v. palustris*, acaulis, fol. reniformibus L. *Fl. lond.*

In paludosis; fl. Iun.

*3. *v. odorata*, acaulis, fol. cordatis, stolonibus reptantibus L. *Bull. t.* 169.

In umbrosis; fl. Mart. Apr.

Caulescentes.

*4. *v. canina*, caule adultiore adscendente, fol. oblongo-cordatis L. *Fl. lond.*

Ad sepes, in pascuis sylvaticis; fl. Apr. Maj.

5. *v. montana*, caulib. erectis, fol. cordatis oblongis L. *Hoppe, ect.* 364.

In alpinis, etiam montanis (Siles. Bav. Austr. Hercyn. Saxon. Lips. Ratisb. Barbi —) Fl. Maj.

6. *v. persicifolia*, caule erecto, fol. ovato-lanceolatis serratis BOEHM.

In pratis, locis apricis (Bav. Erford. Ien. Lips. — Ratisb. HOPPE, herb. c. 1. 43.) Fl. Maj.

7. *v. mirabilis*, caule triquetro, fol. reniformi-cordatis, flor. caulinis apetalis L. *Iacq. austr. t.* 19.

In nemorosis, montosis (Siles. Austr. Bav. Holsat. Nassov. Hannov. Gött. — Nor mb. PANZER. Brunsvig. POTT.) Fl. Apr. Maj.

*8. *v. Tricolor*, fol. ovatis dentatis, flor. calyce glabro duplo majoribus ROTH. *Fl. lond.*

In cultis; fl. Iun — Oct.

9. *v. arvensis*, fol. ovato-oblongis dentatis, flor. calyci hirsuto aequalibus ROTH.

Inter segetes, in campis; fl. Apr — Aug.

406. IMPATIENS (Springkraut) G. pl. 1365.

Cal. 2 - phyllus; cor. 5 - petala irregularis, nectario cucullato; caps. 5 - valvis: valvulis spiraliter dissilientibus.

1. *Nolitangere*, pedunc. multifloris solitariis, fol. ovatis, geniculis caulinis tumulentibus L. *Fl. dan. t.* 588.

In humidis umbrosis; fl. Aug. Sept.

Classis XX.

G Y N A N D R I A

D I A N D R I A.

407. ORCHIS (Knabenkraut) *G. pl.* 1367.

Nectarium corniforme pone florem.

Bulbis indivisis.

1. *o. bifolia*, bulbis indivisis; nectarii labio lanceolato integerrimo, cornu longissimo, petalis patentibus L. *Hall. t.* 35.

In pascuis, pratis nemorosis; fl. Iun. Iul. (Var. minor.)

2. *o. globosa*, bulbis indivisis; nectarii labio resupinato trifido: media emarginata, cornu brevi, petalis apice subulatis L. *Iacq. austr. 3. t.* 265.

In montosis, nemorosis (Austr. Bav. Carn. Barbi etc.) Fl. Iul.

3. *o. pyramidalis*, bulbis indivisis; nectarii labio bicorni trifido aequali integerrimo: cornu longo, petalis sublanceolatis L. *Iacq. austr. 3. t.* 226.

In montosis, pratis (Austr. Bav. Nass. Carn. Saxon. Hannov. —) Fl. Iul.

4. *o. coriophora*, bulbis indivisis; nectarii labio trifido reflexo erenato: cornu brevi,

brevi, petalis conniventibus L. *Hall. t. 34.*

In pratis (Austr. Siles. Palat. Saxon. Bav. Carn. Lips. Ratisb. Fuld. Osterod. Hannoviae, Barbi etc.) Fl. Iun.

*5. o. *Morio*, bulbis indivisis; nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuso adscendente, petalis obtusis conniventibus L. *Fl. lond.*

In pratis, pascuis; fl. Maj. Iun.

*6. o. *mascula*, bulbis indivisis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis L. *Fl. lond.*

In pratis sylvaticis, humidis; fl. Maj — Iul. (Diversa species o. *mascula*, CRANTZ, nunc *palustris* dicta IACQ. coll. 1. 75.)

*7. o. *ustulata*, bulbis indivisis; nectarii labio quadrifido punctis scabro: cornu obtuso, petalis distinctis L. *Fl. dan. t. 103.*

In pratis nemorosis; fl. Iun.

*8. o. *militaris*, bulbis indivisis; nectarii labio quinquefido punctis scabro; cornu obtuso, petalis confluentibus L. *Hall. t. 28.*

In pratis, montosis (Austr. Siles. Bav. Palat. Saxon. Ratisb. etc. o. *cineræa*, SCHRANK.) Fl. Maj. Iun.

9. o. *variegata*, bulbis indivisis; nectarii labio quadrifido punctis scabro serrato; intermediis laciniis rotundatis. *Hall. t. 30. Rupp. t. 6.*

In pratis cum priori; fl. Maj. Iun. o. *variegata*, IACQ. coll. 2. 267.)

10. *O. fusca*, bulbis indivisis; nectarii labio quadrifido: laciniis oblongis, cornu brevi, petalis confluentibus L. *Iacq. austr.* 4. t. 307.

In montosis (Austr. Hercyn. Palat. Saxon. Francof. —) Fl. Iun.

11. *O. pallens*, bulbis indivisis; nectarii labio trifido integerrimo, cornu obtuso mediocri, petalis patentibus L. *Iacq. austr.* t. 45.

In nemorosis montosis (Austr. Saxon. — Lusat. infer. BAUMG.) Fl. Apr. Maj.

Bulbis palmatis.

*12. *O. latifolia*, bulbis subpalmatis rectis; nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus L. *Fl. lond.*

In pratis humidis; fl. Maj. Iun. (Var palustris maculata, vel latifolia.)

13. *O. incarnata*, bulbis palmatis; nectarii cornu conico: labio obscure trilobo serrato, petalis dorsalibus reflexis L.

In pratis (Bav. Holset. Hannov. Tubing. —) Fl. Maj.

14. *O. sambucina*, bulbis subpalmatis erectis; nectarii cornu conico: labio ovato subtrilobo, bracteis longitudine florum L. *Baumg. t. 2. Iacq. austr. 2. t. 108.*

In pratis montosis (Palat. Bohem. Austr. Siles. Barbi, Tubing. Lips. —) Fl. Maj. Iun.

*15. *O. maculata*, bulbis palmatis patentibus; nectarii cornu germinibus brevioribus, labio

labio plano, petalis dorsalibus erectis L.
Fl. dan. t. 933.

In pratis nemorosis; fl. Maj. Iun. (Bracteae serrulatae, intermedia lacinia integerrima minore.)

16. *o. odoratissima*, bulbis palmatis; nectarium cornu recurvo brevior: labio trilobo, fol. linearibus L. *Iacq. austr. 3. t. 264.*

In siccis, collinis (Austr. Bav. Nassov. Helmst. — prope Schonewald BAUMG.) Fl. Iun.

* 17. *o. conopsea*, bulbis palmatis; nectarium cornu setaceo germinibus longior: labio trifido, petalis duobus patentissimis L. *Fl. dan. t. 224.*

In pratis montosis nemorosis; fl. Maj. Iun.

Bulbis fasciculatis.

18. *o. abortiva*, bulbis fasciculatis filiformibus; nectarium labio ovato integerrimo, caule aphylo L. *Iacq. austr. 2. t. 193.*

In pratis nemorosis (Austr. Carn. Nassov. Saxon. —) Fl. Iun.

408. SATYRIUM (Stendel) *G. pl. 1368.*

Nectarium scrotiforme s. inflato-didymum pone florem.

* 1. *s. hircinum*, bulbis indivisis, fol. lanceolatis, nectarium labio trifido; intermedia lineari obliqua praemorsa L. *Iacq. austr. 4. t. 367.*

In nemorosis montosis (Siles. Austr. Carn. Palat. Saxon. —) Fl. Iun. Iul.

* 2. *s. viride*, bulbis palmatis, fol. oblongis obtusis, nectarii labio lineari trifido: intermedia obsoleta L. *Fl. dan. t. 77.*

In sylvis montosis (Siles. Austr. Carn. Bav. Palat. Francof. Gött. Tubing. Lips. — Capellenhagen EHRH. etc.) Fl. Iun.

3. *s. albidum*, bulbis fasciculatis, fol. lanceolatis; nectarii labio trifido acuto: intermedia obtusa L. *Fl. dan. t. 115.*

In montosis, aridis (Siles. Austr. Bav. Carn. Hercyn. Barbi —) Fl. Iun — Aug.

4. *s. Epipogium*, bulbis compressis dentatis, caule vaginato; nectarii labio resupinato indiviso L. *lacq. austr. t. 84.*

In montosis umbrosis (Austr. Hannov. — prope Götting. — Swalenberg, in monte Deister EHRH.)

5. *s. repens*, bulbis fibrosis, fol. ovatis radicalibus, florib. secundis L. *Fl. dan. t. 812.*

In sylvis, pinetis (Austr. Boruss. Megap. Francof. Berol. — Norimb. PANZER.) Fl. Iun.

409. OPHRYS (Ragwurz) *G. pl. 1369.*

Nectarii labium dependens, supra rima longitudinali, subtus carina divisum.

Bulbis ramosis.

* 1. *o. Nidus avis*, bulbis fibroso - fasciculatis, caule vaginato aphylo; nectarii labio bifido L. *Hall. t. 37.*

In nemorosis umbrosis; fl. Iun. Iul.

† 2. *o. Corallorhiza*, bulbis ramosis flexuosis, caule vapinato aphylo; nectarii labio trifido L. *Hall. t. 44.*

In montosis (Austr. Carn. Bav. Ien. Tubing. —)

* 3. *o. spiralis*, bulbis aggregatis oblongis, caule subfolioso, flor. spirali secundis; nectarii labio indiviso crenulato L. *Fl. lond.*

In montosis nemorosis, graminosis (Siles. Austr. Bav. Carn. Palat. Saxon. Megap. Hannov. Barbi; Helmst. Wolfenb. etc.) Fl. Iul. Aug.

† 4. *o. cernua*, bulbis fasciculatis, caule folioso, flor. cernuis, nectarii labio oblongo integro acuto L.

In Holsatia (WIGGERS.) —

* 5. *o. ovata*, bulbo fibroso, caule bifolio, fol. ovatis; nectarii labio bifido L. *Fl. lond.*

In pratis humidis, pascuis nemorosis; fl. Maj. — Iul.

* 6. *o. cordata*, bulbo fibroso, caule bifolio, fol. cordatis L. *Hall. t. 22.*

In sylvaticis montosis (Carn. Bav. Austr. Hercyn. — Norimb. PANZER.) Fl. Iul.

Bulbis rotundis.

7. *o. Loeselii*, bulbo subrotundo, scapo nudo trigono, nectarii labio ovato L. *Ehrh. herb. 110.*

In pratis paludosis (Boruss. — prope Driburg EHRH.)

8. *o. paludosa*, bulbo subrotundo, scapo subnudo pentagono, fol. apice scabris

bris; nectarii labio integro L. *Ehrh. phyt.* 16.

In paludo is, turfosis (Holsat. Megap. Hannov. palat. Berol. Wildeshus. —) Fl. Iul. Aug. (Bulbus novellus ad basin materni ejusque et propria vagina involutus, postamento vero sensim elongato, anno sequenti scapum et novum bulbum demum emittens EHRH.)

9. o. *monophyllos*, bulbo rotundo, scapo nudo, folio ovato; nectarii labio integro L. *Hall. t.* 36.

In paludosis (Boruss. —)

10. o. *Monorchis*, bulbo globoso, scapo nudo; nectarii labio trifido cruciato L. *Fl. dan t.* 102.

In montanis, pratis uliginosis (Hannov. Megap. Palat. Ratisb. Francof. etc.) Fl. Iun.

* 11. o. *myodes*, bulbis subrotundis, scapo folioso; nectarii labio oblongo quadripartito: laciniis duabus mediis elongatis lanceolatis L. *Hall. t.* 24.

In nemorosis montosis (Siles. Austr. Carn. Saxon. Hannov. Ratisb. etc.) Fl. Maj. Iun.

† 12. o. *apifera*, bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii labio quinquelobo; lobis subtus reflexis HUDS. *Fl. lond.*

In pratis, pascuis, hinc inde: fl. Iun. Iul.

13. o. *arachnites*, bulbis subrotundis, scapo folioso; nectarii labio lato emarginato appendiculato L.

In nemorosis montosis (Palat. Saxon. Carn. Francof. etc.) Fl. cum priori.

410. SERAPIAS (Zymbel) G. pl. 1371.

Nectarium ovatum gibbum, labio ovato.

* 1. *s. latifolia*, bulbis fibrosis, fol. ovatis amplexicaulibus, flor. pendulis L. *Fl. dan.* t. 811.

In nemorosis, montosis; fl. Iul. Aug.

2. *s. microphylla*, radix fasciculata, fol. lanceolata parva, flores subpenduli; nectarii labium acutum, acute carinatum, superne lacernulatum; caps. farinoso-pubescentes EHRH.

In sylvis montanis (Brunsvico. Luneb. Pyrmont. — Swalenb. EHRH.)

3. *s. longifolia*, bulbis fibrosis, fol. ensiformibus sessilibus, flor. pendulis L. *Hall.* t. 39.

In nemorosis montosis; fl. Iul. Aug.

4. *s. ensifolia*, bulbis fibrosis, fol. ensiformibus distichis, bracteis minutissimis, flor. erectis; nectarii labio obtuso petalis brevior L. *Ehrh. phyt.* 67. (*s. Xiphophyllum*.)

In nemorosis montosis (Austr. Palat. Megap. Saxon. Hannov. Wolfenb. Lips. Pyrmont. etc.) Fl. Maj. Iun.

5. *s. lancifolia*, bulbis fibrosis, fol. ovato-lanceolatis, bracteis longitudine capsulae, flor. erectis; nectarii labio obtuso petalis brevior L. *Ehrh. phyt.* 57. (*s. Lonchophyllum*.)

In

In nemorosis, montosis (Bav. Megap. Palat. Saxon. Berol. Gött. Hannov. Ratisb. Pyrmont. etc.) Fl. Maj. Iun.

* 6. s. *rubra*, bulbis fibrosis, fol. ensiformibus, flor. erectis; nectarii labio acuto L. *Hall. t. 42.*

In sylvis montosis; fl. Iun — Aug.

411. CYPRIPIEDUM (Frauenschu) G. pl. 1376.

Nectarium calceiforme inflatum obtusum cavum.

* c. *Calceolus*, radicibus fibrosis, fol. ovato-lanceolatis caulinis L. *Mill. ic. t. 242.*

In sylvis montosis (Siles. Austr. Bav. Saxon. Hercyn. Hannov. Ratisb. Helmstad. Norimb. etc.) Fl. Maj. Iun.

HEXANDRIA.

412. ARISTOLOCHIA (Osterluzei) G. pl. 1383.

Cor. irregularis basi tubulosa, lingulata; caps. infera 6-locularis.

* A. *clematitis*, fol. cordatis, caule erecto, flor. axillaribus confertis L. *Bull. herb. t. 39.*

In cultis, ad sepes; fl. Maj. Iun.

Classis XXI.

M O N O E C I A

M O N A N D R I A.

413. ARUM (Zehrwurz) *G. pl.* 1387.

Spatha 1 - phylla, cucullata; spadix clavatus, inferne foemineus, medio stamineus, supra nectariferus? nudus.

* *A. maculatum*, acaule, fol. hastatis integerrimis, spadice clavato *L. Fl. lond.*

In umbrosis humidis; fl. Maj. Iun.

414. CALLA (Drachenwurz) *G. pl.* 1388.

Spatha 1 - phylla patens; spadix digitiformis fructificationibus tectus.

* *C. palustris*, fol. cordatis, spatha plana, spadice undique hermaphrodito *L. Fl. dan. t.* 422.

415. ZOSTERA (Wasserriemen) *G. pl.* 1390.

Spadix linearis altero latere stam., superne inferne pistillis instructus; recept. lineare; caps. ovata rostrata stylo terminata, subcompressa 1 - locularis, evalvis; sem. 1, striatum.

1. *z. marina*, pericarp. sessilibus *L. Fl. dan. t.* 15. *Gaertn. t.* 19.

In mari (Holsat. Oldenb.) —

2. *z. oceanica*, pericarp. pedicellatis claviformibus *L.*

In Oceano (Holsat. wigg.) —

416. ZANNICHELLIA (Zannichellie) *G. pl.*
1391.

Mas: cal. 0; cor. 0; foem. cal. campanu-
latus; cor. 0; caps. 4, rostratae 1 - locula-
res, evalves; sem. 1.

* *z. palustris*, L. *Mich. t.* 34.
In fossis, piscinis; fl. Iul.

417. CHARA (Armleuchter) *G. pl.* 1397.

Mas: cal. 0; cor. 0; foem. cal. 4-phyllus;
(integumentum ovarii GAERTN.) cor. 0;
nux spiraliter striata 1 - locularis; sem.
plurima.

1. *c. tomentosa*, aculeis caulinis ovatis L.
In fossis (prope Berol. Spandau WILD.) Fl. aestate.

2. *c. vulgaris*, caul. laevibus, frondibus
interne dentatis L.

In aquis stagnantibus; fl. Iun. Iul.

3. *c. hispida*, caul. aculeis capillaribus
confertis L. *Fl. dan. t.* 154.

In aquis salsis, maritimis (Bav. Nassov. Megap.
Holsat. Hannov. Saxon. Oldenb. Lips. —) Fl. Iun. Iul.

* 4. *c. flexilis*, caul. articulis inermibus
diaphanis, superne latioribus L. *Schmid. ic.*
t. 14.

In stagnantibus, rivulis, maritimis (Megap.
Palat. Hannov. Hannoviae —) Fl. Maj.

DIANDRIA.

418. LEMNA (Wasserlinse) *G. pl.* 1400.

Mas: cal. 1 - phyllus latere vel superio-
re parte dehiscens; cor. 0; foem. ut in
mas.

masculo; caps. globosa compressa, 1. locularis.

* 1. *L. trisulca*, fol. lanceolatis petiolatis
L. Mich. t. 11. fig. 5.

In aquis stagnantibus; fl. —

* 2. *L. minor*, fol. sessilibus utrinque planiusculis, radic. solitariis L. Mich. t. 11. fig. 3.

In aquis stagnantibus; fl. Maj. Iun.

* 3. *L. gibba*, fol. sessilibus subtns hemisphaericis, radic. solitariis L. Mich. t. 11. fig. 2.

In aquis stagnantibus; fl. Iun.

* 4. *L. polyrrhiza*, fol. sessilibus, radicibus confertis L. Mich. t. 11. fig. 1.

In aquis stagnantibus; fl. Iun. (Flores hermaphroditos (in 2. 4) fructiferos observare non raro contigit.)

TRIANDRIA.

419. *TYPHA* (Rohrkolbe) G. pl. 1401.

Mas: amentum cylindricum; cal. 3. phyllus setaceus; cor. o; foem. in eodem amento, infra masculos, apetala; sem. 1, setae insidens; pappus capillaris.

* 1. *T. latifolia*, fol. subensiformibus, spica mascula foemineaque approximatis L. Fl. lond.

In paludibus; fl. Iul.

2. *T. angustifolia*, fol. semicylindricis, spica mascula foemineaque remotis L. Fl. lond.

In paludibus; fl. Iul.

420. SPARGANIUM (Igelsknospe) G. pl.

1402.

Mas: amentum subrotundum; cal. 3-phyllus; cor. 0; foem. ut in masculo; drupa exsucca, 1-locularis.

1. s. *ramosum*, fol. erectis triquetris.
* Fl. lond.

Ad fossas, in paludosis; fl. Iun. Iul.

2. s. *simplex*, fol. basi triangularibus, lateribus planis, pedunc. simplicibus cur-
tis, Fl. lond.

In paludosis, priori rarius; fl. Iun. Iul.

3. s. *natans*, fol. decumbentibus planis
L. Ehrh. calam 110.

In fossis, paludibus (Bavar. Megap. Oldenb. Palat. Holsat. Berol. Hannov. Tubing. — Bruins-
vig. HEINZE. — Norimb. PANZER.) Fl. Iul. Aug.

421. CAREX (Segge) G. pl. 1407.

Mas: amentum oblongum imbricatum squamis 1. floris; foem. ut in masculis; nectarium bidentatum, semen triquetrum continens. (Nux coriacea, semine pedicellato GAERTN.)

Spica unica simplici.

* 1. c. *dioica*, spica simplici dioica L.
Mich. t. 32. fig. 1.

Locis paludosis (Bav. Holsat. Megap. Oldenb. Saxon. Hannov. Ratisb. Tubing. etc.) Fl. Apr. Maj.

2. *c. pulicaris*, spica simplici androgyna: superne mascula; caps. divaricatis retroflexis L. *Leers*, t. 14. fig. 1.

In pratis uliginosis (Carn. Tirol. Salisb. Megap. Holsat. Nassov. Brem. Hannov. Lips. —) Fl. Maj. Iun.

3. *c. Leucoglochin*, spica simplici androgyna: superne mascula, caps. reflexis, sem. triquetris EHRH. *phyt.* 8.

In uliginosis, turfosis — (Stigma trifidum.)

4. *c. cyperoides*, capitulo terminali subrotundo, flor. simplicissimis subulatis, involucri longo L. *Schreb.* t. 28. fig. 3.

In humidis (Bohem. Dresd. — Erlang. ROTH. Wittenb. SCHK.) Fl. Aug. Sept.

Spicis androgynis.

5. *c. arenaria*, spica composita, spiculis androgynis (ovato-acutis:) inferioribus remotioribus, foliolo longiori instructis culmo triquetro L. *Ehrh.* *phyt.* 17. *Mich.* t. 33. fig. 4. *Viborg*, t. 3.

In arena mobili (Megap. Brem. Oldenb. Westph. Boruss. Holsat. Hannov. Berol. Barbi, Tubing. —) Fl. Maj.

* 6. *c. disticha*, spica composita subdisticha, spiculis ovatis subimbricatis androgynis, foliolo longiori instructis, culmo triquetro HUDS. *Leers*, t. 14. fig. 2. (*c. arenar.*) *Ehrh.* *gram.* 48.

In pratis humidis (Saxon. Nassov. Palat. Berol. Lips. Ratisb. etc.) Fl. Maj. (*c. spicata*, POLL., SCHRANK.)

7. *c. uliginosa*, spica composita, spiculis androgynis: inferioribus remotioribus

foliolo longiori instructis, culmo tereti
L.

In paludosis (Holsat. WIGG.) —

*8. *c. leporina*, spica composita, spiculis ovatis sessilibus approximatis alternis androgynis nudis L. *Leers*, t. 14. fig. 6.

In pratis humidis; fl. Maj.

9. *c. praecox*, spica composita disticha nudiuscula, spiculis contiguis androgynis teretibus rectis, culmo superne nudo SCHREB. *Hoppe*, herb. c. 1. 72.

In graminosis (Saxon. Megap. Barbi, Berol. Lips. etc.) Fl. Mart. Apr. (c. Schreberi, SCHRANK.)

*10. *c. vulpina*, spica subradecomposita, inferne laxiore, spiculis ovatis androgynis glomeratis: superne masculis L. *Leers*, t. 14. fig. 5.

In humidis, paludosis; fl. Maj. Iun. (Hujus loci: *c. intermedia*, RETZ. scand. 1027, *spicata*, HUDS. Mich. t. 53. fig. 14.)

*11. *c. brizoides*, spica composita disticha nuda, spiculis androgynis oblongis contiguis, culmo nudo L. *Mich.* t. 53. fig. 17. *Hoppe*, ect. 585. herb. c. 1. 32.

In humidis, umbrosis; fl. Maj. Iun.

12. *c. echinata*, spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis: inferne masculis, superne foemineis, caps. simpliciter cuspidatis. *Leers*, t. 14. fig. 8. (*c. muricata*.) *Ehrh.* gram. 68.

In pratis sylvaticis; fl. Maj.

13. *c. muricata*, spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis, inferne foemineis, superne masculis, caps. bicuspidatis. *Ehrh. gram.* 97. *Leers*, t. 14. f. 3. (*c. loliacea*.)

In pratis, locis graminosis; fl. Maj.

† 14. *c. loliacea*, spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis, caps. ovatis tertiisculis muticis divaricatis L.

In udis (Saxon. Bav. Holsat. Oldenb. Lips. — Norimb. PANZER.) —

* 15. *c. remota*, spicis ovatis subsessilibus remotis androgynis, bracteis culmum aequantibus L. *Leers*, t. 15. fig. 1. *Ehrh. gram.* 58.

In umbrosis humidis; fl. Maj. Iun. (Hujus loci *c. axillaris*, SCHRANK. HOPPE, herb. c. 1. 73.)

* 16. *c. elongata*, spiculis oblongis sessilibus remotis androgynis, caps. ovatis acutis L. *Hoppe*, herb. c. 1. 97.)

In pratis nemorosis, humidis; fl. Maj. Iun.

17. *c. canescens*, spiculis subrotundis remotis sessilibus obtusis androgynis, caps. ovatis obtusiusculis L. *Leers*, t. 14. fig. 7. (*c. elongata*.)

Locis umbrosis, humidis; fl. Maj. Iun.

* 18. *c. paniculata*, racemo composito, spiculis androgynis L. *Ehrh. gram.* 69. *Leers*, t. 14. fig. 4. 11.

In paludosis, nemorosis; fl. Maj. Iun.

* 19. *c. diandra*, spiculis androgynis, racemo arcto, flosculis masculis diandris SCHRANK.

In nemorosis humidis (Bav. Palat. Nassov. Brem. Ratisb. — Norimb. PANZER.) Fl. cum priori. (Var. c. panicul. LEERS, l. c.)

20. c. *gracilis*, Ehrh. gram. 78.

21. c. *multiculmis*, Ehrh. gram. 88.

22. c. *tenella*, Ehrh. gram. 98.

23. c. *stolonifera*, Ehrh. gram. 99.

(Etiam si species (20. 23.) Ups. primus legerit cel. EHHH., tamen in Germania non minus praesertim Hannov. occurrere in litt. me certiore fecit.)

Spicis sexu distinctis: foem. sessilibus.

24. c. *Oederi*, spicis subquaternis sessilibus, caps. globosis acutis RETZ. Fl. dan. t. 371. Ehrh. gram. 79.

Locis siccis, glareosis (Francon. — Hannov. EHRH. Sequenti minor.)

* 25. c. *flava*, spicis confertis subsessilibus subrotundis: mascula linearis, caps. acutis recurvis L. Leers, t. 15. fig. 6.

In pratis uliginosis sylvaticis; fl. Apr. Maj.

26. c. *pedata*, spicis foem. sessilibus oblongis: inferiore axillari, fol. subfiliformibus L. Mich. t. 32. fig. 14.

Locis humidis umbrosis (Gött. Hercyn. MURR. Nassov ? — Bavar. SCHRANK.) Fl. Maj. Iun.

* 27. c. *digitata*, spicis linearibus erectis, mascula breviora inferioreque, bracteis aphyllis, caps. distantibus L. Leers, t. 15. fig. 4.

In montosis umbrosis; fl. Apr. Maj.

* 28.

* 28. *c. montana*, spicis foem. sessilibus subsolitariis ovatis masculae approximatis, culmo nudo, caps. pubescentibus. *Leers*, t. 16. fig. 6.

In montosis apricis; fl. Apr. (Squamae mucrone longe producto; stigma trifidum. An *c. praecox*, IACQ. *montana*, POLL. hujus loci?)

29. *c. ericetorum*, spica mascula terminali obverse ovata, obtusa, foem. sessilibus ovatis, caps. pubescentibus POLL. *Hoppe*, herb. c. 1. 48.

In collinis, arenosis; fl. Apr. Maj. (Squamae obtusiusculae; stigma 2-3-fidum.)

30. *c. decumbens*, *Ehrh. gram.* 70. Hannoverae —

† 31. *c. filiformis*, spica mascula oblonga, foem. sessilibus oblongis: inferiore foliolo proprio brevior. *L. Leers*, t. 16. fig. 5?

In nemorosis; fl. Apr. Maj.

† 32. *c. lasiocarpa*, culmus subteres; fol. angustissima canaliculata non carinata, ciliato-serrulata nuda, spic. sexu distinctae remotae; masc. 2, foem. totidem cylindricae, erectae subsessiles, bracteis multo breviores; stigmata 3, caps. ovatae hirsutae, apice divisae *EHRH. gram.* 19.

Hercyn. Hannov. (*EHRH.*) —

* 33. *c. tomentosa*, spicis foem. subpedunculatis, caps. subglobosis tomentosis *Leers*, t. 15. fig. 7.

In pratis humidis, paludosis (Nass. Austr. Carn. Palat. Saxon. Lips. Ratisb. —) Fl. Maj.

†34. *c. pilulifera*, spicis terminalibus confertis subrotundis: masculina oblonga L.

In pascuis graminosis (Saxon? Brem. Oldenb. Holsat. Ratisb. Berol. —) Fl. Maj.

35. *c. saxatilis*, spicis tribus ovatis sessilibus alternis: mascula oblonga L.

In montanis (Siles. Tubing.) —

36. *c. splendida*, spicis remotis, mascula subsolitaria lineari, foem. geminatis ovatis: caps. bifidis, lana splendida tectis, bracteis longissimis WILD. t. 1. fig. 3.

In paludosis (Berol. —) Fl. Maj.

37. *c. aspera*, spica mascula solitaria longe pedunculata, lineari, foem. remotis subternatis, oblongis; caps. squamis majoribus, culmo resrorsum hispido WILD. t. 1. fig. 2.

In pratis (prope Spandau —) Fl. Maj.

Spicis sexu distinctis: foem. pedunculatis.

38. *c. atrata*, spicis androgynis terminalibus pedunculatis: florentibus erectis, fructiferis pendulis L.

In pratis montanis, paludosis (Carn. Nasso. Salisb. — Holsat. WIGG. (Foem. in apice, mares basi EHRH.)

†39. *c. limosa*, spicis ovatis pendulis: mascula longiore erectiore, radice repente L.

In pratis pascuis, paludosis (Holsat. Megap. Palat. Saxon. Lips. —) Fl. Maj. (Distinguenda ab hac glauca, POLL. flacca, SCHREB.)

†40. *c. capillaris*, spicis pendulis: mascula erecta, foem. oblongis distichis, caps. nudis

nudis acuminatis L. *Fl. dan. t. 168. Ehrh. phyt. 18.*

In pratis humidis (Holsat. Tubing.) — (Alpina plantula a multis cum sylvatica Carice videtur eadem habita.)

*41. *c. pallescens*, spicis pendulis: mascula erecta, foem. ovatis imbricatis, caps. confertis obtusis L. *Leers, t. 15. fig. 4.*

In pratis umbrosis humidis; fl. Maj.

*42. *c. panicea*, spicis pedunculatis erectis remotis: foem. linearibus, caps. obtusiusculis inflatis L. *Leers, t. 15. fig. 5.*

In pratis uliginosis; fl. Apr. Maj.

43. *c. sphaerocarpa*, *Ehrh. gram. 89.*

Hannoverae — (Ad lentem caps. *c. toment.* valde similes.)

*44. *c. Pseudo-Cyperus*, spicis pendulis, pedunc. geminatis L. *Ehrh. gram. 90.*

Ad ripas, fossas; fl. Apr. Maj.

*45. *c. caespitosa*, spicis erectis cylindricis ternis subsessilibus: mascula terminali, culmo triquetro L.

In paludosis turfosis; fl. Maj. (Stigma bifidum.)

*46. *c. distans*, spicis remotissimis subsessilibus, bractea vaginali, caps. angulatis mucronatis L. *Ehrh. gram. 40.*

In pratis paludosis; fl. Maj. Iun.

47. *c. humilis*, spica mascula oblonga, foem. serioribus remotis subpedunculatis paucifloris, culmo foliis brevior LEYS. *Hoppe, herb. c. 1. 22.*

In montosis (Saxon. Lips. Salisb. Ratisb. — prope Steigerthal.) Fl. Apr.

48. *c. alba*, spica masc. terminali, foem. duabus linearibus, florent. erectis, fructif. pendulis: vaginis pedunc. squamisque floralibus tumidis scariosis argenteis; culmo subnudo vaginoso; fol. subsetaceis; caps. globosis mucronatis, radice reptante HAËNKE.

In montosis sylvaticis (Carn. Austr. inf.—) Primo vere.

† 49. *c. ferruginea*, spicis erectis pedunculatis lanceolatis: mascula terminali, foem. remotis tenuioribus ROTH.

In pratis paludosis (Oldenb.) —

50. *c. elegans*, spicis pendulis: mascula erecta lineari: foem. geminatis pendulis, caps. distichis acuminatis squama minoribus WILD. t. 1. fig. 4.

In turfosis humidis (Berol. —) Fl. Apr. Maj.

51. *c. pendula*, spicis subsessilibus pendulis, mascula erecta, foem. cylindricis longissimis, caps. subrotundis acuminatis HUDS. Fl. lond.

In fossis sylvaticis, ad aquas hinc inde; fl. Iun. Iul. (*c. mutabilis*, WILD?)

* 52. *c. sylvatica*, spicis pedunculatis pendulis, mascula erecta, foem. filiformibus laxis pedunculo brevioribus, caps. ovatis aristatis furcatis HUDS. Leers, t. 15. fig. 2. (*c. capillaris*.)

In pratis sylvaticis; fl. Maj. Iun.

53. *c. Leptostachys*, spicis sexu distinctis: mascula unica, foem. pedunculatis, remotis pendulis filiformibus, caps. remotis, apice integris EHRH. phyt. 48.

Hannoverae —

Spi.

Spicis sexu distinctis, masculis pluribus.

*54. *c. riparia*, spicis masculis pluribus triquetris nigricantibus, acutis, squamis aristato-acuminatis, caps. subinflatis bicornibus CURTIS, *Fl. lond.*

Ad ripas; fl. Maj. Iun. (*c. crassa*, EHRH. gram. 59. MICHX. t. 52. fig. 6. 7.)

*55. *c. acuta*, spicis masculis pluribus obtusis, squamis obtusiusculis, caule acutangulo, CURTIS, *Fl. lond.*

Ad ripas fluviorum; fl. Maj. Iun.

56. *c. gracilis*, spicis masculis et foem. pluribus, subuliformibus, flor. digynis CURT. *Fl. lond.*

Ad ripas; fl. cum prioribus.

*57. *c. flacca*, spicis masculis pluribus erectis, foem. pendulis, caps. ovalis bractea brevioribus SCHREB. *Leers*, t. 15. f. 3. (*c. limosa*.)

Ad fossas, in pratis sylvaticis (Carn. Nass. Saxo. Palat. Siles. Bav. Berol. etc.) Fl. Maj. (*c. glauca*, HOPPE, ect. c. 1. 98.)

58. *c. vesicaria*, spicis masculis pluribus, foem. sessilibus, caps. inflatis acuminatis L. *Leers*, t. 15. fig. 2. 1.

In paludosis, ad fossas; fl. Maj.

59. *c. inflata*, spicis masculis pluribus, foem. crassioribus pedunculatis, caps. inflatis birostratis. *Leers*, t. 15. fig. 2. III. *Ehrh. gram.* 60. (*c. vesicaria*.)

In paludosis, fossis; fl. Maj.

60. *c. obtusangula*, spicis masculis pluribus, foem. gracilioribus pedunculatis; caps. divergentibus. *Leers*, t. 15. fig. 2. 11. *Ehrh. gram.* 50. (*c. obtusangula*.)

In paludosis; fl. Maj.

* 61. *c. hirta*, spicis remotis: masculis pluribus, foem. subpedunculatis erectis, caps. hirtis L. *Leers*, t. 15. fig. 3. *Ehrh. gram.* 100. *Hoppe*, herb. c. 1. 47.

In pratis humidis, arenosis; fl. Maj.

TETRANDRIA.

422. LITTORELLA (Strändling) *G. pl.* 1415.

Mas: cal. 4-phyllus; cor. 4-fida; stam. longa; foem. cal. 0; cor. sub 4-fida; stylus longus; nux 1. locularis.

L. lacustris, L. *Fl. dan.* t. 170.

Ad littora lacuum, locis inundatis (Oldenb. Brem. Hannov. — Ratisb. HOPPE.) Fl. Iun. Iul.

423. BERULA (Birke) *G. pl.* 1419.

Mas: amentum ex squamis trifloris; cal. 1-phyllus 3-4-partitus; cor. 0; foem. amentum ex squamis bifloris; styli 2; semina? 2-3.

* 1. *B. alba*, fol. ovatis acuminatis serratis L.

In sylvis, ad pagos; fl. Maj. (Fructus: Samarac 2, GAERTN.)

2. *B. pendula*, fol. ovato-acuminatis inciso-serratis glabris, ramis flaccidis pendulis ROTH.

In sylvis, ad pagos; fl. Apr. Maj.

* 3. *B. Alnus*, pedunc. ramosis L.

Ad ripas fluviorum, in pratis udis; fl. Mart.
Apr. (*Alnus glutinosa*; nux compressa 2. locu-
laris carpologice non tantum, sed anthologice.
Betula et *Alnus*, ab invicem separari debeant
GAERTN.)

4. *B. emarginata*, Ehrh. arb. 9.

Hannoverae —

5. *B. pubescens*, Ehrh. arb. 67.

Hannoverae —

6. *B. verrucosa*, Ehrh. arb. 96.

Hannoverae —

7. *B. laciniata*, Ehrh. 106.

Prope Berolinum —

8. *B. nana*, fol. orbiculatis crenatis L.

amoen. vol. 1. t. 1.

In alpinis, montosis, locis uliginosis (Her-
cyn. Tyrol. Salisb. Bavar? —) Fl. Maj.

424. URTICA (Nessel) G. pl. 1422.

Mas: cal. 4 - phyllus; cor. o; nectarium
centrale cyathiforme; foem. cal. 2. valvis,
cor. o; sem. 1, nitidum.

1. *U. pilulifera*, fol. oppositis ovatis ser-
ratis, amentis fructiferis globosis L.

Inter olera (prope Barbi —) Fl. aestate.

* 2. *U. urens*, fol. oppositis ovalibus L.
Bull. t. 230.

In cultis, ad sepes; fl. aestate.

* 3. *U. dioica*, fol. oppositis cordatis race-
mis geminis L. Fl. dan. t. 746.

In ruderatis, ad sepes, vias; fl. aestate. (In
calyce foem. hujus et prioris folia 2 minuta op-
posita majoribus.)

PENTANDRIA.

425. XANTHIUM (Spitzklette) *G. pl.* 1426.

Mas: cal. communis imbricatus; cor. composita; propr. 1 - petala, 5 - fida infundibuliformis; recept. paleaceum; foem. cal. involucrium 2 - phyllum, 2 - florum; cor. o; drupa sicca 2 - fida: nucleo biloculari.

* *X. strumarium*, caule inermi, fol. cordatis trinervatis L.

In ruderatis, ad vias; fl. Iul. Aug. (Pericarp. duplicatum MED.)

426. AMARANTHUS (Amaranth) *G. pl.* 1431.

Mas: cal. 3 - 5 - phyllus; cor. o; stam. 3 - 5; foem. ut in mare; styli 3; caps. 1 - locularis circumscissa; sem. 1, (utriculus 1 - spermus WILD.)

* 1. *A. Blitum*, glomerulis lateralibus, fl. 3 - fidis, fol. ovatis retusis, caule diffuso L.

In ruderatis, oleraceis; fl. Iul. Aug.

2. *A. viridis*, glomerulis triandris, fl. masculis trifidis, fol. ovatis emarginatis, caule erecto L. *Wild. amaranth. t. 8. f. 16.*

In desertis, exstructis (Bay. Palat. Dantisc. —) Fl. Iul. Aug.

POLYANDRIA.

427. CERATOPHYLIUM (Wasserhorn) G.
pl. 1439.

Mas: cal. multipartitus; cor. o; stam. 16-20; foem. ut in mare; drupa ovata, nux 1 locularis.

* 1. *C. demersum*, fol. dichotomo - bigeminis; fruct. trispinosus L.

In fossis, piscinis; fl. Iun. Iul.

2. *C. submersum*, fol. dichotomo - trigeminis; fruct. muticis L.

In fossis, piscinis (Siles. Bav. Nassov. Saxon. Oldenb. Berol. Barbi, Lips. —) Fl. Iun. Iul.

428. MYRIOPHYLLUM (Wassergarbe) G.
pl. 1440.

Mas: cal. 4 - phyllus; cor. o; stam. 8; foem. ut in mare; germ. 4; (nucis 2 - 4 corticatae GAERTN.)

* 1. *M. spicatum*, flor. masculis interrupte spicatis L. *Fl. dan. t. 681.*

In aquis quietis, piscinis; fl. Iul. Aug. (Cal. in mare duplex 3 - phyllus exiguus, cor. 4 - petala; caps. 4, 1 - spermae LEERS. Cal. 4 - phyllus; cor. o, aut dipetala GAERTN.)

* 2. *M. verticillatum*, flor. omnibus verticillatis hermaphroditis L. *Ehrh. herb. 60.*

In aquis, fossis; fl. Iul. Aug.

420. SACITTARIA (Pfeilkraut) G. pl. 1441.

Mas: cal. 3 - phyllus; cor. 3 - petala; filamenta 24 - 30; foem. ut in mare; caps.

Y

utri-

utriculares numerosissimae; semen tere-
tiusculum conduplicatum.

* *s. sagittifolia*, fol. sagittatis acutis L.
Fl. dan. t. 172.

In fossis, piscinis; fl. Iun. Iul.

430. *POTERIUM* (Becherblume) *G. pl.*
1445.

Mas: cal. 4 - phyllus; cor. 4 - partita;
stam. (30 - 40); foem. ut in mare; stig-
mata penicilliformia; (drupa quadrangula-
ris GAERTN.)

* *P. Sanguisorba*, inerme, caulib. suban-
gulosus L. *Fl. lond.*

In pascuis, campis; fl. Iun. Iul.

431. *QUERCUS* (Eiche) *G. pl.* 1447.

Mas: cal. 5 - fidus: laciniis saepe 2 - fi-
dis; cor. 0; stam. (5 - 10); foem. involu-
crum squamis imbricatis in cupulam coa-
litis; cal. minimus 6 - fidus; cor. 0; stig-
mata 3 - 5; nux ovata, excepta cupula.

* 1. *Q. Robur*, fol. deciduis oblongis su-
perne latioribus: sinubus acutioribus, an-
gulis obtusis; (fruct. subsessilibus) L. *Oel-
haf. 2. t.* 4. 5.

In sylvis; fl. Maj.

2. *Q. pedunculata*, fol. subpetiolatis ob-
longis obtusis pinnato - sinuatis, fructibus
pedunculatis. *Oelh. 2. t.* 2. 3. *Ehrh. arb.*
77. (*Q. pedunculata*.)

In sylvis; fl. Apr. Maj.

432. FAGUS (Buche) *G. pl.* 1448.

Mas: cal. monophyllus subsexfidus; cor. o; (stam. (5-20) foem. involucrum 1-phyllum 4-fidum, 2-florum muricatum; cal. superus 6-fidus; nux triquetra 1-lo-cularis.

* *F. sylvatica*, fol. ovatis obsolete serratis
L. *Oelhaf.* 2. t. 6-8.

In sylvis; fl. Maj. Iun.

433. CARPINUS (Hainbuche) *G. pl.* 1449.

Mas: cal. squama ovata concava ciliata; cor. o; stam. plura; foem. squama apice reflexa; involucrum 1-phyllum 6-fidum: laciniis inaequalibus; cal. tridentatus superus; nux tecta involucro persistente, apice 6-fido.

* *c. Betulus*, squamis strobilorum planis
L. *Oelhaf.* 2. t. 9-12.

In sylvis; fl. Apr. Maj.

434. CORYLUS (Haselstaude) *G. pl.* 1450.

Mas; amentum ex squamis trifidis unifloris; cor. o; stam. 6-8; foem. amentum subglobosum; involucrum diphyllum lacerum; cal. obsoletus, ex margine epidermidis nucis brevissimo; cor. o; styli 2; nux ovata, basi derasa.

* *c. Avellana*, stipulis ovatis obtusis L.

In sylvis, ad sepes; fl. Mart. Apr.

MONADELPHIA.

435. PINUS (Kiefer) G. pl. 1456.

Mas: cal. 4 - phyllus; cor. o; stam. plurima; foem. strobili: squama biflora; cor. o; pist. 1; nux alata, 1 - locularis.

Fol. pluribus ex eadem basi vaginali.

* 1. P. *sylvestris*, fol. geminis: primordialis solitariis glabris L. *Oelhaf.* 1. t. 1 - 14.

In sylvis glareosis; fl. Maj. (Hujus loci:)

2. P. *montana*, ramis depressis truncum superantibus.

In montanis (Austr. Tirol. — Bav. SCHRANK.)

3. P. *rubra*, fol. geminis brevioribus glaucis, conis parvis mucronatis MILL.

Prope Ingolstad. (SCHRANK.) —

4. P. *Larix*, fol. fasciculatis obtusis L. *Oelhaf.* 1. t. 17 - 21.

In sylvis mantanis (Austr. Carn. Stir. Megap. Hercyn. Brem. Cell. Francof. —) Fl. Apr. Maj.

Fol. solitariis et basi distinctis.

5. P. *Abies*, fol. solitariis subulatis mucronatis laevibus bifariam versis L. *Oelhaf.* 1. t. 5 - 8.

In sylvis; fl. Maj.

* 6. P. *Picea*, fol. solitariis emarginatis L. *Oelhaf.* 1. t. 9 - 16.

In sylvis (Bav. Siles. Thuring. Palat. Saxon. Barbi, Berol. Francof. Tubing. —) Fl. Maj.

SYNGENESIA.

436. *BRYONIA* (Gichtwurz) *G. pl.* 1480.

Mas: cal. 5 - dentatus; cor. 5 - partita; filamenta 3; foem. ut in mare; stylus 3 - 4 - fidus; bacca subglobosa polysperma.

* 1. *B. alba*, fol. palmatis utrinque calloso - scabris, flor. monoicis *L. Fl. dan. t.* 813.

Ad sepes; fl. Maj. Iun.

2. *B. dioica*, fol. palmatis utrinque calloso - scabris, flor. dioicis *L. Jacq. austr. t.* 199. *Bull. t.* 55. (*B. alba*.)

Ad sepes (Holsat. Palat. Nassov. Austr. Ratisb. Berol. etc.) Fl. Iun. Iul.

Classis XXII.

DIOECIA

MONANDRIA.

437. *NAJAS* (Najade) *G. pl.* 1488.

Mas: cal. cylindricus 2 - fidus; cor. 4 - fida; filament. 0; foem. cal. 0; cor. 0; pist. 1; caps. ovata, 1 - locularis.

N. minor, fol. angustissimis denticulatis, deorsum reflexis, fructu acuto tenuiori 1 - spermo *ALLION. Mich. t.* 8. *fig.* 3.

In aquis lente fluentibus, stagnantibus (Wittenb. *SCHKUH.*) Fl. Iul.?

438. *SALIX* (Weide) *G. pl.* 1493.

Mas: involucrum e gemma constructum, amentum squamis imbricatum; cor. 0;

glandula baseos vel simplex vel duplex;
foem. ut in mare; cor. 0; stigmata 2: bi-
fida vel. simplicia; caps. 1 - locularis; 2 -
valvis; sem. minima cincta basi pappo
simplici.

Fol. glabris serratis.

* 1. *s. triandra*, fol. serratis glabris, flor.
triandris L. *Sal. t.* 9 - 10.

Ad ripas fluviorum; fl. Maj. (Var. fol. et
amentis angustioribus.)

2. *s. undulata*, Ehrh. *frut.* 108.

Hannoverae —

* 3. *s. pentandra*, fol. serratis glabris,
flor. pentandris L. Ehrh. *frut.* 48.

Ad ripas (Siles. Bav. Megap. Pom. Holsat. Brem.
Lips. Berol. Hannov. etc.) Fl. Maj. Iun. (*Sal.*
polyandra, GLED. WEIG. SCHRANK. —)

† 4. *s. phylicifolia*, fol. serratis glabris
lanceolatis: crenis undulatis L.

In salicetis (Nassov. LEERS.) Fl. Maj. (*Salix*
sub hoc nomine a rev. WULFEN missa: fol. ju-
nioribus exacte ovatis sinuato - serratis subtus
glaucis, etiam apud nos locis montosis occur-
rens, diversissima ab illa.)

* 5. *s. monandra*, fol. glabris, oblongis
lanceolatis, anterieus serratis latioribus. *Sal.*
t. 1. *Fl. lond.*

Ad ripas; fl. Apr. Maj.

† 6. *s. amygdalina*, fol. serratis glabris
lanceolatis petiolatis, stipulis trapezifor-
mibus L.

Ad ripas, vias; fl. Maj.

* 7. s. *bigemmis*, fol. serratis glabris lanceolatis petiolatis; gemmis 2, lateralibus.

Ad ripas; fl. Maj. (Frutex, rami fragilissimi.)

* 8. s. *decipiens*, fol. serratis glabris lanceolatis petiolatis: inferioribus minoribus obovatis reflexis. *Sal. t.* 31.

Ad ripas; fl. Maj. (Arbor, rami fragiles.)

Fol. subintegerrimis.

9. s. *glauca*, fol. (sub) integerrimis subtus (glaucis) tenuissime villosis ovato-oblongis L.

In montosis (Hercyn. *EHRH.*) Fl. Maj.

10. s. *bicolor*, *Ehrh. frut.* 118.

In Bructero —

* 11. s. *vitellina*, fol. serratis lanceolatis acutis: serraturis cartilagineis. *Sal. t.* 11. 12.

Ad vias, aquas; fl. Maj.

* 12. s. *alba*, fol. lanceolato-acuminatis serratis subpubescentibus: serraturis infimis glandulosis (cartilagineis) L. *Sal. t.* 7. 8.

Ad vias, ripas; fl. Maj.

* 13. s. *fissa*, fol. integris, oblongo-lanceolatis, acuminatis glabris. *Sal. t.* 13. 14.

In salicetis, ad ripas; fl. Apr.

* 14. s. *molissima*, fol. lineari-lanceolatis utrinque tenuissime tomentosis, mollissimis.

Ad ripas; fl. Maj.

15. *s. cinerea*, fol. subserratis oblongo-ovatis, subtus subvillosis, stipulis dimidiato-cordatis L.

Ad ripas sabulosas; fl. Maj. (Frutex orgyalis.)

- * 16. *s. aurita*, fol. (sub) integerrimis utrinque villosis subovatis appendiculatis L.

Sal. t. 4.

Ad sepes, locis umbrosis, humidis; fl. Maj.

17. *s. ambigua*, Ehrh. frut. 109.

Hannoverae —

- * 18. *s. acuminata*, fol. ovato-oblongis, subtus tomentosis subcrenatis. *Sal. t. 6.*

Promiscue cum priori; fl. Mart. Apr.

- * 19. *s. caprea*, fol. ovatis rugosis subtus tomentosis undatis superne denticulatis L.

Sal. t. 3.

In montosis; fl. Apr. Maj.

- * 20. *s. viminalis*, fol. subintegerrimis lanceolato-linearibus longissimis acutis, subtus sericeis, ramis virgatis L. *Sal. t. 2.*

Ad ripas; fl. Maj. (Var. magnitudine et fol. angustioribus.)

21. *s. rosmarinifolia*, fol. integerrimis lanceolato-linearibus strictis sessilibus, subtus tomentosis L. Ehrh. frut. 110.

In pascuis, pratis paludosis, montanis (Carinth. Megap. Lauenb. —)

- * 22. *s. depressa*, fol. integerrimis ovato-oblongis, supra glabris, subtus sericeis. *Sal. t. 15. 16.*

Locis depressis, uliginosis, fl. Maj. (Hujus loci:)

23. s. *polymorpha*, Ehrh. frut. 49.

Hannoverae —

24. s. *arenaria*, fol. integris ovalibus, ellipticis, subtus villosis nitidis, stipulis semiovatis, lanceolatis. Viborg, t. 4.

In arenosis, maritimis; fl. Maj. Iun. (Exsiccatione superficies cinerea foliorum nigrescit.)

25. s. *incubacea*, fol. integerrimis lanceolatis supra subtusque subvillosis.

Locis turfosis, arenosis; fl. Maj. (Sal. *arenaria*, *incubacea*, *repens* et *fusca* LINN. incertae ac mixtae species, aegre amplius extricandae.)

TRIANDRIA.

439. EMPETRUM (Ranschbeere) G. pl.

1496.

Mas: cal. 3 - partitus; cor. 3 - petala; stam. longa; foem. ut in mare; styli 3 - 9; bacca 3 - l. enneasperma.

E. *nigrum*, procumbens L. Ehrh. frut. 20.

In ericetis turfosis, arenosis (Siles. Austr. Brem. Oldenb. Holsat. Verden, Celle, Hannov. —) Fl. Apr.

TETRANDRIA.

440. VISCUM (Mistel) G. pl. 1504.

Mas: cal. 4 - partitus: cor. 0; antherae calyci adnatae; foem. cal. 4 - phyllis superis; stylus 0; cor. 0; bacca pulposa, 1 - locularis; sem. cordatum.

v. *album*, fol. lanceolatis obtusis, caule
dichotomo, spicis axillaribus L.

Parasitice in arboribus variis; fl. Mart. Apr.
(Involucrum (subtetragonum) triflorum: inter-
medio flore involucrato EHRH. Spiculae termi-
nales plerumque 5. florum: 3 fere aequales, dis-
sectae longitudinaliter, pedunculo trifido quasi
insidentes, 2 oppositae.)

441. HIPPOPHAË (Sanddorn) G. pl. 1508.

Mas: cal. 1 - phyllus, bilobus; cor. 0;
stam. 4; foem. cal. 1 - phyllus, tubulosus;
cor. 0; styl. 1; bacca supera 1 - locularis.

H. *Rhamnoides*, fol. lanceolatis L. Vi-
borg, t. 5.

In arenosis maritimis (Holsat. Carn.—) Fl. Maj.

442. MYRICA (Gagel) G. pl. 1510.

Mas: cal. amentum imbricatum squamis
lunatis; cor. 0; stam. 4-6; foem. ut in
mare; styli 2; bacca 1 - locularis.

M. *Gale*, fol. lanceolatis subserratis, cau-
le suffruticoso L. Fl. dan. t. 327.

In paludosis, turfosis (Brem. Oldenb. Holsat.
Bav. Hannov. Ibbenbühen, Nordhus. —) Fl.
Apr. Maj. (Squamae triangulares, pericarpia
in strobilum congesta ROTH.)

PENTANDRIA.

443. CANNABIS (Hanf) G. pl. 1522.

Mas: cal. 5 - partitus; cor. 0; foem. cal.
1 - phyllus oblongus latere hians; cor. 0;
styli 2; nux calyce vestita, 1 - locularis,
bivalvis.

C. sativa, L.

Hinc inde quasi sponte; fl. Maj. Iun.

444. HUMULUS (Hopfen) *G. pl.* 1523.

Cal. 5-phyllus; cor. o; stam. 5; foem.
cal. 1-phyllus, oblique patens integer;
cor. o; styli 2; sem. 1, intra calycem fo-
liatum.

* *H. Lupulus*, L. *Bull. t.* 234.

Ad sepes; fl. Iun. Iul.

OCTANDRIA.

445. POPULUS (Espe) *G. pl.* 1531.

Mas: amentum squamis laceris imbrica-
tum; cor. obliqua turbinata integra; foem.
ut in mare; stigma 4-fidum; caps. 1-lo-
cularis bivalvis; sem. papposa.

* 1. *P. alba*, fol. subrotundis dentato-an-
gulatis, subtus tomentosis L. *Ehrh. arb.*
120.

Ad ripas, pagos; fl. Mart. Apr.

* 2. *P. tremula*, fol. subrotundis dentato-
angulatis utrinque glabris L.

In sylvis, ad pagos; fl. Febr. Mart. (Stigma
2-3-partitum EHRH.)

* 3. *P. nigra*, fol. deltoidibus acuminatis
serratis L. *Ehrh. arb.* 70.

Ad ripas, locis humidis; fl. Mart. Apr.

ENNEANDRIA.

446. MERCURIALIS (Bingelkraut) *G. pl.*
1534.

Mas: cal. 3 - partitus; cor. 0; stam. 9 - 12; antherae globosae didymae; foem. ut in mare; styli 2; caps. 2 - cocca, 2 - locularis, 1 - sperma.

1. *M. perennis*, caule simplicissimo, fol. scabris L. *Bull. t.* 303. *Fl. lond.*

In nemorosis montosis; fl. Apr. Maj..

2. *M. annua*, caule brachiato, fol. glabris, floribus spicatis L. *Bull. t.* 159. 235.

In cultis oleraceis; fl. aestate.

447. HYDROCHARIS (Froschbiss) *G. pl.*
1535.

Mas: spatha 2 - phylla; cal. 3-fidus; cor. 3-petala; filam. 3 interiora stylifera; foem. cal. 3 - fidus; cor. 3 - petala; styli 6; caps. 6 - locularis, polysperma, infera.

H. Morsus ranae, L. *Fl. lond.*

In aquis stagnantibus; fl. Iul. Aug.

DODECANDRIA.

448. STRATIOTES (Walserscheer) *G. pl.*
1541.

Mas: spatha communis 2 - phylla 3 - 5-flora; perianth. 1 - phyllum; petala 3; nectaria 20 - 30 receptaculo inserta; stam. 12 - 13; foem. spatha 2 - phylla 1 - flora; perianth.

rianth. cor. et nectaria ut in mare; styli 6, 2-fidi; bacca ovalis hexagona, 6-locularis.

s. *Aloides*; fol. ensiformi-triangularis ciliato-aculeatis L. *Fl. dan. t.* 337.

In fossis, aquis stagnantibus (Siles. Brem. Oldenb. Megap. Holsat. Berol. Barbi — Wolfenb. HOPPE.) *Fl. Inn.*

MONADELPHIA.

449. JUNIPERUS (Wachholder) *G. pl.* 1552.

Mas: amenti squamae; cor. o; stam. 3 (in terminali flosculo); foem. cal. 3-partitus; petala 3; styli 3; drupa ossiculis 3.

* *J. communis*, fol. ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus L. *Oelhaf. 1. t.* 22.

In sylvis; fl. Apr. Maj. (Fructus: galbulus sphaericus baccatus GAERTN.)

450. TAXUS (Eibe) *G. pl.* 1553.

Mas: cal. imbricatus squamis 4-7; cor. o; stamina multa; antherae peltatae 8-fidae; foem. ut in mare; stylus o; nux 1, seminuda, receptaculo baccato tecta.

* *T. baccata*, fol. approximatis L. *Bull. t.* 136.

In sylvaticis montosis (Siles. Bav. Megap. Hercyn. — Ratisb. HOPPE. — prope arcem Pless EHRH. Helmstad. CAPPEL.) *Fl. Apr. Maj.*

Classis XXIII.

P O L Y G A M I A

M O N O E C I A.

451. ANDROPOGON (Bartgras) *G. pl.* 1566.

Hermaphrod. cal. gluma 1 - flora; cor. 2 - valvis: altera valvula basi aristata; stam. 3; styli 2; sem. 1; masc. ut in priori, corolla mutica; stam. 3.

* *A. Ischaemum*, spicis digitatis plurimis flosculis sessilibus aristato-muticoque, pedicellis lanatis L. *Schreb. t.* 33.

In collinis (Austr. Carn. Bav. Palat. Saxon. Lips.—Norimb. PANZ. Ratisb. HOPPE.) Fl. Iul. Aug.

452. HOLCUS (Pferdegras) *G. pl.* 1565.

Hermaphr. cal. gluma 1 - 2 - flora; cor. gluma aristata; stam. 3; styli 2; sem. 1.

Mas: cal. gluma 2 - valvis; cor. 0; stam. 3.

* 1. *H. mollis*, glumis bifloris nudiusculis: flosculo hermaphrod. mutico, masculo arista geniculata L. *Schreb. t.* 20. *f.* 1.

In sepibus, dumetis, pratis siccis; fl. Iun. Iul.

* 2. *H. lanatus*, glumis bifloris villosis: flosculo hermaphr. mutico, masculo arista recurva L. *Fl. lond.*

In pratis, pascuis; fl. Iun. Iul.

3. *H. odoratus*, glumis trifloris muticis acuminatis: flosculo hermaphrod. diandro L. *Hoppe, ect.* 361.

In pratis, pascuis nemorosis, montosis (Bo-russ. Berol. Barbi—Ratisb. HOPPE.) Fl. Maj. (Hujus loci *Savastana hirta*, SCHRANK.)

453. VALANTIA (Valantie) *G. pl.* 1575.

Hermaphr. cal. 0; cor. 4-partita; stam. 4; stylus 2-fidus; sem. 1. Mas: cal. 0; cor. 3-4-partita; stam. 3-4; pistill. obsoletum.

* 1. *V. cruciata*, flor. masculis quadrifidis, pedunculis diphyllis L.

In dumetis, nemorosis; fl. Maj. Iun.

2. *V. Aparine*, flor. masculis trifidis pedicellatis hermaphrod. pedunculo insidentibus L. *Vaill. t. 4. fig. 3, b.*

Inter segetes (Palat. Gött. Helmstad. —) Fl. Maj. Iun. (Caule decumbente ramoso, fol. sursum spinosis, fructu subechinato differt a *Gal. spurio*, EHRH.)

454. PARIETARIA (Glaskraut) *G. pl.* 1576.

Hermaphr. cal. 4-fidus; cor. 0; stam. 4; styl. 1; semen 1, superum. Foem. ut in priori; stam. 0.

P. officinalis, fol. lanceolato-ovatis pedunculis dichotomis, calyc. diphyllis L. *Bull. t. 199. Fl. lond.*

In ruderatis; fl. Iul. Aug.

455. ATRIPLEX (Melde) *G. pl.* 1577.

Hermaphrod. cal. 5-phyllus; cor. 0; stam. 5; foem. cal. 2-phyllus; cor. 0; stam. 0; stylus 2-partitus; sem. ut in priori 1, compressum.

1. *A. portulacoides*, caule fruticoso, fol. obovatis L.

Ad littora maris (Carn. Oldenb. —) Fl. Iul. Aug.

2. *A. rosea*, caule herbaceo, fol. incanis serratis, fructibus quadrangularibus dentatis L.

In ruderatis, ad pagos (Palat. Saxon. Lips. Berol. Barbi —) Fl. Iul. Aug.

3. *A. tatarica*, caule herbaceo, fol. deltoideis sinuato-dentatis undulatis alternis L.

In sylvaticis humidis (prope Barbi —) Fl. Iul.

4. *A. hortensis*, caule erecto herbaceo, fol. triangularibus L.

In cultis oleraceis, hinc inde quasi sponte; Fl. Iul. Aug. (Var. rubra.)

5. *A. laciniata*, caule herbaceo, fol. deltoideis dentatis subtus argenteis L.

In maritimis, ad salinas (Holsat. Saxon. Dan. tisc. Lips. —) Fl. Iul. Aug.

* 6. *A. hastata*, caule herbaceo; cal. valvulis foemineis magnis deltoideis sinuatis L. Fl. lond.

In ruderatis, cultis, ad vias; fl. Iul. Aug.

* 7. *A. patula*, caule herbaceo patulo, fol. subdeltoideo-lanceolatis, calyc. seminum disco dentatis L.

In ruderatis, cultis; fl. Iul.

8. *A. littoralis*, caule herbaceo erecto, fol. omnibus linearibus integerrimis L.

Ad littora maris (Holsat. Oldenb.) —

9. *A. pedunculata*, caule herbaceo divaricato, fol. lanceolatis obtusis integris, calyc. foem. pedunculatis L. Fl. dan. t. 304.

Ad littora maris (Oldenb. ROTH.) ad salinas (prope Barbi.) Fl. Iul. Aug.

456. *AESCULUS* (Rofskastanie) *G. pl.* 628.

Hermaphrod: cal. 1 - phyllus; petala 5, inaequalia: unguibus calyci insertis; stam. 7. stigma acuminatum; caps. 3 - locularis, 3 - valvis; sem. geminata, castaniformia; masc. ut in priori, pistillum o, vel castratum.

A. *Hippo - Castanum*, flor. patentissimis racemosis: superioribus masculis ROTH. *Oelhaf. t.* 37 - 39.

Hinc inde quasi indigena: fl. Maj. Iun.

457. *ACER* (Ahorn) *G. pl.* 1590.

Herm. calyx 5 - fidus; cor. 5 - petala; stam. 8; pist. 1; pericarp. 2, 1 - sperma ala terminata; masc. ut in priori.

* 1. *A. Pseudo-platanus*, fol. 5 - lobis inaequaliter serratis; flor. racemosis L. *Oelhaf. t.* 24.

In sylvis montosis; fl. Maj. Iun.

* 2. *A. platanoides*, fol. 5 - lobis acuminatis acute dentatis glabris, flor. corymbosis L. *Oelhaf. t.* 24.

In sylvis montosis; fl. Apr. Maj.

* 3. *A. campestre*, fol. lobatis obtusis emarginatis L. *Oelhaf. t.* 28.

Ad sepes, dumeta; fl. Maj. (Samarae 2, flores triplici ordinis).

DIOECIA.

458. FRAXINUS (Esche) *G. pl.* 1597.

Hermaphrod: cal. 0; cor. 0; stam. 2;
pist. 1; pericarp. 1 - locale lanceolatum;
foem. ut in priori, pist. 1.

* 1. *F. excelsior*, foliolis serratis, flor.
apetalis L.

In sylvis, ad pagos; fl. Apr. Maj. (Bracteae 2,
ad basin in flore masculinor., vel terminali her-
maphrod., vel omnibus hermaphrod, In singulis
racemis etiam terminales hermaphrod.)

INDEX GENERVM.

Acer	353	Anthyllis	252
Achillea	304	Antirrhinum	218
Aconitum	187	Apargia	275
Acorus	123	Aphanes	56
Actaea	182	Apium	108
Adonis	192	Aquilegia	188
Adoxa	140	Arabis	239
Aegopodium	108	Arbutus	143
Aesculus	353	Arctium	283
Aethusa	102	Aristolochia	320
Agrimonia	162	Arenaria	153
Agrostema	158	Arnica	300
Agrostis	24	Artemisia	290
Aira	26	Arum	321
Ajuga	199	Arundo	40
Alchemilla	56	Asarum	161
Alisma	131	Asclepias	83
Allium	115	Asparagus	121
Alopecurus	19	Asperugo	65
Alsine	110	Asperula	47
Althaea	245	Asphodelus	120
Alyssum	230	Aster	296
Amaranthus	336	Astragalus	262
Anagallis	69	Astrantia	90
Anchusa	62	Athamantha	95
Andromeda	142	Atriplex	352
Andropogon	550	Atropa	78
Androsace	66	Avena	38
Anemone	289		
Anethum	106	Ballota	209
Angelica	99	Bartsia	214
Anthenus	303	Bellis	302
Anthericum	120	Berberis	127
Anthoxanthum	10	Betonica	208
		Betula	

Betula	534	Chlora	134
Bidens	288	Chondrilla	276
Biscutella	231	Chrysanthemum	301
Blitum	2	Chrysocoma	289
Borrago	65	Chrysosplenium	144
Brassica	240	Cichorium	285
Briza	31	Cicuta	102
Bromus	35	Cineraria	298
Bryonia	341	Circaea	5
Bunias	223	Cistus	185
Bunium	94	Clematis	191
Buphthalmum	305	Clinopodium	211
Bupleurum	90	Cnicus	235
Butomus	141	Cochlearia	228
		Colchicum	150
Calendula	308	Colutea	259
Calla	321	Comarum	181
Callitriche	1	Conium	94
Caltha	199	Convallaria	121
Campanula	71	Convolvulus	70
Camphorosma	55	Conyza	292
Cannabis	346	Coriandrum	103
Capparis	182	Cornus	54
Cardamine	233	Coreopsis	305
Carduus	283	Coronilla	259
Carpinus	339	Corrigiola	110
Carex	324	Corylus	359
Carlina	287	Cotula	361
Carum	107	Crambe	223
Gaucalis	93	Crataegus	170
Centaurea	305	Crepis	281
Centunculus	54	Crocus	12
Cerastium	159	Cucubalus	149
Ceratophyllum	337	Cuscuta	56
Cerinthe	64	Cyclamen	68
Chaerophyllum	104	Cynoglossum	62
Chara	322	Cynosurus	32
Cheiranthus	238	Cyperus	15
Chelidonium	182	Cypripedium	320
Chenopodium	84	Cytisus	258

Dactylis	32	Galeopsis	207
Daphne	136	Galium	48
Datura	77	Genista	250
Daucus	94	Gentiana	87
Delphinium	186	Geranium	242
Dentaria	232	Geum	181
Dianthus	147	Gladiolus	12
Dictamnus	141	Glaux	82
Digitalis	220	Glechoma	205
Dipsacus	45	Globularia	44
Doronicum	300	Gnaphalium	291
Draba	224	Gratiola	7
Dracocephalum	212	Gypsophila	146
Drosera	113	Hedera	81
Dryas	181	Hedysarum	261
Echinops	310	Heliotropium	60
Echium	66	Helleborus	193
Elatine	140	Hemerocallis	123
Elymus	41	Heracleum	97
Empetrum	340	Herniaria	85
Epilobium	132	Hesperis	238
Erica	135	Hieraceum	278
Erigeron	292	Hippocrepis	261
Eriophorum	18	Hippophaë	346
Ervum	257	Hippuris	1
Eryngium	89	Holcus	350
Erysimum	237	Holosteum	43
Evonymus	80	Hordeum	42
Eupatorium	289	Hottonia	63
Euphorbia	164	Humulus	347
Euphrasia	215	Hyacinthus	122
Fagus	339	Hydrocharis	348
Festuca	33	Hydrocotyle	89
Filago	309	Hyosciamus	77
Fragaria	177	Hyoseris	281
Fraxinus	354	Hypericum	270
Fumaria	248	Hypochaeris	282
Galanthus	117	Hyssopus	202
Galega	261	Iasione	310
		Iberis	230

Illecebrum	81	Lychnis	158
Illex	57	Lycopus	9
Impatiens	511	Lycopsis	65
Imperatoria	105	Lysimachia	69
Inula	293	Lythrum	162
Iris	15		
Isatis	224	Malva	246
Isnardia	55	Marrubium	209
Isopyrum	198	Matricaria	302
Iuncus	124	Medicago	268
Iuniperus	349	Melampyrum	216
		Melica	33
Lactuca	275	Melissa	212
Lamium	205	Melittis	215
Lapsana	283	Mentha	203
Laserpitium	97	Menyanthes	68
Lathraea	217	Mercurialis	348
Lathyrus	253	Mespilus	172
Lavatera	246	Milium	30
Ledum	142	Mochringia	137
Lemna	418	Monotropa	203
Leontodon	277	Montia	43
Leonurus	210	Myosurus	113
Lepidium	225	Myagrum	222
Leucojum	114	Myosotis	60
Ligusticum	99	Myrica	346
Ligustrum	2	Myriophyllum	577
Lilium	118		
Limosella	221	Najas	341
Lindernia	221	Narcissus	115
Linnaea	221	Nardus	19
Linum	112	Nepeta	202
Lithospermum	61	Nigella	188
Littorella	334	Nymphaea	184
Lobelia	361		
Lolium	41	Oenanthe	110
Lonicera	75	Oenothera	152
Loranthus	127	Ononis	251
Lotus	267	Onopordon	287
Lunaria	232	Ophrys	310

Orchis

Orchis	312	Poterium	338
Origanum	211	Prenanthes	277
Ornithogalum	118	Primula	67
Ornithopus	260	Prunella	214
Orobanche	222	Prunus	169
Orobus	252	Pulmonaria	63
Oxalis	157	Pyrola	143
		Pyrus	172
Paeonia	186		
Panicum	21	Quercus	338
Papaver	183		
Parietaria	351	Ranunculus	193
Paris	140	Raphanus	242
Parnassia	112	Reseda	163
Pastinaca	106	Rhamnus	79
Pedicularis	217	Rhinanthus	214
Peplis	127	Ribes	80
Peucedanum	96	Rosa	174
Phalaris	20	Rubia	52
Phellandrium	102	Rubus	176
Philadelphus	169	Rumex	127
Phleum	23	Ruppia	59
Physalis	78		
Phyteuma	74	Sagina	59
Picris	273	Sagittaria	337
Pimpinella	107	Salicornia	1
Pinguicula	8	Salix	341
Pinus	240	Salvia	9
Pisum	352	Sambucus	109
Plantago	52	Samolus	75
Poa	29	Sanguisorba	54
Polemonium	70	Sanicula	90
Polycarpon	44	Satureja	202
Polycnemum	12	Satyrium	315
Polygala	249	Saxifraga	144
Polygonum	137	Scabiosa	45
Populus	347	Scandix	103
Portulaca	161	Scherardia	47
Potamogeton	57	Scheuchzeria	130
Potentilla	173	Schoenus	14

Scilla

Scilla	120	Teucrium	200
Scirpus	16	Thalictrum	192
Scleranthus	145	Thesium	82
Scorzonera	272	Thlaspi	227
Scrophularia	219	Thymus	211
Scutellaria	213	Tillaea	60
Sedum	156	Tillia	184
Selinum	95	Tordylium	92
Sempervivum	168	Tormentilla	180
Senecio	293	Tragopogon	271
Serapias	319	Trapa	55
Serratula	288	Tribulus	141
Seseli	105	Trientalis	131
Sideritis	203	Trifolium	263
Silene	150	Triglochin	130
Sinapis	241	Trigonella	268
Sison	100	Triticum	43
Sisymbrium	234	Trollius	198
Sium	100	Tulipa	118
Solanum	78	Turritis	240
Solidago	297	Tussilago	293
Sonchus	274	Typha	323
Sorbus	171	Ulex	251
Sparganium	324	Ulmus	86
Spartium	250	Urtica	335
Spergula	160	Utricularia	8
Spiraea	173	Uvularia	118
Stachys	208	Vaccinium	134
Staphylaea	109	Valantia	351
Statice	112	Valeriana	11
Stellaria	152	Verbascum	76
Stellera	137	Verbena	9
Stipa	38	Veronica	4
Subularia	224	Viburnum	108
Swertia	86	Vicia	255
Stratiotes	348	Vinca	83
Symphitum	64	Viola	310
Syringa	3	Viscum	345
Tamarix	118	Xanthium	336
Tanacetum	289	Zannichellia	322
Taxus	349	Zostera	321

ADDENDA ET EMENDANDA.

P. 9. l. 9. lege *Wolfsfufs*.

P. 15. l. 22. lege *Bacothryon*.

P. 18. l. 6. adde *SCIRP. glomeratus* SCOP. est admonente ill. SCHREBERO sc. *mucronatus* LINN.

SCIRP. triqueter, culmo triquetro nudo, spiculis lateralibus ovatis obtusis subsessilibus, pedunculatisque mucrone erecto ROTH.

In Ducat. Oldenb. Bremensi, ad ripas Visurgis — (Est *SCIRP. triqueter* LINN. SCHREB.)

P. 22. l. 16. adde † p. 22. l. 21. adde †

P. 25. l. 19. adde: (*A. compressa* WILD. in pratis humidis Berol.)

P. 43. l. 5. l. *Cynanchica*.

P. 57. l. 11. l. *POTAMOGETON*. l. 13. adde: (Dru-
pae 4, 1-loculares; sem. uncinato-incurvum
GAERTN.)

P. 82. l. 17. adde: (*Nux* 1-locularis evalvis
GAERTN.)

P. 134. l. 12. adde: (monente ill. SCHREBERO
est *EPILOB. tetragonum* LINN.)

P. 170. l. 18. lege *insititia*.

P. 181. l. 17. adde: (*Geum hybridum* WULF.
var. *monstrosa* Gei rivalis. WILD.)

P. 303. adde: *Cotula*: Cal. hemisphaericus; co-
rollul. disci 4-fidae, radii fere nullae; re-
cept. nudum; pappus marginatus.

G. coronopifolia, fol. lanceolato-li-
nearibus dentatis, perfoliato-amplexicaulibus,
flor. solitariis cernuis, caule basi procumben-
te ROTH.

Ad fossas, vias (Ducat. Brem. prope Emden
et Iever ROTH.)

P. 310. adde: *Lobelia*: Cal. 5-fidus; corolla 1-
petala irregularis; caps. 2-locularis?

L. Dortmanna, fol. linearibus bilocula-
ribus integerrimis L. Fl. dan. t. 39.

In Holsat. ad lacum prope Einfeld (WIGG.)

*Libri apud I. I. Palm vanales ejusque
sumtibus impressi:*

- Ellwert, (I. C. P.) Fasciculus plantarum Florae
Baruthinae, 4. 1786. 3 gr.
- Hoffmann, (G. F.) de vario Lichenum usu, sectio
I. 4 maj. 1785. 5 gr.
- - Vegetabilia cryptogamica, 2. fasciculi, 4. maj.
87 - 90. 4 Rthlr.
- - Observationes botanicae, 4. 1787. 2 gr.
- Klingsohr de Geoffraea inermi eiusque cortice,
4. 1789. 4 gr.
- Knigge, (Thom.) de Mentha piperitide comment.
botanico medica, cum tab. aenea, 4. 1780. 6 gr.
- Koelle, (I. L. C.) Spicilegium observationum de
Aconito, cum. icon. 8. maj. 1788. 5 gr.
- Linnaei, (Car. à) Amoenitates academicae. seu dis-
sert. variae physicae, medicae, botanicae, editio
2da novissima et emendata cura Schreberi, cum
tab. aen. Tom. I - VII. 8. maj. 1787 - 89. 13 Rth.
- - eiusd. libri Tomus VIII et IX, editio Ima. 8.
maj. 1785. 2 Rth. 16 gr.
- - eiusd. libri Tomus X, editio Ima. 8. maj. 1790.
1 Rth. 8 gr.
- - Termini botanici, 8. maj. 89. 2 gr.
- Modeer, (Ad.) Bibliotheca helminthologica, seu
enumeratio Auctorum qui de Vermibus scrip-
serunt, 8. maj. 1786. 16 gr.
- Schoepff (J. D.) Mat. med. americ. 8. maj. 86. 12 gr.
- Swarz (O.) Additamenta et emendationes ad Car.
à Linné Systema Vegetabilium et Species Plan-
tarum, cum XI. tabulis aen. 8. maj.

Dillenii (I. I.) Historia Muscorum, cum 85. tab.
aen. Editio nova, aucta et emendata curante
G. F. Hoffmann, 4. maj.

Schoepff (J. D.) Flora Americana, 8. maj.




Kat

8^o Nat.

Hoffmann

(1791)



Hoffmann, Georg Franz,

Deutschlands Flora oder botanisches Taschenbuch ...

Bd.: 1791

Erlangen [1791]

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek -- Nat 573

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11272032-4

VD18 15482049-001